1600

Zool.
o
96

[illegible]

~~K. VI. 26.~~

TESTACEA.

Schalthiere.

Ignatii a Born Eqv.

Academiae Imp. Naturæ Curiosorum, Petropolit. Londinens. Holmens. Göttingens. Upsaliensis, Londin. gothorum, Senens. Monacensis, Burghaus. Patavinæ nec non Physicorum Berolinensium Sodalis.

INDEX
Rerum Naturalium
Musei
Cæsarei Vindobonensis

Pars I.ma
Testacea

Verzeichniß
der natürlichen Seltenheiten
des k. k.
Naturalien Cabinets
zu Wien

Erſter Theil
Schalthiere

Vindobonæ, ex Officina Krausiana. 1778.

C. Schütz fecit.

STAATSBIBLIOTHEK
BAMBERG



AD LECTOREM.

Si publicas rerum naturalium collectiones opportuna atque efficacia ad dilatandam hiſtoriae naturalis cognitionem ſubſidia eſſe conuenit, finis hic nulla alia ratione obtinetur, quam ſi cuivis naturae ſcrutatori aditus aperiatur ad ea ex theſauris iſtis de-

*

pro-

promenda, quae ſiue ad vniuerſale aliquod ſyſtema concinnandum, perpoliendumue, ſiue ad ſingulares obſeruationes inſtituendas vſui ipſi eſſe poſſunt.

Patent quidem Muſea rerum naturalium paſſim curioſorum conſpectui, & quidquid in iis rarum & ſingulare admirandum eſt, a Praefectis diligenter oſtenditur. At vero ſi perpendimus, quam velocibus, & quaſi fugientibus oculis, totum hunc corporum naturalium apparatum, ob temporis, quod ei exhibendo definitum eſt, anguſtias, percurrere opporteat; quam exigua mora in hoc illoue corpore, quod animad-

uerſionem noſtram maxime excitat, obtutum attentionemque defigere liceat; quam raro ſingulae partes naturali & continua ſerie ſua exhiberi poſſint, ac demum quam plena moleſtiae taediique eorum, qui Muſeis iſtis praeſunt, ſit occupatio, eandem, vt ajunt, craben fere quotidie recoquere, operamque ſuam ſaepius apud homines ſcientiae naturalis prorſus ignaros & magis curioſitati ſuae, quam ſcientiae amplificandae ſtudio ſeruientes perdere; facile profecto videbimus: Muſea haec ſemper aliena fore a propoſito, donec res naturales iis contentae accurate deſcribantur, atque ea

ratione ad notitiam manusque omnium, qui iisdem vti volent, perueniant. Sane ſine tali inſtituto pretioſiſſima licet & rariſſima naturae cimmelia exteris maximam partem incognita, indigenis vero inutilia remanere neceſſe eſt.

Id animo reuoluens AVGVSTA noſtra, non patriae tantum, ſed & ſcientiarum artiumque Mater, cuius glorioſiſſimi, ſapientiſſimique imperii haec aeterna & peculiaris erit memoria, prouidiſſe ipſam ſingulari ſollicitudine omnia, quaecunque ad inſtituendos excolendosque ſubditorum animos conducere valeant, locupletiſ-

ſimum ac pretioſiſſimum rerum natura lium theſaurum, qui in palatio Caeſareo Viennae adſervatur, quemque FRANCISCO Auguſto, Diuo illius Conjugi, ſagaciſſimo rerum iſtarum aeſtimatori, conquiſitorique ſolertiſſimo, acceptum referimus, publici juris facere, atque ad id peragendum opera mea — quamuis praeter meritum — uti decreuit. Parui, vt par erat ILLIUS mandato, atque una cum exquiſitis artificibus operi concinnando, exornando, perficiendoque illico manus admoui, cuius Volumen primum propediem typis exſcriptum prodibit in lucem.

Quo-

Quoniam vero neque omnes officii mei partes exſecutus, neque totam beneficentiae AVGVSTAE amplitudinem complexus videri poteram, ſi diligentiam meam ſoli illi operi adornando impenderem, majoris utpote pretii, quam ut a quolibet hiſtoriae naturalis ſtudioſo comparari poſſit, ad indicem hunc, facile cuiuis parabilem, conſcribendum, animum adjeci. Is enim & iis, quibus Muſeum hoc Caeſareum videndi eſt facultas, quidquid eodem continetur, intento velut digito commonſtrabit, & aliis, qui alibi degunt, ſcientiae naturalis cultoribus, haud mediocri adjumento erit.

Ni-

AD LECTOREM.

Nihil aliud Indici huic inſeri poterat, niſi quod re ipſa in Muſeo noſtro reperitur. Vnde & corpora eodem contenta non ſecundum nouum quodpiam, a me fortaſſe condendum ſyſtema, ſed ſecundum aliquod ex iis, quae jam ab aliis conſtituta habemus, diſponi oportebat. Qua re & illa difficultate me expediui, qua naturalis hiſtoriae ſcriptores in nouis nouarum rerum nominibus apte imponendis paſſim implicantur.

In prima hac parte, quae Conchyliorum indicem exhibet, diligenti omnium prope Conchyliographorum inſtituto examine, magni

ni Linnaei ſyſtema ſecutus ſum, propterea: quod omnium, quae adhuc extant — quidquid alii obloquantur — ſit abſolutiſſimum; quod characteres generum, familiarum, ſpecierumque ſingularum, quoad in ſyſtemate, quod ſola teſtarum figura nititur, fieri potuit, accuratiſſime deſignet; quodque tamdiu praeſtantiam ſuam, authoritatemque tuebitur, donec Adanſonii, Baſteri, Ottones Mülleri conſequentium ſeculorum, ſtudio, ſagacitate & induſtria Svvammerdamii, Bradleü, Pouparti, & Reaumurii animati, accuratam deſcriptionem formae, partium, genii, viuendique rationis, quae

vni-

vnicuique teſtaceorum animalium propria ſunt, praebeant; vt tandem genuinum Conchyliorum ſyſtema naturale, aut ſaltem ad naturam proxime accedens conſtitui poſſit.

Linnaei igitur, ut dixeram, ſyſtema ſecutus, nequaquam tamen preſſe adeo veſtigiis ipſius inſtiti, vt non interdum generum ac ſpecierum definitiones ab ipſo propoſitas diſtinctius enarrare, & , ſi dicere fas eſt, emendare auſus fuerim. Neque non conatus ſum, ſingulas Concharum partes decentioribus nominibus inſignire; figuras a Linnaeo commemoratas rectius indicaui, du-

bias

bias omiſi, easque ex recentioribus Conchyliologis ſuppleui, parum curans: quid teutonica Linnaeani ſyſtematis editio, Index Linnaeanus in Knorriana Conchyliographia, & Jo. Sam. Schröterus in Bibliothecae lithologico conchyliographiae Tomo IV. peccauerit.

Eas Conchyliorum ſpecies, quas Linnaei ſyſtema haud complectitur, methodo, ſummo huic viro vſitata, deſcripſi, illis familiis, quibus procul dubio ipſe easdem inſerturus erat, ſingulas inſerui, notas omnes characteresque fuſius declaraui, &

ad

ad accuratas earundum effigies, quae in majori opere comparebunt, prouocaui.

Denique ſingulorum teſtaceorum nomina triuialia, quibus gallica, anglica & belgica lingua compellantur, ex optimis harum nationum ſcriptoribus adjeci; generaque, familias, ſpecies, & varietates eorum; quae hoc indice continentur, appoſita alphabeti littera diſtinxi, ut ii, qui Muſeum luſtraturi ſunt, omnia facilius inueniant.

Eadem methodo & in aliis theſauri hujus Caeſarei rerum naturalium Claſſibus deſcribendis progrediar, quarum quidem ma-

maturationem, tametſi pluribus aliis negotiis deſtinear, tanto certius polliceri audeo, quod Viri doctiſſimi Georgii Sebaſtiani Helbling de Hirzenfeld, qui pro ſingulari, qua in rerum naturalium cognitionem fertur, ſtudio, eximiam hoc in genere doctrinam ſibi comparauit, amica opera me non parum adjuuari hic gratus profitear.

An den Leſer.

Sollen öfentliche Naturalienſammlungen wirkſame Hilfsmittel zu Erweiterung der Kenntniße in der Naturgeſchichte ſeyn, ſo wird dieſer Entzweck nur dadurch erreichet, wenn jedem Naturforſcher Gelegenheit verſchaft wird, aus dieſen Behältniſſen natürlicher Seltenheiten die erforderlichen Materialien herzuholen, deren er etwann zur Darſtellung eines allgemeinen Naturſyſtems, zur Vervollkommung deſſelben oder zu ſeinen einzelnen Beobachtungen bedarf. Zwar

ſtehen die meiſten Naturalien Kabinete dem Wißbegierigen offen, und werden von den Vorſtehern derſelben vorgezeigt. Wenn man aber weis, wie flüchtig man meiſtens in dem kurzen Zeitraume, der zu dieſen Vorzeigungen beſtimmt iſt, den ganzen Vorrath natürlicher Körper durchzugehen gezwungen werde; wie wenig man ſich bei einem oder dem andern Gegenſtande, welcher etwann unſre Aufmerkſamkeit mehr reizet, verweilen dürfe; wie ſelten alle einzelne Stücke in ihrem Zuſammenhange vorgezeigt werden können; wie unangenehm es den Vorſtehern dieſer Sammlungen fallen müſſe, eine und eben dieſelbe Sache faſt täg-

lich zu wiederholen, und ihre Mühe öfters an Leute zu verſchwenden, welche ohne alle Vorbereitung und Kenntniß in dieſem Fache mehr aus Neugierde, als aus Verlangen ſich zu unterrichten herbeigelocket werden; und daß endlich bei derlei Anſtalten dennoch immer dieſe Schäze der Natur dem auswärtigen oder entfernten Gelehrten verborgen bleiben; ſo wird man ſich leicht überzeigen, daß der Hauptzweck, welcher die Errichtung öfentlicher Naturalienkabinete veranlaſſet hat, in ſo lang verfehlet werde, bis dieſe nicht durch eine vollſtändige Beſchreibung aller einzelnen Theile derſelben allgemein bekannt gemacht und

auf dieſe Art gleichſam in die Hände eines jeden, der ſolche benüzen kann, gebracht werden.

Unſere erhabene **Monarchinn**, deren weiſeſte Regierung ſich durch eine unumſchränkte Sorgfalt für alles, was zum Unterrichte und zur Aufklärung ihrer Unterthanen beitragen kann, vorzüglich auszeichnet, hat aus dieſen Beweggründen die öfentliche Bekanntmachung des k. k. Naturalienkabinets, deſſen Entſtehung und Daſeyn wir **Allerhöchſt Ihrem** verewigten Gemahl verdanken, anzubefehlen, und dieſe Arbeit — wieder meine Verdienſte — mir aufzutragen geruhet, an welche ſowohl ich, als die zur Vervollkommung und Verſchönerung

dieſes Werks auserſehenen Künſtler unverzüg-
lich Hand angelegt haben; ſo daß wir im kur-
zen den erſten Band der **Beſchreibung des
k.k. Naturalienkabinets zu Wien** herauszu-
geben, im Stande ſeyn werden.

Vielleicht würde ich aber meiner Pflicht
und der allerhöchſten Abſicht nicht ganz Genü-
ge leiſten, wenn ich mich bloß auf jene koſt-
bare Ausgabe, die ihres höhern Preiſes wegen
nicht gemeinnüzig genug werden dürfte, ein-
ſchränken ſollte. In dieſer Rückſicht habe ich
das gegenwärtige, minder koſtbare Verzeichniß
entworfen, welches jenen, die dieſes Kabinet
ſelbſt zu beſehen Gelegenheit haben, zu einem

Handbuche dienen, den von dieſer Hauptſtadt entfernten Naturforſchern aber immer noch einen zureichenden Begrif von den darinn befindlichen Seltenheiten geben kann.

Da ich in dieſem Verzeichniſſe bloß diejenigen natürlichen Körper, welche ſich wirklich in dieſem Kabinete befinden, anführen darf, ſo folgt aus dieſem Umſtande, daß ich ſolches nach keinem eigenen Syſteme, welches immer ſehr unvollkommen ausgefallen ſeyn würde, ordnen konnte, ſondern hiezu eines der ſchon bekannten Syſteme wählen mußte, wodurch ich zugleich der unvermeidlichen Schöpfung neuer

Benennungen, welche das Studium der Naturgeſchichte ſo ſehr erſchweren, auswich.

Bei dieſem erſten Theile, welcher das Verzeichniß der Konchylien enthält, habe ich nach einer ſorgfältigen Prüfung der meiſten Konchylien Werke das Linneiſche Syſtem gewählt, weil es, was man auch immer dagegen einwenden mag, unter den bisher bekannten, das vollſtändigſte iſt, die unterſcheidenden Kennzeichen der Geſchlechter, Abtheilungen und Arten — ſo viel es ſich in einem künſtlichen Syſteme, welches ſich bloß auf die Gehäuſe der Schalthiere gründet, thun läßt — am richtigſten und bündigſten angiebt, und dieſen

ſeinen Vorzug in ſo lang behaupten wird; bis uns nicht die Adanſone, Baſtere, und Otto Müllere der künftigen Zeiten, mit dem Scharfſinn dem Beobachtungsgeiſt und der Genauigkeit eines Swammerdams, Bradley, Poupart, und Reaumur ausgerůſtet, die vollſtåndige Beſchreibung der Geſtalt, Theile und Lebensart eines jeden Schalthieres liefern werden, um alsdenn ein natůrliches, oder der Natur ſich mehr nåherndes Konchylienſyſtem zu erbauen.

So pünktlich ich nun in dieſer Beſchreibung der Konchylien, der Linneiſchen Ordnung und Eintheilung nachgegangen bin, ſo habe ich dennoch meinem Führer nicht ſo knechtlich folgen

gen wollen, daß ich mir nicht hätte erlauben ſollen, die meiſten Beſtimmungen ſeiner Geſchlechter und Arten deutlicher zu erklären, und — wenn ich mich ſo was zu ſagen erkühnen darf — vielleicht zu verbeſſern. Auch wagte ich es die Benennungen der einzelnen Theile der Muſcheln anſtändiger auszudrücken; dann berichtigte ich die von Linne angeführten Figuren, ließ die zweydeutigen hinweg, und ergänzte dieſelben aus den neuern Konchyliologen, ohne mich durch die deutſche Ausgabe des Linneiſchen Naturſyſtems, und durch die Linneiſchen Regiſter in dem Knorriſchen Konchylienwerke, und in dem vierten Bande des Schröte-

 riſchen

riſchen Journals für die Liebhaber des Stein-reichs und der Konchyliologie irre führen zu laſſen.

Diejenigen Konchylien, welche in dem Linneiſchen Syſteme nicht enthalten ſind, beſchrieb ich nach dieſes berühmten Syſtematikers Methode, ordnete ſie in jene Familien, wohin er ſie vermuthlich ſelbſt geſezt haben würde, erklärte ſie durch eine weitläuftigere Beſchreibung ihrer Kennzeichen, und berief mich auf die Abbildungen, welche wir in der Beſchreibung des k. k. Kabinets ſowohl von dieſen als von allen jenen, die bisher in keinem Konchylien-

werke gemalet, oder etwan nicht gut gemalet ſind, liefern werden.

Endlich habe ich die holländiſchen, franzöſiſchen und engliſchen Trivialnamen aus den beſſern Schriftſtellern einer jeden Nation hinzugefügt, und die in dieſem Verzeichniſſe enthaltenen Geſchlechter, Unterabtheilungen, Arten und Abarten mit einem nach alphabetiſcher Ordnung hinzugeſezten Buchſtaben bezeichnet, um denjenigen, welche dieſes Kabinet beſuchen, die Auffindung der Stücke, die ſie etwann vorzüglich zu ſehen wünſchen, zu erleichtern.

Nach dieſem Plane werde ich in der Beſchreibung der übrigen Theile dieſer kaiſ. Sammlung

lung fortſchreiten; deren baldige Vollendung ich — ungeachtet meiner übrigen Beſchäftigungen — um ſo gewiſſer verſprechen darf, da mir dieſe Arbeit durch die freundſchaftliche Mitwirkung des Hrn. Helbling von Hirzenfeld — eines Mannes der von einem ſeltenen Hange zur Naturgeſchichte hingeriſſen, dieſe Wiſſenſchaft, in welcher er ſich die ausnehmendeſten Kenntniſſe erworben hat, ſein einziges Geſchäft ſeyn läßt, treflich erleichtert wird.

EXPLICATIO
CITATIONVM ABBREVIATARVM.

Erklärung
der
angeführten Verkürzungen.

Adans. Seneg. Hiſtoire naturelle du Sénegal. Coquillages par M. Adanſon, avec des figures. a Paris 1757. 4.

Argenv. Conch. Zoom. L'hiſtoire naturelle éclaircie dans une des ſes partie principales la Conchyliologie, augmentée de la Zoomorphoſie; nouvelle edition, avec des figures en taille douce, par M. (Argenville) a Paris 1757. 4.

Aldrov. [illegible] Ulyſſis Aldrovandi de exanguibus. Libri qua[illegible]r &c. cum figuris, Bononiae 1642. fol.

Baſt. Subſ. Jobi [illegible]teri Opuſcula ſubſeciva, Tomus I. & II. c[illegible] Figuris, Harlemi 1762. 1765.

Bell.

Bell. aq. Petr. Bellonii de aquatilibus, cum figuris Pariſ. 1553. fol.

Berlin. Mag. (Hrn. D. Martini) Abhandlung von Erdſchnecken mit Kupfern im II. und III. Bande des berliniſchen Magazins. Berlin 1766. 8.

— — (Ebendeſ.) Abhandl. von Konchylien der ſüſſen Wäſſer, mit Kupfern im IV. Bande des Berliniſchen Mag. 1767.

Bonan. Mus. Kirch. Muſeum Kircherianum a Philippo Bonnano S. I. cum figuris, Romae 1709. fol.

Brown. Hiſt. Jam. The civil and natural hiſtory of Jamaica with figures, by Patrik Browne. London 1756. fol.

Chem. Naturf. Herrn Paſt. Chemniz Abhandlung von dem innern Wunderbau mancher Schnecken, mit einer ausgemalten Kupfertafel im IX. Stücke des Naturforſchers. Halle 1776. 8.

Columm. purp. Fabii Columnae opuſculum de Purpura cum figuris. Kiliae 1675. 4.

Da Coſt. Elem. Elements of Conchology by Emanuel Mendes Da Coſta with ſeven illuminated Plates. London 1776. m. 8.

Dav.

Dav. Cat. ſyſt. Catalogue ſyſtematique, & raiſonné de Curioſités de la nature, & de l'art, qui compoſent le cabinet de M. Davila. avec figures en taille douce. Tome I. a Paris 1776. 8.

Ellis. Tranſact. An Account of ſeveral rare ſpecies of Barnacles in a Letter from. John Ellis. with figures, in the philoſophical Tranſactions. Vol. L. Part. II. for the Year 1758. Wittenberg. 1771. 4.

Fav. Dictionaire d'hiſtoire naturelle, qui concerne le teſtacées ou les coquillages de Mer, de terre, & d'eau-douce par M. l'Abbé Favart d'Herbigny. Tome I. — III. a Paris 1775. 8.

Geof. Traité ſommaire des coquilles tant fluviatiles, que terreſtres, qui ſe trouvent aux environs de Paris par M. Geoffroy. a Paris 1767. 12.

Gev. Beluſt. Monatliche Beluſtigungen im Reiche der Natur an Konchylien und Seegewächſen mit illuminirten Kupfern. Hamburg 1755. gr. 4. mit deutſch und franzöſiſchen Text.

Ginan. adr. Opere poſtume del Conte Giuſeppe Ginanni Ravennate con figure, Tomo II. in Venezia 1757. fol.

Gualt.

Gualt. Teſt. Index teſtarum conchyliorum, quae adſervantur in Muſeo Nicolai Gualtieri cum tabulis aeneis. Florentiae 1742. fol.

Helbl. Abh. e. Priv. Geſ. in Boehm. Georg. Sebaſt. Helblings Beiträge zur Kenntniß neuer und ſeltener Konchylien mit Kupfertafeln, im IV. Bande der Abhandlungen einer Privatgeſellſchaft in Böhmen. 1778. gr. 8.

Hill. Hiſt. of. Anim. An Hiſtory of Animals illuſtrated with figures. by John Hill. London 1752. fol.

Klein Meth. Oſtr. Jac. Theod. Klein Tentamen methodi oſtracacologicae cum figuris. Lugd. batav. 1753. 4.

Knor. Del. Nat. Deliciae naturae, von Georg Wolfg. Knorr, mit deutſchen und franzöſiſchen Text und ausgemalten Kupfertafeln. I. Theil. Nürnberg 1766. gr. fol.

Knor. Vergn. Vergnügen der Augen und des Gemüthes in Vorſtellung einer Sammlung von Schnecken und Muſcheln, mit ausgemalten Kupfertafeln I. — VI. Theil. Nürnberg. 1757 — 1772. 4.

Mus.

Koelr. nov. com. petr. Deſcriptio tubiporae maris albi indigenae, auctore J. T. Koelreuter cum tabulis aeneis in nouis commentariis academiae ſcientiarum petropolitanae. Tom. VII. Petropoli 1761. 4.

Linn. S. N. Car. a Linné Syſtema naturae, editio duodecima. Holmiae 1766. Tom. I. m. 8.

Linn. It. vveſtg. Karl von Linne Reiſen durch einige ſchwediſche Provinzen II. Theil, welcher die Reiſe durch Weſtgothland enthält. mit Kupfern. Halle 1765. gr. 8.

Liſt. angl. Martini Liſter, Hiſtoriae animalium angliae tres tractatus, unus de araneis, alter de cochleis tum terreſtribus tum fluuiatilibus, tertius de cochleis marinis. cum figuris. Londini 1678. 4.

Liſt. Hiſt. Conch. Martini Liſter, Hiſtoriae conchyliorum liber I — IV. Volumina duo cum tabulis aeneis. Londini 1685 — 1688. fol.

Mart. berlin. Beſchaeft. Konchyliologiſche Rhapſodien von Friedr. Heinr. Wilh. Martini; im II. Bande der Beſchäftigungen der Geſellſchaft naturforſchender Freunde zu Berlin, mit gemalten Kupfern. Berlin 1776. gr. 8.

Ebendeſſelben — Zwoſchalige Konchylien überhaupt beſchrieben; mit ausgemalten Kupfern im III. Bande derſelben Beſchäftigungen. Berlin 1777. gr. 8.

Mart. Konch. Kab. Neues ſyſtematiſches Konchylienkabinet von Fried. Heinr. Wilh. Martini, I — IV. Band mit illuminirten Kupfertafeln. Nürnberg 1769 — 1778. 4.

Müll. Linn. Naturſ. Von Linne vollſtändiges Naturſyſtem aus dem Lateiniſchen von Phil. Ludw. Statius Müller mit Kupfern. VI. Th. 1. Band. Nürnberg 1775. gr. 8.

Müll. Hiſt. Verm. Vermium terreſtrium & fluuiatilium ſuccincta hiſtoria auctore Othon. Friderico Müller, Volumen II. Havniae 1774. 4.

Müll. Zool. dan. Zoologiae danicae icones editae ab Othone Friderico Müller. Faſciculus I. Hafn. 1777. fol.

Murr. Fund. Teſt. Fundamenta teſtaceologiae auctore Adolpho Murray. Upſaliae 1771. 4.

Mus. Caes. Vindobon. Muſeum Caeſareum Vindobonenſe juſſu Mariae Theresiae Auguſtiſſimae edidit Ignatius Eq. a Born latine & germanice cum tabulis pictis. Beſchreibung des kaiſ. kön. Naturalienkabinets auf Befehl Ihrer Majeſtät der Kaiſerinn Königinn herausgegeben von Ignaz Edlen von Born, mit ausgemalten Kupfertafeln, deutſchen und lateiniſchen Text. Wien 1779. fol.

Mus. Olear. Adami Oleari Muſeum gottorpienſe. cum figuris. Schleſſv. 1674. 4.

Mus. Teſſin. Muſeum Teſſinianum opera Comitis Car. Guſt. Teſſin. latine & ſuecice, cum tabulis aeneis Havniae. 1753. fol.

Mus. Worm. Muſeum Wormianum ſeu Hiſtoria rerum tam naturalium, quam artificialium &c. adornata ab Olao Worm, cum iconibus. Lugd. batav. 1655.

Petiv. *Gaz.* Jacobi Petiveri Opera ad hiſtoriam naturalem ſpectantia. containing Gazophylacium naturae & artis &c. with figures. Volume I. London 1712 — 1767. fol.

Petiv. *amb.* Aquatilium animalium amboinae &c. icones & nomina with their latin, engliſch, and native names, and figures by James Petiver. London 1713. fol.

Planc. *Conch.* Jani Planci de conchis minus notis. Venetiis 1739. 4.

Reaum. *Mem. de Paris.* De differentes manieres dont pluſieurs eſpeces d'animaux de mer s'attachent au ſable, aux pierres & les uns aux autres par M. de Reaumur — Decouverte d'une

nouvelle teinture de Pourpre &c. avec figures, par le meme, dans l'hiſtoire de l'academie roiale de ſciences de l'année 1711. a Amſterdam 1715. 12.

Regenſ. Samml. Sammlung von Muſcheln, Schnecken und andern Schalthieren auf Befehl Seiner königl. Majeſtät von Dännemark ꝛc. mit deutſchen unb lateiniſchen Text, und illuminirten Kupfertafeln gezeichnet uud geſtochen, von Franz Michael Regenfuß. Kopenhagen 1758. Regalfolio. Ou Recüeil de coquillages, de Limaçons, & de cruſtacés par ordre de Sa Majeſté le Roi de Danemark gravés en taille douce, & illuminés de coleurs naturelles par Franc. Mich. Regenfuſs, avec le text francois & allemand. Coppenhague 1758. fol. roïal.

Rondel. Teſt. Guil. Rondeletii univerſae aquatilium hiſtoriae pars altera, cum figuris, folio transuerſo. Lugd. 1555. fol.

Rumph. amb. Georg Eberh. Rumph's amboiniſche Raritätenkammer von den ſteinſchalichten Thieren, mit Kupfertafeln, aus dem Holländiſchen überſezet von Ph. Ludw. Statins Müller, und mit Zuſäzen vermehret von Joh. Hieron. Chemniz. Wien 1766. fol.

Schlott.

Schlott. Act. helv. Obſeruatio phyſica de cochleis quibusdam, nec non de turbinibus nonnullis &c. Philipp Jac. Schlotterbeccii, cum figuris aeneis in actis helveticis phyſico medicis. Volum. V. Baſil. 1762. 4,

Schroet. Erd. Verſuch einer ſyſtematiſchen Abhandlung über die Konchylien um Thangelſtadt von Joh. Sam. Schröter m. K. Berlin 1771. 8.

Seb. Thes. Lucupletiſſimi rerum naturalium theſauri deſcriptio (idiomate latino & belgico) cum iconibus Albert. Seba. Tomus III. Amſtelod. 1757. fol. Regal.

Spengl. Berlin. Beſchaeft. Beſchreibung einer beſonders ſchönen Korallenmuſchel mit einer ausgemalten Abbildung. im II. Bande der Beſchäftigungen der Geſellſchaft naturforſchender Freunde zu Berlin. Berlin 1775. 8.

Ebendeſſelben. Beſchreibung einer ſeltenen Dünnmuſchel mit ausgemalten Figuren, im III. Bande derſelben Beſchäftigungen. Berlin 1776. 8.

Swammerd. Bibl. nat. Jo. Swammerdam Biblia naturae ſeu hiſtoria inſectorum in claſſes redacta, idiomate latino & belgico, cum tabulis aeneis. Lugdun. bat. 1737 — 1738. fol.

Valent. Abb. Franz Valentyns Abhandlung von Schneckenmuſcheln und Seegewächſen um Amboina aus dem Holländiſchen überſezet von Phil. Ludw. Statius Müller mit Kupfern. Wien 1773. fol.

Walch. Naturf. Beſchreibung einiger Konchylien von Jmanuel Walch, mit ausgemalten Figuren im achten Bande des Naturforſchers. Halle 1776. 8.

PARTES CONCHARVM
NONNVLLAE EXPLICATAE.

Erklärung
einiger Benennungen der Theile an Muſchelſchalen.

CARDO, Pars ambitus, vbi valuae cohoerent.

Das **Schloß** iſt derjenige Theil des Umfanges, an welchem die Klappen aneinander paſſen.

LATVS cardinis, ANTICVM; huicque oppoſitum POSTICVM vocatur.

Die Seite am Schloſſe heißt die **vordere**; die entgegengengeſezte die **hintere** Seite.

LIGAMENTVM, *Hymen Linn.* Membrana cartilaginea valuas connectens.

Das **Band** iſt die knorpelige Haut, welche die Klappen mit einander verbindet.

AREA ANTICA. *Vulua Linn.* Regio extra ligamentum; quae ſi introrſum decliuis ſit SINVS audit.

Die **Vorderfläche** iſt die Gegend auſſer dem Bande und heißt, wenn ſie einwärts abhängig iſt eine **Vertiefung**.

LABIA EXTERNA *Labia Linn.* ea vocantur, quae extra ligameutum locata ſunt.

Die äußeren Lefzen heißen diejenigen welche außer dem Bande ſtehen.

LABIA INTERNA, *Nymphae Linn*, ſunt labella intra ligamentum, & cum eo devincta.

Die inneren Lefzen heiſſen diejenigen kleineren Lefzen, welche inner dem Bande ſtehen, und mit demſelben verbunden ſind.

VMBONES, Protuberantiae ventricoſae valuae cuiusuis extra cardinem.

Die Backen ſind die bäuchigen Erhöhungen einer jeden Klappe außer dem Schloße.

APEX, *Nates Linn.* Protuberantiae cuiusuis finis attenuatus.

Die Spize iſt das Ende in welches ſich jede verdünnte Backe verlängert.

RIMA, Hiatus a ligamento tectus.

Die Spalte iſt die Oeffnung, welche von dem Bande gedecket wird.

AREA POSTICA aut AREOLA, *Anus Linn.*

Die Hinterfläche heißt die der Vorderfläche entgegengeſezte Seite.

GE-

GENERA TESTACEORVM.

METHODO LINNEANA.

Geſchlechter der Schalthiere

nach Linneiſcher Ordnung.

MVLTIVALVIA.	Pag.	Vielklappige.	Seite.
A. Chiton.	1.	A. Die Käfermuſchel.	1.
B. Lepas.	2.	B. Die Meereichel.	2.
C. Pholas.	7.	C. Die Steindattel.	7.
BIVALVIA.		**Zweyklappige.**	
D. Mya.	10.	D. Die Klafmuſchel.	10.
E. Solen.	13.	E. Die Meſſerſcheide.	13.
F. Tellina.	17.	F. Die Tellmuſchel.	17.
G. Cardium.	27.	G. Die Herzmuſchel.	27.
H. Mactra.	39.	H. Die Korbmuſchel.	39.
I. Donax.	40.	I. Die Stumpfmuſchel.	40.
K. Venus.	43.	K. Die Venusmuſchel.	43.
L. Spondylus.	63.	L. Die Klappmuſchel.	63.
M. Chama.	65.	M. Die Gienmuſchel.	65.
N. Arca.	72.	N. Die Arche.	72.

	Pag.		Seite.
O. Oſtrea.	80.	O. Die Auſter.	80.
P. Anomia.	101.	P. Die Baſtardmuſchel.	101.
Q. Mytilus.	106.	Q. Die Mießmuſchel.	106.
R. Pinna.	115.	R. Die Steckmuſchel.	115.
VNIVALVIA.		Einſchalige.	
A. Argonauta.	119.	A. Der Segler.	119.
B. Nautilus.	121.	B. Die Kammerſchnecke.	121.
C. Conus.	123.	C. Die Tutenſchnecke.	123.
D. Cypraea.	155.	D. Die Porzellanſchnecke.	155.
E. Bulla.	183.	E. Die Blaſenſchnecke.	183.
F. Voluta.	195.	F. Die Faltenſchnecke.	195.
G. Buccinum.	228.	G. Das Kinkhorn.	228.
H. Strombus.	264.	H. Die Flügelſchnecke.	264.
I. Murex.	282.	I. Die Stachelſchnecke.	282.
K. Trochus.	330.	K. Die Kräuſelſchnecke.	330.
L. Turbo.	345.	L. Die Mondſchnecke.	345.
M. Cornu. *	371.	M. Die Hornſchnecke *	341.
N. Helix.	372.	N. Die Schnirkelſchnecke.	372.
O. Nerita.	410.	O. Die Schwimmſchnecke.	410.
P. Haliotis.	427.	P. Die Ohrſchnecke.	427.
Q. Patella.	430.	Q. Die Napfſchnecke.	430.
R. Dentalium.	448.	R. Die Zahnſchnecke.	448.
S. Serpula.	452.	S. Die Röhrenſchnecke.	452.

TE-

* Vide tab. huius indicis. * Sieh die Tafel dieſes Verzeichniſſes.

TESTACEA.

Schalthiere.

Ordo primus. Erſte Ordnung.

Multiualuia. Vielklappige.

A. Chiton. A. Die Käfermuſchel.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 300.

Valuae plures longitudinaliter digeſtae, dorſo incumbentes.

Die Schale beſtehet aus mehrern, nach der Länge des Rückens hintereinander liegenden Klappen.

A. 1. Chiton ſquamoſus. A. 1. Die ſchuppige Käfermuſchel.

Linn. S. N. Sp. 5.

Teſta octouali carinata; valuulis oblique angulatis, ſtriatis, corio ſquamoſo.

Die acht Klappen der Schale ſind oben kielförmig, der Quere nach eckig, und geſtreift, mit einer ſchuppigen Haut.

Petiv. Gaz. t. 1. *f.* 3. ?

Mus. Caes. Vindobon.

A. 2. Chiton cinereus. A. 2. Die kleine Käfermuſchel.

A *Linn.*

Linn. S. *N.* *Sp.* 8.

Teſta octoualui obtuſe carinata, planiuſcula, cinerea.

Die etwas flache aſchengraue Schale hat einen ſtumpfen Rücken, und beſtehet aus acht Klappen.

Inſidens oſtreae eduli L.

Sie ſizt auf einer gemeinen Auſter.

Adanſ. *Seneg.* *Pl.* 2. *f.* 11.

Mus. Caes. Vindobon.

B. Lepas.

B. Die Meereichel.

Linn. *Syſt.* *Nat.* *Gen.* 301.

Valuae plures inaequales, per paria oppoſita affixae.

Die feſtſizende Schale beſtehet aus mehrern ungleichen, einander paarweiſe entgegen geſezten Klappen.

B. 1. Lepes Balanus.

B. 1. Die große Meereichel.

Linn. S. *N.* *Sp.* 10.

Belg. Zee puiſten. *Gall.* Gland de Mer Tulipe. *Dav.* *Angl.* The common engliſch Barnacle. *Ellis.*

Teſta conica truncata, valuis longitudinaliter ſulcatis; areis interjectis transuerſe ſtriatis.

Die kegelförmige oben abgeſtuzte Schale hat nach der Länge gefurchte Klappen, und in die Quere geſtreifte Zwiſchenflächen.

Oper-

Operculum valuulis quatuor, binis conniuentibus, unguiculatis, altioribus; binis transuerſe ſulcatis, minoribus.

Der Deckel beſtehet aus vier kleinen Klappen, deren zwo, die unter einem Winkel zuſammenſtoßen, klauenförmig und höher; zwo aber in die Quere gefurchet, und kleiner ſind.

Inſidet Murici deſpecto.

Sie ſitzt auf einer nordiſchen Spindel feſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 286.
Ellis. Tranſact. *angl.* 1758. *t.* 34. *f.* 17.
Baſter. Subs. t. 12. *f.* 7 — 10.
Mus. Caes. Vindobon.

B. 2. Lepas balanoides. B. 2. Die Seepocke.

Linn. S. *N.* *Sp.* 11.

Belg. Zee pocke. *Gall.* Glands de mer rayés. *Dav. Angl.* The narrow mouth'd grey Balanus *Hill.*

Teſta conica truncata, valuis glabris, operculis obtuſis.

Die kegelförmige abgeſtutzte Schale hat glatte Klappen, und ſtumpfe Deckeln.

Liſt. angl. t. 5. *f.* 41.
—— *Hiſt. Conch. l.* 3. *f.* 287.
Klein. Meth. Oſtrac. t. 12. *f.* 94. 95.
Argenv. Conch. Pl. 26. *f.* D.
Hill. Hiſt. of. Anim. 11. *Pl.*
Da Coſt. Elem. Pl. 1. *f.* 12.

B. 3. Lepas Tintinabulum. — B. 3. Die Meertulpe.

Linn. S. N. Sp. 12.

Belg. Tulpen; *Rumph. Angl.* The great wide mouth'd Balanus. *Hill. Gall.* Gland de mer Turban. *Dav.*

Teſta conica, gibba, areis transuerſe ſtriatis. — Die kegelförmige ungleiche Schale hat in die Quere geſtreifte Zwiſchenflächen.

α coloris roſei. — α roſenfarbig.

Mus. Caes. Vindobon.

β ex roſea violacea. — β roſenfarbig und violet.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 3. *f.* 285.
Rumph. amb. *t.* 41. *f.* *A.*
Gualt. *Teſt.* *t.* 106. *f.* *H.*
Ellis. Trans. *angl.* 1758. 34. *Pl.* 8. *f.*
Argenv. Conch. *Pl.* 26. *f.* *A.*
Hill. *Hiſt.* of. *Anim.* *Pl.* 11.
Knor. *Vergn.* *II.* 2. *t.* 6. *f.*
—— —— *V.* 30. *t.* 1. *f.*

B. 4. Lepas Diadema. — B. 4. Die Wallfiſchpocke.

Linn. S. N. Sp. 13.

Belg. Zeeſchelling. *Rumph. Angl.* The wrinkled. Star-Cake. *Petiv. Gall.* Pou de Baleine. *Dav.*

Teſta

Teſta ſubcylindrica, valuis longitudinaliter ſulcatis, coſtis decuſſatim, areis transuerſe ſtriatis.

Die etwas walzenförmige Schale hat nach der Länge gefurchte Klappen, mit kreuzweiſe durchſchnittenen Ribben, und in die Quere geſtreiften Zwiſchenflächen.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 3. f. 288.
Petiv. amb. t. 1. *f.* 11.
Rumph. amb. Rarit. K. *t.* 14. *f. H.*
Gualt. Teſt. t. 160. *f. Q.*
Mus. Caes. Vindobon.

B. 5. Lepas teſtudinaria.

B. 5. Die Schildkrötenpocke.

Linn. S. N. Sp. 14.

Belg. Shildpa de Luis. *Rumph. Angl.* The tortoiſe-wart Barnacle. *Ellis. Ital.* Ballano, *Gin.*

Teſta ſuborbiculari planoconuexa laeui, intus lamellis ſerrulatis; areis excauatis, transuerſe ſulcatis.

Die ſcheibenrunde, unten flache, oben erhabene und platte Schale hat inwendig gezähnelte Blättchen, und ausgehöhlte nach der Quere gefurchte Zwiſchenflächen.

Operculum valuis ſex, binis horizontalibus, quatuor erectis, obtuſis, conniuentibus, rima ſupera longitudinali.

Der Deckel beſtehet aus ſechs kleinen Klappen, davon zwo wagrecht, vier ſtumpfe aber, aufgerichtet gegen einander geneigt ſtehen, und in die Höhe eine nach der Länge laufende Spalte bilden.

Bonan. Mus. Kirch. cl. I. f. 36.

Petiv. Gaz. t. 9. f. 9.

Rumph. amb. 40. t. K.

Planc. Conch. t. 5. f. 2. 3.

Gualt. Teſt. t. 106. f. M. N. O.

Klein. Meth. Oſtr. t. 12. f. 99.

Ellis. Trans. angl. 1758. t. 34. f. 12. 13.

Ginan. adr. II. t. 30. f. 175.

Knor. Vergn. III. 30. t. 3. 4. f.

B. 6. Lepas anatifera. B. 6. Die Aentenbrut.

Linn. S. N. Sp. 18.

Holl. Eende Schulpe. *Angl.* The gooſe Schell. *Hill. Gall.* Conque anatifere *Dav. Ital.* Conca anatifera. *Gin.*

Teſta compreſſa quinqueualui laeui, affixa inteſtino membranaceo.

Die zuſammengedrückte Schale beſtehet aus fünf glatten Klappen, und ſitzet Mittels einer darmförmigen Haut feſt.

Aldrov. Teſt. l. 3. p. 544.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 2.

Mus. Wormian. p. 256.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 282.

Planc. Conch. t. 5. f. 4.

Gualt. Teſt. t. 106. f. A. D.

Seb. Thes. III. t. 16. n. 1. a, b.

Hill.

Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 11.
Ginan. adr. II. *t.* 30. *f.* 182.
Knor. Vergn. II. 30.} *t.* 4. 5. *f.*
Müll. Linn. Nat. Syſt. VI. 1. *B.* 10. *t.* 8. *f.*
Da Coſt. Elem. 1. *Pl. f.* 11.

C. Pholas. — C. Die Steindattel.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 302.

Teſta biualuis, lata, utrinq. diuaricata, acceſſoriis prope cardinem; cardinis margo replicatus, ligamento nexus intermedio.

Die Schale iſt zweyklappig, breit, an beiden Enden klafend, mit einigen Nebenſchalen am Schloße. Das Schloß hat einen auswärts übergeſchlagenen Saum, und ein darzwiſchen liegendes Band.

C. 1. Pholas Dactilus. — C. 1. Der Steinbohrer.

Linn. S. N. Sp. 20.

Belg. Steen-Scheede. *Angl.* The oblong withe Pidak *Hill. Gall.* Dail. *Ital.* Ballano. *Ginan.*

Teſta lata, ventricoſa, plicis transuerſis, ſtriisque lon-

Die bäuchige Schale iſt nach ihrer geſtreckten Breite gefal-

 gitu-

gitudinalibus decuſſata, poſtice reticulata.

ten, der Höhe nach kreuzweiſe geſtreifet, hinterwärts nezförmig.

Aldrov. Teſt. *l.* 3. *p.* 455. *f.* 3.
Rond. Teſt. *t.* 23. *f.* 2.
Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 25. 26. 27.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 276.
Petiv. Gaz. *t.* 79. *f.* 10, 11.
Gualt. Teſt. *t.* 105. *f.* *A.* *B.* C. D.
Seb. Thes. III. *t.* 16. *f.* 6.
Hill. Hiſt. of. *Anim.* 11. *Pl.*
Ginan. adr. II. *t.* 31. *f.* 184.
Murray. Fund. *Teſt.* *t.* 2. *f.* 3.
Mus. Caes. Vindobon.

C. 2. Pholas coſtatus.

C. 2. Der geribbte Steinbohrer.

Linn. *S.* *N.* Sp. 21.

Belg. Eeviger Gapper. *Angl.* The deeply furrowed Pholas. *Hill.* *Gall.* La grande Pholade de l'Amerique. *Favart.*

Teſta lata ventricoſa transverſe ſtriata, coſtis longitudinalibus, extimis acutis remotioribus.

Die Schale iſt in die Breite geſtrecket, bäuchig, in die Quere geſtreifet, mit nach der Länge laufenden Ribben, deren äuſſerſte ſcharf ſind, und etwas von einander entfernet ſtehen.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 277.
Gualt. Teſt. *t.* 105. *f.* G.
Knor. *Vergn.* II. 25. *t.* 4. *f.*



C. Schütz.

Or-

Ordo ſecundus. Zweyte Ordnung.

Biualuia. Zweyklappige.

D. Mya. D. Die Klaſmuſchel.

Linn. S. *N.* *Gen.* 303.

Teſta biualuis, altera extremitate hians; cardinis dente primario craſſo.

Die zweyklappige Schale klaſt an einem Ende; der Hauptzahn des Schloſſes iſt dick.

D. 1. Mya Glycimeris. D. 1. Die bäuchige Klaſmuſchel.

Teſta umbonata, extremitatibus oblique truncatis, dente antico craſſiſſimo, longitudine ligamenti.

Die bäuchige Schale hat ſchiefe ſtumpfe Seitenende, und einen ſehr dicken Vorderzahn nach der Länge des Bandes.

Aldrov. *Teſt. l.* 9. *p.* 473. 474.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 258.
Gualt. Teſt. t. 9. *f. A.*
Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſubouata umbonata laeuis, pone apices utrinque coarctata, extremitates oblique truncatae hiantes; Dens anticus fere longitudine ligamenti, craſſiſſimus, poſticus minor, ſubjacens apicibus

Die etwas eyförmige bäuchige und glatte Schale iſt an den Spizen beiderſeits ausgeholet. Die Seitenende ſind ſchief und ſtumpf. Der Vorderzahn iſt ſehr dick, faſt von der Länge des Bandes: der in-

incurvatis, retro quos ſeries crenularum extenditur. Color pallido griſeus.

Hinterzahn iſt kleiner, liegt unter den einwärts gekrümmten Spitzen, hinter welchen eine Reihe kleiner Kerbe ausläuft; ihre Farbe iſt lichtgrau.

D. 2. Mya pictorum.

D. 2. Die Mahlermuſchel.

Linn. S. N. Sp. 28.

Gall. Moule des peintres. *Angl.* The Pearl River Muscle. *Da Coſt.* *Ital.* Concha de Pittori. *Ginan.*

Teſta lata, convexa, cardinis dente primario crenulato, laterali elongato, quovis in altera teſta duplicato.

Die Schale iſt breit, eyförmig, und bäuchig, der Hauptzahn iſt gekerbet, der Nebenzahn verlängert, und an einer Klappe doppelt.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 40. 41.

Liſt. angl. t. 2. f. 30.

—— *Hiſt. Conch.* l. 2. f. 146. 147.

Swammerd. Bibl. nat. t. 10. f. 6, 7.

Gualt. Teſt. t. 7. f. E.

Berlin. Magaz. IV. 12. t. 66. 67. f.

Ginan. adriat. II. t. 4. f. 17.

Da Coſt. Elem. 7. Pl. 12. f.

D. 3. Mya margaritifera.

D. 3. Die Flußperlmuſchel.

Linn.

Linn. *S. N. Sp.* 29.

Gall. Telline fluviatile. *Dav.*

Teſta lata, ouata, planiuſcula, infra coarctata, dente primario craſſo, lateralibus elongatis.

Die Schale iſt breit, eyförmig, etwas platt gedrücket, am Unterrande eingebogen; der Hauptzahn dick und die Nebenzähne verlängert.

Liſt. *Hiſt. Conch. l.* 2. *f.* 149.
Klein. *Meth. Oſtr. t.* 10. *f.* 47.
Berlin. Magaz. IV. 12. *t.* 65. *f.*
Knor. *Vergn. IV.* 25. *t.* 2. *f.*

D. 4. Mya Vulſella. — D. 4. Der Bartkneiſer.

Linn. *S. N. Sp.* 31.

Belg. Baardnyper. *Rumph.*

Teſta elongata linguiformi, cardine terminali concauo rotundato.

Die Schale iſt der Höhe nach zungenförmig verlängert; das Schloß bildet am Unterende eine rundliche Höhlung.

Rumph. *amb. n.* 46. *t. A.*
Gualt. *Teſt. t.* 90. *f. H.*
Mus. *Teſſin. t.* 6. *f.* 3.
Knor. *Verg. V.* 2. *t.* 1. — 3. *f.*

Ha-

Habitu a congeneribus diuerſiſſima, oſtreisque linnealis proprior.

Dem Anſehen nach unterſcheidet ſich dieſe von allen ihren Nebenarten, ſie gehöret auch mit mehr Recht unter das Geſchlecht der Auſtern des Linne.

E. Solen.

E. Die Meſſerſcheide.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 104.

Teſta biualuis, aequiualuis, latiſſima, utrinque hians. Cardinis dens unus reflexus aut duplex, non inſertus teſtae oppoſitae.

Die Schale beſtehet aus zwoen gleichen Klappen, welche in die Breite ſehr verlängert ſind, und an beiden Enden klafen. Der Zahn des Schloßes iſt zurückgebogen, oft doppelt, und beißet nicht in die entgegengeſezte Klappe ein.

E. 1. Solen. Vagina.

E. 1. Die Rinne.

Linn. S. N. Sp. 33.

Belg. Orgelpypen. *Rumph. Angl.* The thick Razor-Shell. *Hill. Gall.* Manche de Couteau. *Dav. Ital.* Languetti.

Teſta

Teſta lineari, recta; cardine prope extremitatem alteram truncatam unidentato.

Die Schale iſt gleichbreit und gerad, nahe am abgeſtumpften Ende mit einem einfachen Zahne verſehen.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 256.
Rumph. amb. 45. *f.* M.
Gualt. Teſt. t. 95. *f.* D.
Argenv. Conch. Pl. 24. *f.* K.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 10.
Klein. Meth. Oſtrac. *t.* 11. *f.* 65.
Knor. Vergn. I. 28. *t.* 3. *f.*
Ginan. adriat. *II. t.* 27. *f.* 170.
Da Coſt. Elem. Pl. 7. *f.* 8.

E. 2. Solen Siliqua. E. 2. Das Meſſerheft.

Linn. S. *N.* Sp. 34.

Belg. Meſſehecht. *Angl.* The little ſtrait Razor. *Hill. Gall.* Manche decouteau lemelle. *Venet.* Cappa lunga. *Bonon.* Peſche canella.

Teſta lineari recta, extremitatibus rotundatis, cardine pone alteram bidentato.

Die Schale iſt gleich breit, und gerad, die Ende ſind rundlicht, an einem davon iſt das Schloß mit zween Zähnen verſehen.

Bell.

Bell. aq. t. 414. *f.* 2.
Liſt. angl. t. 5. *f.* 37.
—— *Hiſt. Conch. l.* 2. 255. *f.*
Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 57.
Planc. Conch. *t.* 3. *f.* 6.
Gualt. Teſt. t. 95. *f.* C.
Argenv. Conch. *Pl.* 24. *f. M.*
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 10.
Müll. Linn. N. S. VI. 1. *B* 11. *t.* 1. *f.*
Mus. Caes. Vindobon.

E. 3. Solen Enſis. — E. 3. Die Erbſenſchotte.

Linn. S. N. Sp. 35.

Belg. Beu ldoublet. *Angl.* The bluciſch crooked Razor. *Hill. Gall.* Manche de couteau courbée. *Dav.*

Teſta lineari ſubarcuata, extremitate utraque rotundata, cardine pone alteram bidentato.

Die Schale iſt gleichbreit, etwas gekrümmet, an beiden Enden rundlich, an deren einem das Schloß mit zween Zähnen verſehen iſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 257. *A.*
Argenv. Conch. Pl. 24. *f.* L.
Hill. Hiſt. of. Anim. 10. *Pl.*
Knor. Vergn. VI, 7. *t.* 1. *f.*

E. 4.

E. 4. Solen radiatus.	E. 4. Die blaue Strahlſcheide.
Linn. S. N. Sp. 38.	

Belg. De violetblauwe. Zonneſtraal. *Rumph. Gall.* Le ſoleil le vant. *Dav. Angl.* The violet-purple papyraceus Solen. *Hill.*

Teſta lineari recta, ſubdiaphana, laeui, coſta cardinis obliqua, depreſſa.	Die Schale iſt gleich breit, gerad, halb durchſichtig und glatt. Die Ribbe inner dem Angel lauft ſchif, und iſt platt gedrückt.
Violacea radiis quatuor albis.	Violetfärbig mit vier weiſſen Strahlen.

Liſt. Hiſt. Conch. *t.* 3. *f.* 266.
Rumph. amb. 45. *t.* E.
Petiv. amb. *t.* 21. *f.* 16.
Gualt. Teſt. *t.* 91. *f.* E.
Argenv. Conch. *Pl.* 22. *f.* P.
Knor. Delic. *I. t. B. III. f.* 9.
—— *Vergn. I.* 6. *t.* 5. *f.*

E. 5. Solen ſtrigilatus.	E. 5. Die roſenrothe Strahlſcheide.
Linn. S. N. Sp. 39.	

Belg. Rooſe-roodt Zonneſtraal. *Angl.* The thick red Solen. *Hill. Gall.* Lanterne rouge rayonnée de blanc.

Teſta lineari recta, craſſa, conuexa, lineis oblique inſculptis, coſta cardinis nulla.	Die Schale iſt gleichbreit, gerad und dick, die Klappen gewölbt, mit ſchiefen ausgeſchnittenen Linien, ohne Angelrippe.
Roſea, radiis duobus albis.	Roſenfarbig mit zween weißen Strahlen.

Bonan. Recr. el. 2. f. 77.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 260.
Gualt. Teſt. t. 91. f. C.
Adans. Seneg. Pl. 19. f. 2.
Knor. Vergn. VI. 5. t. 4. f.

F. Tellina.	F. Die Tellmuſchel.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 305.

Teſta biualuis antice hinc inflexa; dentes laterales alterius teſtae plani.	Die zweyklappige Schale iſt am Vorderrande umgebogen. Die Seitenzähne ſind an einer Klappe platt.
F. I. Ouatae craſſiuſculae.	F. I. Mit eyförmigen dicken Schalen.
F. I. 1. Tellina lingua felis.	F. I. 1. Die Kazenzunge.

Linn. S. N. Sp. 45.

 Belg.

Belg. Katetonge *Rumph.* *Gall.* Le Chagrin *Dav.*

Teſta lata ſubouata, ſcabra ſquamis fornicatis quincuncialibus.

Die Schale iſt breit, eyrund, und mit hohlen ins Gevierte ſtehenden Schüppchen beſetzet.

Rumph. amb. t. 45. *f.* G.
Gualt. Teſt. t. 76. *f.* B.
Klein Meth. Oſtr. t. 11. *f.* 62.
Knor. Vergn. II. 2. *t.* 1. *f.*

F. I. 2. Tellina rugoſa.

F. I. 2. Die runzelichte Tellmuſchel.

Teſta ſubouata lata, rugis membranaceis transuerſis, rima hiante.

Die etwas eyförmige breite Schale hat häutige nach der Quere laufende Runzeln, und eine klafende Spalte.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta lata, ſubouata, ſcabra, membranis eleuatis rugoſis transuerſis. Rima hians. Labra prominula. Apices acuti contingui, antrorſum recurui. Ligamentum inueſtiens labra, alterumque retro apices tenuius. Color totius teſtae albus.

Die Schale iſt breit, etwas eyförmig, und durch querlaufende erhabene dünne Runzeln rauh. Die Spalte klafet. Die Lippen ragen hervor. Die Spitzen ſind dünn, vorwärts gekrümmet, und berühren einander. Die Lippen werden von dem Bande bedecket, ein anderes dünneres Band läßt ſich hinter den Spitzen wahrnehmen. Die Farbe der ganzen Schale iſt weiß.

F. I. 3. Tellina virgata.

F. I. 3. Der geſtreifte Sonnenſtrahl.

Linn.

Linn. S. N. Sp. 46.

Belg. Zonnenſtraal. *Rumph. Angl.* Rayed Tellin. *Petiv.* *Gall.* Telline radiée *Dav.*

Teſta lata ſubouata, antice angulata, lineis eleuatis transuerſis, radiis rubentibus.

Die breite etwas eyförmige, und vorne eckige Schale hat erhabene Querlinien, und rothe Strahlen.

Rumph. amb. t. 45. *f. H.*
Petiv. amboin. t. 17. *f.* 19.
Argenv. Conch. Pl. 25. *f. A.*
Knor. Vergn. II. 21. *t.* 4. *f.*
—— —— *IV.* 25. *t.* 1. *f.*

F. I. 4. Tellina angulata.

F. I. 4. Die eckige Tellmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 47. ?

Teſta lata ſubouata, ſtriis transverſis recuruatis, antice oblique angulata, labris prominulis, dentibus lateralibus nullis.

Die breite etwas eylange, vorne ſchiefeckige Schale hat erhabene zurückgekrümmte Querſtreiſe, hervorragende Lippen, und keine Seitenzähne.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 241.
Mus. Caes. Vindobon.

F. I. 5. Tellina Gari.	F. I. 5. Die Bacaßanmuſchel.

Linn. S. *N.* *Sp.* 48.

Belg. Bacaſſandoublet *Rumph.* *Gall.* Telline bariolée de violet, & de blanc. *Argenv.*

Teſta lata ſubaequilatera, ſtriis transuerſis deflexis, labris prominentibus, dentibus lateralibus nullis.	Die breite beinahe gleichſeitige Schale hat zurückgebogene Querſtreiſe, und keine Seitenzähne.
Violacea, radiis pallidis.	Violetblau mit blaßen Strahlen.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 3. *f.* 261.
Rumph. *amb.* *t.* 45. *f.* *D.*
Argenv. Conch. *Pl.* 22. *f.* *J.*
Mus. *Caes.* *Vindobon.*

F. I. 6. Tellina anomala.	F. I. 6. Die unächte Tellmuſchel.
Teſta ſubouata lata, ventricoſa, longitudinaliter rugoſa, ſtriis transuerſis utrinque ſcabra, limbo antico intus violaceo.	Die etwas eyförmige breite bäuchige Schale iſt der Länge nach runzelicht, und durch Querſtreiſe an den Seitenenden rauh, inwendig am Vorderrande violet.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 273.
Knor. Vergn. II. 20. t. 1. f.
——— ——— *VI. 11. t. 2. f.*

Teſta ſubouata lata ventricoſa, antice utrinque obſolete carinata. Sulci longitudinales undulati, ſtriis transverſis prope extremitates exaſperati. Apices umbonati incuruati. Ligamentum craſſius ante apices, & retro hos tenuius alterum. Dentes primarii duo, alter bifidus, laterales nulli. Limbus internus praeſertim anticus violaceus.

Die Schale iſt etwas eyförmig, breit und bäuchig, an beiden Seiten vorne mit einer ſtumpfen Ecke verſehen. Nach der Länge herab laufen runzelichte Furchen, welche von Querſtreifen durchkreuzet den Seitenenden ein rauhes Anſehen geben. Die Spizen ſind aufgeblaſen und einwärts gekrümmet. Vor den Spizen iſt das gewöhnliche dicke Band, und hinter denſelben noch ein anderes dünneres. Das Schloß hat zween Hauptzähne, deren einer zweyſpaltig iſt. Die Seitenzähne fehlen. Der innere Rand iſt beſonders vorne violet.

α pallide luteſcens intus lutea.

α blaßgelb, inwendig gelb.

β alba apicibus violaceis, intus tota violacea.

β weiß, mit violeten Spizen und gleichfärbiger Höhlung.

γ violacea, alboradiata intus violacea, albaque.

γ Violet mit weißen Strahlen, mit blau und weiß gefleckter innerer Höhlung.

δ alba, cauitate & apibus miniatis.

δ weiß mit meningfarbiger Höhlung und Spizen.

F. II. Ouatae compreſſae.

F. II. Mit eyrunden platgedrückten Schalen.

F. II. 1. Tellina albida.

F. II. 1. Die blaßrothe Tellmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 50.?

Teſta lata ouali laeui, ſubtus tranſuerſe inaequaliter ſulcata, labiis prominentibus, dentibus lateralibus obſoletis.

Die breite eyförmige Schale iſt glatt, unten mit ungleichen Querfurchen, die Lippen ragen hervor, die Seitenzähne ſind undeutlich.

Knor. Vergn. IV. 3. t. 4. f.

—— —— V. 9. t. 3. f.

F. II. 2. Tellina punicea.

F. II. 2. Die dunkelrothe Tellmuſchel.

Teſta lata ouali, ſub aequilatera, glabra, ſtriis tranſuerſis approximatis.

Die breite eyförmige glänzende Schale iſt beinahe gleichſeitig, und mit gedrängt aneinander ſtehenden Querſtreifen überzogen.

Muſ. Caeſ. Vindobon.

Teſta oualis lata complanata, lateribus utrinque ſubaequalibus. Apices tenues breues. Labia tecta. Dentes primarii, & laterales ſecundum characterem generis. Color pallide incarnatus, prope apices & in ſuperficie interna puniceus.

Die Schale iſt breit, eyförmig, und platgedrückt, an den Seiten beinahe gleichlang. Die Spizen ſind kurz und fein. Die Lippen bedeckt. Die Hauptzähne haben wie die Seitenzähne das gemeine Merkmal dieſes Geſchlechtes. Die Farbe iſt an der Oberfläche fleiſchroth, an den Spizen und inwendig dunkelroth.

F. II. 3. Tellina planata.

Linn. S. N. Sp. 52.

F. II. 3. Die ſcharfrandige Tellmuſchel.

Teſta lata, ouata, compreſſa, transuerſim ſubſtriata, marginibus acutis.

Die breite eyförmige Schale iſt platt gedrückt, der Quere nach ſehr fein geſtreifet, an den Rändern ſcharf.

Gualt. Teſt. t. 89. *f.* G.

Mus. Caes. Vindobon.

F. II. 4. Tellina radiata.

F. II. 4. Der glatte Sonnenſtrahl.

Linn. S. N. Sp. 54.

Belg Een roode witſtraalige Tellmoſſel. *Angl.* The tulip tellina. *Da Coſt. Gall.* Telline rayée de couleur de chair. *Favart. Roman.* Capparozole. *Venet.* Capparole.

Teſta lata ſubſtriata glabra, labris hiantibus, areola lanceolata.

Die breite Schale iſt feingeſtreift und glänzend, mit hervorſtehenden Lippen und einer lanzetförmigen Hinterfläche.

Cauitas citrina. Apices roſei. Faſciae ſaepe radiantes roſeae.

Die Farbe der inneren Fläche iſt ſchwefelgelb, die Spizen und öfters auch die Strahlen ſind roſenroth.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 240.

Gualt. Teſt. t. 89. *f. J.*

Regenſ. Samml. I. 3. *t.* 28. *f.* 8. *t.* 22. *f.*

Knor. Vergn. II. 19. *t.* I. *f.*

—— —— *IV.* 2. *t.* 24. *f.*

—— *Del. nat. I. t. B. III. f.* 8.

Da Coſt. Elem. Pl. 6. *Fig.* II.

F. II. 5. Tellina roſtrata.

F. II. 5. Das Schinckchen.

Linn. S. N. Sp. 55.

Belg Banket Hammetjes. *Angl.* Wedge Muscle. *Petiv. Gall.* Pince de Chirurgien *Dav.*

Teſta ouata antice angulato roſtrata, transuerſim ſubtiliſſime ſtriata.

Die eyförmige Schale hat vorne einen verlängerten eckigen Schnabel, und iſt der Quere nach ſehr fein geſtreift.

α Flaua, roſtro breuiore.

α gelb, mit kürzerem Schnabel.

Mus. Caes. Vindobon.

β incarnata, roſtro longiore.

β fleiſchfarbig, mit längerem Schnabel.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 225.
Petiu. amboin. t. 17. f. 20.
Gualt. Teſt. t. 88. f. F.
Argenv. Conch. Pl. 22. f. O.
Knor. Vergn. II. 2. t. 5. f.

F. II. 6. Tellina inaequiualuis.

F. II. 6. Die Baſtardtelline.

Linn. S. N. Sp. 56.

Belg. Platzydige Telline.

Teſta

Teſta lata ouata roſtrata, valua altera plana, dentibus lateralibus nullis.

Die breite eylange ſchnabelförmige Schale hat eine ganz flache Klappe, und keine Seitenzähne.

Spengl. berlin. Beſchaeſt. III. 7. t. 25—28. f.

F. II. 7. Tellina incarnata.

F. II. 7. Der kleine Sonnenſtrahl.

Linn. S. N. Sp. 58.

Belg. Rood Juffertje.

Teſta lata ouata roſtrata complanata, apicibus acutis, pallido radiata.

Die Schale iſt breit eylang und ſchnabelförmig, mit feinen Spizen und weißen Strahlen.

Liſt. angl. app. t. 1. *f.* 8.
Gualt. Teſt. t. 88. *f. M.*
Mus. Caes. Vindobon.

F. III. Suborbiculatae.

F. III. Mit rundlichen Schalen.

F. III. 1. Tellina Remies.

F. III. 1. Die Sandtelline.

Linn. S. N. Sp. 62.

Belg. Remies. *Rumph.*

Teſta ſubrotunda, craſſa, transuerſim tenuiſſime ſtriata, rima patula.

Die rundliche dicke Schale iſt nach der Quere ſehr fein geſtreifet, und mit einer klaffenden Spalte verſehen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 2. f. 102.

Rumph. amb. t. 43. *f. J.*

Mus Caes. Vindobon.

F. III. 2. Tellina ſcobinata.

F. III. 2. Die ſchuppige Tellmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 64.

Gall. La guillochée. *Dav.*

Teſta orbiculari, ſcabra, ſquamis lunatis in quincuncem digeſtis.

Die ſcheibenrunde Schale iſt wegen der mondfärbigen ins Gevierte ſtehenden Schüppchen rauh anzufühlen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 143.

Gualt. Teſt. t. 76. *f.* E.

Knor. Vergn. VI. 37. *t.* 3. *f.*

F. III. 3. Tellina carnaria.

F. III. 3. Die Fleiſchlinſe.

Linn. S. N. Sp. 66.

Teſta

Teſta orbiculata, ſtriis obliquis, deorſum reflexis, undulatis.

Die ſcheibenförmige Schale hat eingeſchnittene ſchiefe und rückwärts herabgebogene wellenförmige Streiſen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 2. f. 176.

Mus. Caes. Vindobon.

F. III. 4. Tellina balthica.

F. III. 4. Die dreyeckige Tellmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 68.

Teſta triangulo rotundata, laeui, transuerſim ſubtiliſſime ſtriata, incarnata.

Die Schale iſt dreyeckig, rundlicht, glänzend, in die Quere ſehr fein geſtreifet, von fleiſchrother Farbe.

Mus. Caes. Vindobon.

G. Cardium.

G. Die Herzmuſchel.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 306.

Teſta biualuis, aequiualuis, dentibus cardinis mediis binis, alternatis; lateralibus remotis inſertis.

Die Schale beſtehet aus zwoen gleichen Klappen; an dem Schloße ſtehen zween wechſelweiſe Mittelzähne, mit entfernten einbeißenden Seitenzähnen.

G. 1.

G. 1. Cardium coſtatum. G. 1. Die geribbte Herzmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 73.

Belg. Geribte Venus doublet. *Rumph. Angl.* The exotick Heart Cockle. *Hill. Gall.* Conque exotique. *Dav.*

Teſta lata ventricoſa, coſtis longitudinalibus, carinatis, concauis.

Die breite und bäuchige Schale iſt nach der Länge herab mit kielförmigen hohlen Ribben beſezet.

Columm. purp. t. 27.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 164.

Rumph. amb. 48. *t.* 6. *f.*

Gualt. Teſt. t. 72. *f.* D.

Argenv. Conch. *Pl.* 23. *f. A.*

Adans. Seneg. *Pl.* 18. *f.* 2.

Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 10.

Knor. Vergn. I. 28. *t.* 2. *f.*

G. 2. Cardium Cardiſſa. G. 2. Das Menſchenherz.

Linn. S. N. Sp. 74.

Belg. Venus hart. *Angl.* human Heart-Cockle. *Hill. Gall.* Coeur de Venus. *Dav.*

Teſta cordata, valuis compreſſis carinatis, apicibus inflexis contiguis.

Die herzförmige Schale hat flachgedrückte kielförmige Klappen, mit eingerollten nahe aneinander ſtehenden Spizen.

α Ca-

α Carina valuularum integra. α mit ganzem Kiele.

β Carina valuularum crenata. β mit gekerbtem Kiele.

Bonan. Recr. el. 2. f. 49.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 155. 156.
Rumph. amb. t. 42. f. E.
Gualt. Teſt. t. 84. f. B. C. D.
Argenv. Conch. Pl. 23. f. J.
Klein. Meth. Oſtr. t. 10. f. 39.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 10.
Knor. *Vergn*. I. 18. t. 2. f.
—— —— *VI*. 11. t. 1. f.
Mus. Caes. Vindobon.

G. 3. Cardium retuſum. G. 3. Das Nabelherz.

Linn. S. N. Sp. 75.

Teſta cordata oblique carinata, ſinu poſtico lunari intruſo. Die herzförmige und ſchief gekielte Schale hat hinter den Spizen eine tief eingedrückte mondförmige Höhlung.

Valua ſolitaria. Eine einzelne Klappe.

Mus. Caes. Vindobon.

G. 4. Cardium imbricatum. G. 4. Das ſchuppige Herz.

Teſta

Teſta cordato trilatera, inter ſulcos longitudinales tenues transuerſe & denſe ſquamuloſa.

Die herzförmige dreyſeitige Schale iſt nach der Länge mit feinen Furchen, und dazwiſchen in die Quere mit dicht aneinander liegenden Schüppchen beſezet.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 3. f. 152.

Gualt. Teſt. t. 83. f. E.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta cordata trilateralis. Valuae utrinque angulatae longitudinaliter ſulcatae, ſulcis tenuibus, inter quos ſquamulae, undique arcuatae, & denſe imbricatae locantur. Margo crenatus, anticus ſerratus. Color teſtae niueus, ſquamularum citrinus.

Die Schale iſt herzförmig und dreyſeitig. Die Klappen ſind an beiden Seiten eckig erhoben, nach der Länge herab laufen linienförmige Furchen, zwiſchen welchen ſich allenthalben bogenförmige gedrängt aneinanderſtehende Schüppchen befinden. Der Rand iſt gekerbet, vorne ſägeförmig. Die Schale iſt von ſchneeweißer, die Schüppchen von zitronengelber Farbe.

G. 5. Cardium Hemicardium.

G. 5. Das dreyſeitige Herz.

Linn. S. N. Sp. 76.

Holl. Driezydig Venus hart. *Gall.* Coeur triangulaire *Dav. Angl.* Strawbery Heart Cockle. *Petiv.*

Teſta cordata ſubtrilatera, valuis angulatis, ſulcis tenuibus excauato punctatis, utrinque transuerſe tuberculatis.

Die Klappen der herzförmigen beinahe dreiſeitigen Schale ſind eckig, mit tief punktirten dünnen Furchen, und in die Quere ſtehenden Körnern beſezet.

Rumph.

Rumph. amb. t. 44. f. H.

Petiv. amb. t. 17. f. 4.

Gualt. Teſt. t. 83. f. C.

Knor. Vergn. VI. 3. t. 2. f.

G. 6. Cardium medium.

G. 6. Das Mittelherz.

Linn. S. N. Sp. 77.

Teſta ſubcordata, valuis, longitudinaliter ſulcatis, angulatis, laeuibus.

Die Klappen der einigermaßen herzförmigen Schale ſind nach der Länge gefurchet, eckig und glatt.

Knor. Vergn. V. 20. t. 5. f.

G. 7. Cardium aculeatum.

G. 7. Das Nagelherz.

Linn. S. N. Sp. 78.

Belg. gedornte Nageldoublet. *Angl.* Coeur de boeuf. epineux *Dav.* *Angl.* The Oxheart Cockle. *Hill.*

Teſta ſubcordata coſtis ſpinoſo ciliatis.

Die einigermaßen herzförmige Schale iſt mit ſpizen Dörnern beſezet.

α Spinis fornicatis compreſſis.

α Mit hohlen zuſammengedrückten Dörnern.

β Spinis fornicatis craſſis inflexis.

β Mit hohlen dicken umgebogenen, oder nagelförmigen Dörnern.

Aldrov.

Aldrov. Teſt. l. 3. p. 452.
Bonan. Recr. cl. 2. f. 96. 97.
Gualt. Teſt. t. 72. f. A.
Argenv. Concb. Pl. 23. f. B.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 10.
Knor. Vergn. VI. 3. t. 1. f.

G. 8. Cardium tuberculatum. — G. 8. Das knotige Herz.

Linn. S. N. Sp. 81.

Angl. Grain Cockle *Petiv.*

Teſta ſubcordata ſulcata, coſtis obtuſis transuerſe ſtriatis, extus nodoſis.

Die etwas herzförmige gefurchte Schale hat ſtumpfe, in die Quere geſtreifte, und außen knotige Ribben.

Rumph. amb. t. 48. f. 11.
Petiv. amb. t. 17. f. 7.
Knor. Vergn. V. 30. t. 2. f.

G. 9. Cardium Icoſardia. — G. 9. Das Ziegelherz.

Linn. S. N. Sp. 82.

Belg. Nagelſchulp. *Rumph.* *Gall.* Coeur. de boeuf tuilé. *Argenv.* *Ang.* The rough. Oxheartſhell. *Hill.*

Teſta

Teſta ſubcordata ſulcata, ſquamis fornicatis erectis.

Die einigermaßen herzförmige Schale iſt gefurchet, und mit aufgerichteten hohlen Schuppen beſezet.

Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 95.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 160.
Rumph. amb. *t.* 48. *f.* 9.
Petiv. Gaz. *t.* 152. *f.* 7.
Argenv. Conch. Pl. 23. *f.* M.
Hill. Hiſt. of. Anim. 10. Pl.
Regenſ. Samml. I. 5. *t.* 56. *f.*

G. 10. Cardium Unedo.

G. 10 Die rothe Erdbeere.

Linn. S. N. Sp. 84.

Belg. Aardbeſie. *Rumph.* *Angl.* The red Straw-Berry. *Gall.* La Fraiſe rouge. *Argenv.*

Teſta ſubcordata trilatera obtuſe angulata, multiſulcata, lunulis transuerſis coloratis ſparſis.

Die etwas herzförmige und dreyſeitige Schale hat an ihren Klappen ſtumpfe Ecken, viele Furchen, und zerſtreute gefärbte Querſchüppchen.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 375.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 151.

Rumph. amb. t. 44. f. F.
Gualt. Teſt. t. 83. f. A. B.
Regenſ. Samml. I. 3. t. 25. f.
Knor. Vergn. IV. 14. t. 3. f.
—— —— VI. 3. t. 4. f.
Da Coſt. Elem. 7. Pl. 8. f.

G. 11. Cardium magnum.

G. 11. Die groſſe Herzmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 86. ?

Teſta ſubcordata ventricoſa ſulcata, coſtis angulatis poſticis tranſuerſe, ſtriatis.

Die etwas herzförmige, bäuchige und gefurchte Schale hat eckige Ribben, deren hintere mit nach der Quere laufenden Streifen beſezt ſind.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 158.
Mus. Caes. Vindobon.

G. 12. Cardium leucoſtomum.

G. 12. Das gelbmündige Herz.

Teſta ſubouata ſulcata, coſtis anticis muricatis, poſticis tranſuerſim crenatis, areola lanceolata.

Die etwas eyförmige gefurchte Schale iſt an den Vorderribben rauh, an den Hinterribben nach der Quere gekerbet, ihre Hinterfläche iſt eyförmig.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 168.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſubouata craſſa, ſulcis 33. longitudinalibus. Coſtae compreſſae angulatae, poſticae muricatae, anticae ſquamulis denſe imbricatae; ſulci intermedii transuerſim ſtriati. Margo crenatus, antice ſerratus. Areola plana lanceolata, qua ab adfinibus differt. Limbus aurantii coloris.

Die Schale iſt dick, einigermaſſen herzförmig, mit 33 nach der Länge laufenden Furchen beſezt. Die Ribben ſind etwas flach gedrücket und eckig; die hinten ſtehenden ſind rauh, die vordern mit ziegelförmigen Schüppchen dicht beſezet. Die Zwiſchenfurchen ſind in die Quere geſtreifet. Der Rand iſt gekerbet, vorne ſägeförmig. Die Hinterfläche iſt platt und lanzetförmig, wodurch ſie ſich beſonders unterſcheidet. Der innere Rand iſt pomeranzenfarbig.

G. 13. Cardium flauum.

G. 13. Das gelbe Herz.

Linn. S. N. Sp. 87.

Teſta ſubouata, longitudinaliter obſolete ſulcata, margine crenato.

Die faſt herzförmige Schale iſt nach der Länge ſchwach gefurchet, und am Rande gekerbet.

Mus. caes. Vindobon.

G. 14. Cardium laeuigatum.

G. 14. Das glatte Herz.

Linn. S. N. Sp. 88.

Teſta ſubouata glabra, ſtriis longitudinalibus, obſoletis.

Die etwas eyförmige Schale iſt glatt, und mit matten Streifen nach der Länge beſezet.

Gualt. Teſt. t. 82. f. A.

Knor. Vergn. II. 20. t. 4. f.

—— —— V. 10. t. 7. f.

G. 15. Cardium aeolicum.

G. 15. Die Oſt- und Weſtmuſchel.

Belg. Ooſt en Weſt-Doublet.

Teſta ſubouata ſulcis tenuibus longitudinalibus, pliciſque transuerſis obtuſis poſtice.

Die etwas eyförmige Schale iſt mit dünnen Furchen nach der Länge, und rückwärts mit ſtumpfen Querfalten beſezet.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 91.

Knor. Vergn. V. 26. t. 2. f. 27. t. 3. f.

Teſta ſubouata umbonata glabra, longitudinaliter ſulcata, poſtice plicis transuerſis, complanatis, furſum imbricatis. Margo anticus circa ligamentum laeuis. Labia retro apices craſſa prominentia. Color albo roſeoque varius.

Die Schale iſt einigermaßen eyförmig, bäuchig und glatt, nach der Länge gefurchet, und hinten mit platt gedrückten aufwärts ziegelförmig geſtellten Falten verſehen. Der Vorderrand iſt neben dem Bande glatt. Hinter den Spizen ragen dicke Lippen hervor. Die Farbe iſt weiß mit Roſenroth vermenget.

G. 16. Cardium latum.

G. 16. Die breite Herzmuſchel.

Belg. Blaaſagtig Hart. *Gall.* Coeur enflé.

Teſta lata ouali, longitudinaliter ſulcato ſtriata, utrinque ſcabra, margine antico ſerrato.

Die breite eyförmige Schale iſt nach der Länge gefurchet und geſtreifet, an beiden Enden rauh, und am Vorderrande ſägeförmig.

Knor. Vergn. VI. 7. t. 6. f. ?

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta lata oualis, longitudinaliter ſulcato ſtriata. Coſtae anticae poſticaeque acutae, muricatae, mediae obtuſae laeues, interſtitiis duplicato ſtriatis. Umbones tenuiſſime ſtriati, antrorſum ſubcarinati; Apices incurui laeues. Cardo, dentibus generis characterem exhibens; Limbus ſtriatus. Margo anticus acute ſerratus.

Die breite eyförmige Schale iſt nach der Länge mit Furchen und Streifen beſezet. Die vordern und hintern Ribben ſind ſcharf und rauh, die mittleren ſtumpf und glatt, mit zweyfach geſtreiften Zwiſchenräumen. Die Wölbungen ſind ſehr zart geſtreifet und vorwärts einigermaßen kielförmig. Die Spizen ſind einwärts gekrümmet und glatt. Das Schloß hat an den Zähnen das dem Geſchlechte eigenthümliche Kennzeichen. Der innere Rand iſt geſtreift. Der Vorderrand hat ſcharfe ſägeförmige Ausſchnitte.

α alba, luteo maculata.

β alba, rubro maculata.

α weiß, und gelb geflecket.

β weiß mit rothen Flecken.

G. 17. Cardium pectinatum.

G. 17. Die kammähnliche Herzmuſchel.

Teſta rotundata complanata, coſtis triangulis, lateribus muricatis.

Die rundliche etwas flach gedrückte Muſchel hat dreyeckige Ribben, und rauhe Seiten.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſuborbiculata profunde ſulcata. Coſtae triangulae transuerſim crenatae; extimae ſquamulis fornicatis ſcabrae. Margo crenatus, anticus ſerratus. Superficies externa albida, maculis diſperſis fuſcis. Cauitas longitudinaliter ſulcata, alba.

Die Schale iſt einigermaßen ſcheibenrund, tiefgefurchet. Die Ribben ſind dreyeckig in die Quere gekerbet, die äußern davon ſind durch hohle Schüppchen rauh. Der Rand iſt gekerbet, vorne ſägeförmig. Die äußere Fläche iſt weiß mit zerſtreuten braunen Flecken. Die innere Höhlung aber ganz weiß und nach der Länge gefurchet.

G. 18. Cardium ruſticum.

G. 18. Das Hahnenherz.

Linn. S. N. Sp. 91.

Belg. Bonte Kokhaan. *Gall.* Le Coq bigarré.

Teſta ſubcordata, umbonata, antiquata, ſulcis remotis longitudinalibus, transuerſim rugoſis.

Die etwas herzförmige bäuchige Schale hat Anſäze, und nach der Länge laufende von einander entfernte Furchen, die in die Quere runzelicht ſind.

α alba, faſciis ferrugineis.

β niuea.

α weiß, mit rothbraunen Bändern.

β ſchneeweiß.

Aldrov. Teſt. l. 3. p. 480.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 166.

Rumph.

Rumph. amb. t. 44. f, K.
Gualt. Teſt. t. 71. f. M.
Regenſ. Samml. I. 8. t. 24. f. 12. t. 77. 78. f.
Knor. Vergn. VI. 8. t. 3. f.

H. Mactra. — H. Die Korbmuſchel.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 307.

Teſta biualuis aequiualuis. Cardinis dente medio complicato, cum adjecta foueola; dentibus lateralibus remotis inſertis.

Die Schale hat zwo gleiche Klappen. Der gefaltene Mittelzahn des Schloſſes hat neben ſich ein Grübchen, und etwas entfernte einbeißende Seitenzähne.

H. 1. Mactra Sprengleri. — H. 1. Die ſprengleriſche Korbmuſchel.

Linn. L. N. Sp. 94.

Teſta cordato triangulari, laeui, area complanata, utrinque carinata.

Die herzförmige dreyſeitige glatte Schale hat eine flache an beiden Seiten kielförmige Vorderfläche.

Gualt. Teſt. t. 85. *f.* F.

Knor. Vergn. VI. 34. *t.* 1. *f.*

H. 2. Mactra glauca.

Teſta ſubouata umbonata, apicibus laeuiſſimis, lateribus undique ſtriatis.

H. 2. Die fahle Korbmuſchel.

Die eyförmige bäuchige Schale iſt an den Spizen glatt, und an den Seiten allenthalben geſtreifet.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſubouata tenuis, conuexa, apicibus glabris. Area, areolaque indiſtincta, tenuiter ſtriata. Valuae ſolitariae dens primarius complicatus, laterales elongati. Color ſordide albidus.

Die eyförmige Schale iſt dünn, bäuchig, gegen die Spizen zu glatt. Die Vorder- und Hinterflächen ſind undeutlich und geſtreift. Der Hauptzahn der einzelnen Klappe iſt zuſammen gelegt, die Seitenzähne lang auslaufend. Die Farbe ſchmuzig weiß.

Valua ſolitaria.

Eine einzelne Klappe.

I. Donax.

I. Die Stumpfmuſchel.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 308.

Teſta biualuis, margine antico obtuſiſſimo. Dentibus inſertis, marginali poſtice ſolitario, ſubremoto.

Die zweyklappige Schale hat einen ſtumpfen Vorderrand. Die Zähne am Schloße ſind einbeiſſend, der hintere Seitenzahn ſtehet einzeln, und entfernet.

I. 1.

I. 1. Donax Scortum. — I. 1. Das Dreyeck.

Linn. S. N. Sp. 102.

Gall. Came coupée. *Dav.* *Angl.* The violet and white Chama *Hill.*

Teſta cordato triangulari; area explanata laeui, utrinque carinata, ſtriis transuerſis alternatim excurrentibus.

Die Schale iſt herzförmig, dreyſeitig, die Vorderfläche ausgebreitet und glatt, und an beiden Seiten kielförmig. Die Querſtriche verlängern ſich wechſelweiſe.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 220.
Argenv. Conch. Pl. 21. *f. L.*
Petiv. Gaz. t. 19. *f.* 11.
Hill. Hiſt of. Animal. Pl. 9.
Müll. Linn. Naturſyſt. VI. 1. *B.* 11. *t.* 5. *f.*
Mus. Caes. Vindobon.

I. 2. Donax pubeſcens. — I. 2. Die ſtachelichte Stumpfmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 103.

Teſta cordato triangulari decuſſatim ſtriata, area explanata utrinque carinata, ſpiniſque canaliculatis armata.

Die herförmige dreyſeitige Schale iſt kreuzweiſe geſtreifet, die Vorderfläche platt, und beiderſeits kielförmig, mit rinnenförmigen Stacheln beſezt.

Mus. Caes. Vindobon.

I. 3. Donáx Trunculus. I. 3. Das Stümpchen.

Linn. S. *N.* Sp. 105.

Belg. Stombje. *Gall.* La Tronquée.

Teſta cuneiformi, antice oblique truncata, laeui, limbo crenato.

Die keilförmige Schale iſt vorne ſchief abgeſtumpft, und glatt, am inneren Rande gekerbet.

Liſt. angl. t. 5. f. 35.
Bonan. Recr. cl. 2. f. 47.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 217.
Gualt. Teſt. t. 88. f. O.
Adans. Seneg. Pl. 10. f. 1.
Klein Meth. Oſtr. t. 11. f. 61.
Knor. Vergn. I. 7. t. 7. f.
Mus. Caes. Vindobon.

I. 4. Donax denticulata. I. 4. Die Säge.

Linn. S. *N.* Sp. 107.

Belg. Zaagertjes. *Gall.* La Scie. *Dav.*

Teſta cuneiformi, ſtriata, antice obtuſiſſima, transuerſe

Die keilförmige Schale iſt geſtreifet, vorne gerad abgeru-

rugoſa, limbo denticulato. ſtumpft und nach der Quere runzelicht, am inneren Rande gezähnelt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 219.

Petiv. Gaz. t. 18. f. 4.

Knor. Vergn. II. 23. t. 3, 4, 5. f.

I. 5. Donex cuneata. I. 5. Der Keil.

Linn. S. N. Sp. 108.

Teſta cuneiformi compreſſa laeui, antice rugoſa, margine integerrimo.

Die keilförmige Muſchel iſt platt gedrückt und glatt, am Rande ganz.

Knor. Vergn. V. 7. t. 3. f.

K. Venus. K. Die Venusmuſchel.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 309.

Teſta biualuis, aequiualuis, ſinu longitudinali; areola veſtigiata. Cardinis dentes tres approximati, laterales diuergentes.

Die Schale, welche aus zwoen gleichen Klappen beſtehet, hat vorne eine längliche Vertiefung, und eine eingedrückte Hinterfläche. Am Schloſſe ſtehen drey Zähne nahe beiſammen, deren äuſſere auswärts laufen.

K. I Teſtae ſubcordatae, antice muricatae.

K. I. Herzförmige vorne rauhe Schalen.

K. I. 1. Venus Dione.

K. I. 1. Die ächte Venusmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 112.

Belg. De rechte Venus-Schulp mit Hair, *Rumph. Angl.* The Maiden Muscle *Pet. Gall.* Conque de Venus a pointes *Dav.*

Teſta ſubcordata, cingulis eleuatis membranaceis, area utrinque ſpinoſa.

Die etwas herzförmige Schale hat erhabene blätterige Reiſe und eine mit Stacheln beſezte Vorderfläche.

Bonan. Mus. Kirch. el. 2. *f.* 121.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 140.
Rumph. amb. t. 48. *f.* 4.
Petiv. Gaz. t. 31. *f.* 9.
Olear. Mus. p. 29. *f.* 4.
Gualt. Teſt. t. 76. *f.* D.
Argenv. Conch. Pl. 21. *f* J.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 9.
Knor. Vergn. I. 4. *t.* 3, 4. *f.*
—— *Delic. nat. I. t. B. V. f.* 9.
Murray. Fund. Teſt. t. 2. *f.* 16. 17.
Müll. Linn. Naturſyſt. VI. 1. *B.* 11. *t.* 6. *f.*

K I. 2.

K. I. 2. Venus Paphia. K. I. 2. Das alte Weib.

Linn. S. N. Sp. 113.

Belg. Gerimpelde, oude Wyſs - ſchulp. *Rumph. Angl.* The old Woman. *Hill. Gall*. La Vieille ridée, *Argenv.*

Teſta ſubcordata, cingulis craſſis, antice attenuatis.

Die etwas herzförmige Schale hat dicke Reiſe, die ſich vorne verdünnen.

Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 75.
Rumph. *amb. t.* 48. *f.* 5.
Gualt. Teſt. t. 85. *f. A.*
Argenv. *Conch. Pl,* 21. *f. B.*
Regenſ. Samml. I. 7. *t.* 11. *f.*
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 9.
Knor. Vergn. II. 28. *t.* 2. *f.*
—— —— *VI.* 6. *t.* 2. *f.*

K. I. 3. Venus Marica. K. I. 3. Die Baſtardvenus.

Linn. S. N. Sp. 114.

Belg. De geſtreepte Kousdoublet.

Teſta rotundata, decuſſata, ſtriis eleuatis, antice lamelloſis, areola carinata circumſcripta.

Die rundliche Schale iſt mit erhabenen, vorne blätterigen Streifen durchkreuzet, die Hinterfläche iſt kielförmig erhaben, und eingefaßt.

K. I. 4. Venus Dyſera. K. I. 4. Die Dünnribbe.

Linn. S. N. Sp. 114.

Gall. La Levantine *Argenv.*

Teſta ſubcordata, cingulis remotis membranaceis, limbo crenulato.

Die etwas herzförmige Schaale hat dünne erhabene in die Quere laufende Ribben, und am inneren Rande kleine Kerben.

Liſt. Hiſt. Conch. *t.* 3. *f.* 114. 115.
Petiv. Gaz. *t.* 24. *f.* 5.
Argenv. Conch. *Pl.* 21. *f.* K.
Klein. Meth. Oſtrac. *t.* 10. *f.* 48, 49.
Knor. Vergn. II. 28. *t.* 3. *f.*

K. II. Teſtae ſubcordatae, antice inermes.

K. II. Herzförmige vorne unbewafnete Schalen.

K. II. 1. Venus verrucoſa. K. Die warzige Venusmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 116.

Gall. Cloniſſe. *Dav.*

Te-

Teſta ſubcordata umbonata, cingulis arctis membrananaceis verrucoſis, limbo crenulato.

Die etwas herzförmige bäuchige Schale mit blätterigen warzenförmigen Ribben und gedrängt ſtehenden Reifen beſezet, am inneren Rande mit feinen Kerben verſehen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 122.

Gualt. Teſt. t. 75. f. H.

Mus. Caes. Vindobon.

K. II. 2. Venus circinata.

K. II. 2. Die gereifte Venus.

Teſta ſubcordata, membranis tranſuerſis arctis, areola impreſſa ouata, limbo integro.

Die faſt herzförmige Schale iſt mit häutigen Querringen umgeben, mit einer eyförmigen eingedrückten Hinterfläche und ganzem Rande.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta figura V. Dionis ſubcordata, umbonata tranſuerſis eleuatis imbricatis arctis. Sinus utrinque labiatus, labiis ſubaequalibus. Areola cordata impreſſa. Limbus integerrimus. Color pallide roſeus, radiis obſoletis albis.

Die herzförmige bäuchige Schale hat die Geſtalt der ächten Venusmuſchel. Sie iſt der Quere nach mit erhabenen ziegelförmiggeſtellten, hintereinander ſtehenden Ringen umgürtet. Die vordere Vertiefung iſt beiderſeits mit einem beinahe gleichgroßen Lefzen verſehen. Die hintere Fläche iſt eyförmig und vertieft. Der innere Rand ohne allen Einſchnitt. Der Farbe nach iſt ſie blaßroth, mit matten weißen Strahlen.

K. II. 3. Venus cancellata. — K. II. 3. Die breitblätterige Venusmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 118.

Teſta ſubcordata complanata, cingulis erectis membranaceis remotis, antice elongatis, patentibus; limbo crenulato.

Die herzförmige plattgedrückte Schale iſt mit erhabenen blätterigen Reifen umgeben, die ſich vorne verlängern, und ausbreiten; der innere Rand iſt fein gekerbet.

Gualt. Teſt. t. 88. *f.* D.
Mus. Caes. Vindobon.

K. II. 4. Venus ſinuata. — K. II. 4. Die ausgekehlte Venusmuſchel.

Teſta ſubcordata, tranſuerſe inaequaliter ſulcata, ſinu antico lato decliui, limbo crenulato.

Die faſt herzförmige Schale hat ungleiche Querfurchen, eine vertiefte Vorderfläche, und einen innwendig feingekerbten Rand.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 131.
Knor. Vergn. V. 14. *t.* 2. 5. *f.*

Teſta ſubcordata complanata glabra, ſulcis transuerſis inaequalibus. Sinus anticus latus introrſum decliuis. Areola plana. Limbus crenula

Die Schale iſt einigermaßen herzförmig, plattgedrückt und glatt, der Quere nach mit ungleichen Furchen verſehen. Die vordere

nulatus. Color pallidus fuſconebuloſus, radiis obſoletis pallidis.

Vertiefung iſt breit und einwärts abhängig. Die Hinterfläche iſt eben. Der innere Rand fein gekerbet. Die Farbe braun nebelicht, mit matten bleichen Strahlen.

K. II. 5. Venus flexuoſa.

K. II. 5. Die ſchiefe Venusmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 121.

Teſta cordato triangula, transuerſim ſulcata, area ſinuoſa utrinque carinata, areola plana.

Die herzförmige dreyeckige in die Quere gefurchte Schale hat eine ebene Hinterfläche, und eine vertiefte Vorderfläche, die beiderſeits mit einer erhabenen Ecke begränzet iſt.

Rumph. amb. t. 43. *f.* O.
Mus. Caes. Vindobon.

K. II. 6. Venus Buccardium.

K. II. 6. Das unächte Ochſenherz.

Teſta cordata ſolida laeui, areolae excauatae veſtigio indiſtincto, limbo integro.

Die herzförmige dichte glatte Muſchel iſt an der Hinterfläche ausgehöhlet ohne deutlichen Eindruck, und am inneren Rande glatt.

Teſta cordata ſolida, laeuis, transuerſim tenuiſſime ſtriata, undique umbonata; retro apices recuruatos contiguos concaua, veſtigio nec intruſo, nec circumſcripto. Dentes generi proprii, craſſi.

Die ächte herzförmige glatte nach der Quere ſehr fein geſtreifte Schale iſt allenthalben bauchig; hinter den ruckwärts gebogenen Spizen, die einander berühren, ausgehöhlet, ohne deutlichen Eindruck oder Einfaſſung. Die Zähne ſind dick und nach der Art des Geſchlechtes beſchaffen.

K. II. 7. Venus Chione.

K. II. 7. Die Spielmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 125.

Belg. De Speel doublet. *Gall.* Came marquée de verges.

Teſta cordata glabra, transuerſim obſolete ſulcata, pallide radiata, areola plana.

Die herzförmige glatte nach der Quere ſchwach gefurchte Schale iſt mit blaſſen Strahlen und einer kleinen platten Hinterfläche verſehen.

Gualt. Teſt. t. 86. f. A.
Argenv. Conch. Pl. 21. f. C.
Regenſ. Samml. I. 4. t. 1. f.
Knor. Vergn. II: 4. t. 1. f.

K. II. 8. Venus maculata.

K. II. 8. Die Agatmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 126.

Belg.

Belg. D'achaat - gaaper. *Angl.* The Agate chama. *Hill. Gall.* Came truitée. *Dav.*

Teſta cordata glabra, maculis diſperſis inaequalibus; areola carinata, circumſcripta.

Die herzförmige glatte Schale hat zerſtreute ungleiche Flecken, und eine kielförmig eingefaßte Hinterfläche.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 106.

Gualt. Teſt. t. 76. *f. J.*.

Argenv. Conch. *Pl.* 21. *f. H.*

Adans. Seneg. *Pl.* 17. *f.* 15.

Regenſ. Samml. I. 8. *t.* 16. *f.*

Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 9.

Knor. Vergn. II. 28. *t.* 5. *f.*

—— —— *V.* 20. *t.* 4. *f.*

K. II. 9. Venus Meretrix.

K. II. 9. Die Braunlippe.

Linn. S. N. Sp. 127.

Gall. La Gourgandine. *Argenv. Angl.* The Smooth egd, truncated Chama *Hill.*

Teſta cordata laeui, antice complanata fuſca, labris hiantibus.

Die herzförmige glatte Schale iſt vorne plattgedrückt braun und mit weit hervorragenden Lippen verſehen.

Argenv. Conch. *Pl.* 21. *f.* F.

Hill. *Hiſt.* *of.* *Anim.* *Pl.* 9.

Knor. *Vergn.* *VI.* 6. *t.* 3. *f.*

K. II. 10. Venus mactroides.

K. II. 10. Die Korbvenus.

Belg. Geſtraalde Kwaker. *Gall.* Quacre rayonné.

Teſta triangula umbonata laeui, utrinque complanata; cardinis dente laterali remoto.

Die dreyeckige bäuchige glatte Schale iſt beiderſeits plattgedrücket, und am Schloße mit einem entfernten Seitenzahne verſehen.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 3. *f.* 85.

Knor. *Vergn.* *V.* 15. *t.* 2. *f.*

—— —— *VI.* 10. *t.* 5. *f*

Teſta, ſimilis Mactrae ſtultorum L; triangula ſubaequilatera laeuis, transuerſim tenuiſſime ſtriata, utrinque prope apices complanata, planis ſubaequalibns. Apices incurui. Dentes primores tres, ſtructura congenerum, quibus accedit poſtice lateralis remotus. Color teſtae extus fuluus, radiis albis; apicum violaceus.

Die Schale, welche die Geſtalt des Strahlkorbes hat, iſt dreyeckig, beinahe gleichſeitig und glatt, in die Quere fein geſtreift, an den Seiten nächſt den Spizen mit zwoen faſt gleich groſſen platten Flächen verſehen. Die Spizen krümen ſich einwärts. Drey Mittelzähne ſind am Schloße von gewöhnlicher Geſtalt, auſſer welchen hinten ein entfernter Seitenzahn ſtehet. Die Schale iſt außen braunroth mit weißen Strahlen, an den Spizen violet.

K. II. 11. Venus paradoxa. K. II. 11. Die blauſtreiſige Aftervenus.

Teſta triangula, ſolida, utrinque complanata, labris prominentibus.

Die dreyſeitige dichte beiderſeits zuſammengedrückte Schale iſt mit hervorragenden Lippen verſehen.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ponderoſa, triangula, laeuis, utrinque complanata. Labra porrecta craſſa. Dentes cardinis primarii duo, lateralis utrinque unus breuis ſolidus. Color teſtae albus, lateribus radiisque latis violaceis.

Die Schale iſt ſchwer, dreyeckig, und glatt, an beiden Seiten platt gedrückt. Die dicken Lippen ragen hervor. Am Schloße ſind zween Mittelzähne, und beiderſeits ein dicker Nebenzahn. Die Schale iſt weiß, mit breiten Strahlen, die Seitenflächen von violeter Farbe.

K. II. 12. Venus caſtrenſis. K. II. 12. Die Lagermuſchel.

Linn. S. N. Sp. 129.

Belg. De griekiſche A Doublet. *Rumph. Angl.* The zizzag Chama. *Hill. Gall.* L'ecriture greque.

Teſta triangulo rotundata, umbonata glabra, characteribus angulatis picta, areola circumſcripta plana.

Die rundliche, dreyeckige, bäuchige glatte Schale iſt mit eckigen Zierathen bemalet, und mit einer platten eingefaßten Hinterfläche verſehen.

Bonan. Recr. el. 3. f. 376.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 98.
Rumph. amb. t. 42. f. K.
Gualt. Teſt. t. 82. f. H.
Regenſ. Samml. I. 1. t. 3. f. 4. t. 41. f.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 9.
Knor. Vergn. I. 21. t. 4. f.
—— —— II. 20. t. 2. f.
—— —— VI. 6. t. 5, 6. f.

K. II. 13. Venus Meröe.

K. II. 13. Die weitlippige Venusmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 131.
Gall. Le Zig-zog. *Dav.*

Teſta lata ſubouata compreſſa, tranſuerſim ſtriata; ſinu antico dilatato hiante; limbo crenato.

Die breite etwas eyförmige flachgedrückte in die Quere geſtreifte Schale iſt vorne mit einer erweiterten klafenden Vertiefung verſehen, und inwendig am Rande mit Kerben beſezet.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 321.
Argenv. Supp. Pl. 3. f. B.
Knor. Vergn. VI. 7. t. 2, 4. f.

K. II. 14. Venus undulata.

K. II. 14. Die wellenförmige Venus.

Teſta

Teſta ouali lata, ſtriis tranuerſis undulatis, planis utrinque lanceolatis.

Die eyförmige breite Schale iſt der Quere nach mit runzelichten Streifen, und beiderſeits mit lanzetförmigen Flächen verſehen.

Petiv. Gaz. t. 105. f. 2.

Knor. Vergn. II. 28. t. 4. f.

Teſta oualis complanata lata, glabra, ſtriis transuerſis undulatis, ad apices utrinque longitudinaliter complanata, planis laeuibus lanceolatis. Dentes cardinis duo bifidi, tertius indiuiſus. Color albus, venis angulatis fuluis, planorum venis transuerſis undulatis, rubro purpureis.

Die Schale iſt plattgedrückt, breit, glatt, mit wellenförmigen nach der Quere laufenden Streifen umgeben, nächſt den Spizen beiderſeits nach der Länge flach gedrücket, mit glatten lanzetförmigen Flächen. Am Schloße ſind zween zweyſpaltige Zähne, der dritte äußere iſt ſpizig und ungetheilt. Die Farbe iſt weiß mit braungelben winkelförmigen Adern, über die Quere der Flächen laufen wellenförmige purpurrothe Adern.

K. II. 15. Venus Callipyga.

K. II. 15. Die weißbackige Venus.

Teſta ouata latiuſcula, transuerſe inaequaliter ſtriata, lineis picta angulatis, areola ouali.

Die eyförmige breite Schale iſt der Quere nach mit ungleichen Streifen beſezet, mit winkelförmigen Linien bemalet, und an der Hinterfläche eyförmig.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 62.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ouata latiuſcula parumper complanata, ſtriis transuerſis inaequalibus, picta lineis angulatis, ſurſum conuergentibus, fuſcis. Areola oualis, impreſſa, ſtriata. Color luteſcens; characteribus angulatis fuſcis. Umbones niuei.

Die herzförmige etwas breite Schale iſt einigermaßen flachgedrückt, und in die Quere ungleichförmig geſtreifet. Die winkelförmigen Linien, mit welchen ſie bemalet iſt, laufen aufwärts zuſammen. Die Hinterfläche iſt eyförmig, eingedrückt und geſtreifet. Die Schale gelblich, die Winkelzüge braun, und die Wölbung ſchneeweiß.

K. II. 16. Venus deflorata.

K. II. 16. Die Blaulippe.

Linn. S. N. Sp. 132. ?

Teſta lata umbonata ouali, longitudinaliter rugoſa, limbo antico intus violaceo.

Die breite bäuchige eyförmige Schale iſt der Länge nach runzelig, und am innwendigen Vorderrande violet.

Mus. Caes. Vindobon.

K. II. 17. Venus fimbriata.

K. II. 17. Die Wafelmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 133.

Belg. Wafelyſer *Rumph. Angl.* Honeycomb Cockle. *Pet. Gall.* La Tricotée. *Dav.*

Teſta lata, umbonata ouali, longitudinaliter ſtriata, transuerſe ſulcata, margine crenato.

Die breite bäuchige eyförmige Schale iſt nach der Länge geſtreifet, in die Quere gefurchet, und am Rande mit Kerben verſehen.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 172.
Rumph. amb. *t.* 43. *f.* F.
Petiv. amb. *t.* 18. *f.* 8.
Gualt. Teſt. *t.* 75. *f.* C.
Mus. Cae. Vindobon.

K. II. 18. Venus reticulata.

K. II. 18. Die Gittervenus.

Linn. S. N. Sp. 124.

Gall. Le Rézeau blanc. *Dav.*

Teſta ſubcordata umbonata longitudinaliter ſtriata, cingulis eleuatis membranaceis, limbo crenulato.

Die faſt herzförmige bäuchige Schale iſt der Länge nach geſtreifet, mit erhabenen häutigen Reifen, und am inneren Rande mit Kerben verſehen.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 273.
Gualt. Teſt. *t.* 77. *f.* A.
Adans. Seneg. *Pl.* 16. *f.* 3.
Argenv. Conch. *Pl.* 23. *f.* F.
Klein. Meth. Oſtr. *t.* 10. *f.* 12.
Knor. Vergn. VI. 10. *t.* 1. *f.*

K. III. Orbiculatae antice inermes.

k. III. Scheibenförmige, vorne unbewafnete Venusmuſcheln.

K. III. 1. Venus tigerina.

K. III. Die Tiegerzunge.

Linn. S. N. Sp. 136. 141.

Belg. De wilde Tyger-tong. *Rumph. Angl.* Checker-grained cokle, *Petiv.*

Teſta orbiculata decuſſatim ſtriata, areola impreſſa, cordata.

Die ſcheibenförmige Schale iſt kreuzweiſe geſtreifet, und mit einer eingedrückten herzförmigen Hinterfläche verſehen.

Nivea, ſimo praeſertim postico roſeo.

Weiß, und am inneren Rande beſonders hinten roſenfärbig.

Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 69.
Liſt. Hiſt. *Conch. l.* 3. *f.* 174.
Rumph. amb. t. 43. *f.* H.
Petiv. amboin. t. 18. *f.* 9.
Knor. Vergn. IV. 2. *t.* 1. *f.*
—— —— *VI.* 37. *t.* 2. *f.*

K. III. 2. Venus concentrica.

K. III. 2. Die Gürtelvenus.

Angl. The girdled Heart Cockle. *Petiv.*

Teſta orbiculata laeui, ſtriis transuerſis concentricis, areola impreſſa cordata.

Die ſcheibenförmige glatte Schale iſt mit gleichabſtehenden Zirkelfurchen beſezet, und mit einer eingedrückten herzförmigen Hinterfläche verſehen.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 3. f. 99. 102. 104.
Petiv. Gaz. t. 16. f. 1. t. 93. f. 15. 18.
Mus. Caes. Vindobon.

Teſta orbicularis ſolida, laeuis, ſulcis transuerſis circularibus concentricis. Apices breues recurui. Areola cordiformis impreſſa. Limbus integerrimus. Color totius teſtae niueus.

Die ſcheibenförmige dichte glatte Schale, hat concentriſche Querfurchen. Die Spizen ſind kurz und rückwärts gebogen. Die Hinterfläche iſt herzförmig und vertieft. Der Rand glatt. Die Farbe der ganzen Schale ſchneeweiß.

K. III. 3. Venus proſtrata.

K. III. 3. Die Zirkelſcheibe.

Linn. S. N. Sp. 137.

Teſta orbiculata transuerſe ſtriata, antice membranaceo ſcabra, areola ouata impreſſa.

Die ſcheibenförmige in die Quere geſtreifte Schale iſt vorne durch erhabene Häute rauh, an der Hinterfläche eyförmig eingedrückt.

Mus. Caes. Vindobon.

K. III. 4. Venus riuularis.

K. III. 4. Die aderige Venus.

Teſta orbiculata, transuerſe ſtriata, umbonibus complanatis rugoſis, areola plana.

Die ſcheibenförmige in die Quere geſtreifte Schale iſt auf den flachgedrückten Wölbungen durch erhabene Adern runzelicht, und mit einer platten Hinterfläche verſehen.

Mus.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta orbiculata gibba, transuerſe ſtriata; Umbones complanati, rugis bifariam diuergentibus obſiti. Areola plana laeuis. Color pallide luteus, areolae fuſcus.

Die Schale iſt ſcheibenrund, höckerig, in die Quere geſtreift. Die Wölbungen platt gedruckt, und mit Runzeln beſezet, welche nach zwoen Seiten auseinander laufen. Die Hinterfläche iſt eben und glatt; Die Farbe bleich gelb, die Hinterfläche braun.

K. III. 5. Venus penſyluanica.

K. III. 5. Der Abrikoſen Stein.

Linn. S. N. Sp. 138.

Gall. La Jamaique. *Argenv.*

Teſta rotundata, umbonata, membranis eleuatis transuerſis, antice ſulco utrinque longitudinali arcuato, areola impreſſa cordata.

Die runde bäuchige Schale iſt in die Quere mit erhabenen Blättern umgeben, vorne beiderſeits der Länge nach mit einer bogenförmigen Furche bezeichnet, an der Hinterfläche herzförmig eingedrückt.

Liſt. Hiſt. Conch. *t.* 3. *f.* 138.
Argenv. Conch. *Pl.* 21. *f N.*
Mus. Caes. Vindobon.

K. III. 6. Venus incruſtata.

K. III. 6. Die punktirte Lagervenus.

Linn. S. N. *Sp.* 139. ?

Belg.

Belg. Het türkiſche Leger. *Rumph.* *Angl.* The türkiſhe Campe. *Gall.* Le campement turque.

Teſta rotundata glabra, ſtriis conuergentibus excauato punctatis, areola circumſcripta laeui.

Die rundliche glänzende Schale hat zuſammenlaufende tiefpunktirte Streifen, und eine eingefaßte glatte Hinterfläche.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 146.

Regenſ. Samml. I. 1. *t.* 4. *f.*

K. III. 7. Venus exoleta.

K. III. 7. Die Strahlſcheibe.

Linn. S. *N.* *Sp.* 142.

Belg. Slet.

Teſta lentiformi, transuerſim ſtriata, albida, obſolete radiata, areola cordata.

Die linſenförmige in die Quere geſtreifte weißlichte Schale hat ſchwache Strahlen und eine herzförmige Hinterfläche.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 98.

Gualt. Teſt. *t.* 75. *f.* F. G.

Adans. Seneg. *Pl.* 16. *f.* 4.

Mus. Caes. Vindobon.

K. III. 8. Venus pectinata.

K. III. 8. Die Kammvenus.

Linn.

Linn. S. N. Sp. 144.

Belg. Scherſje. *Rumph. Angl.* Croſs Cockle *Petiv. Gall.* L'Amande *Dav.*

Teſta rotundata, ſolida, longitudinaliter anticeque oblique coſtata, coſtis decuſſatis, limbo crenato.

Die rundliche dichte Schale iſt der Länge nach, und vorne in die Quere geribbet, über die Ribben geſtreifet, und am inneren Rande gekerbet.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 148. 149.

Rumph. amb. *t.* 42. *f.* D.

Petiv. amb. *t.* 18. *f.* 14.

Gualt. Teſt. t. 72. *f.* E. F.

Argenv. Conch. *Pl*, 21. *f.* P.

Knor. Vergn. VI. 3. *t.* 3. *f.*

K. IV. Latae, antice ſubangulatae, inermes.

K. IV. Breite, vorne etwas eckige, und unbewafnete Venusmuſcheln.

K. IV. 1. Venus litterata.

K. IV. 1. Die ächte Schildmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 147.

Belg. De longaagtige Letter-Schulp. *Rumph. Angl.* The arabian Shell. *Hill. Gall.* L'ecriture arabique. *Argenv.*

Teſta lata ouata, antice angulata, ſtriis transuerſis undulatis.

Die breite, eyförmige, vorne eckige Schale hat wellenförmige Querſtreifen.

Picta.

Picta ſaepe lineis angulatis. | Oefters mit linienförmigen Winkelzügen bemalet.

Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 67.
Rumph. amb. t. 43. *f.* B.
Petiv. amb. t. 18. *f.* 2.
Valent. Abh. 13. t. 6. *f.* 14. *t.* 10 — 13. *f.*
Gualt. Teſt. t. 86. *f.* E. F.
Argenv. Conch. Pl. 21. *f.* A.
Regenſ. Samml. I. 4. *t.* 39. *f.*
Hill. Hiſt. of. *Anim.* Pl. 9.
Knor. Vergn. I. 6. *t.* 4. *f.*
—— —— II. 28. t. 4. *f.*

L. Spondylus. — L. Die Klappmuſchel.

Linn. S. N. *Gen.* 310.

Teſta inaequiualuis, cardinis dentibus duobus craſſis, cum ſcrobiculo intermedio.

Die Schale beſtehet aus ungleichen Klappen, am Schloße ſind zween dichte Zähne, zwiſchen eine Grube.

L. 1. Spondylus Gaederopus. — L. 1. Die gezackte Klappmuſchel.

Linn.

Linn. S. N. 151.

Belg. Getackte Lazarus-Klappen. *Angl.* The great prickly Oiſter *Hill. Gall.* Huitre epineuſe.

Teſta ſubaurita ſpinoſa, apicum altero longiore ſecto.

Die ſtachlichte Schale iſt einigermaßen mit Ohren, und einer längeren abgeſägten Spize verſehen.

α valuis foliaceo ſpinoſis.

α mit blätterichten und dornigen Klappen.

β valuis ſpinoſis, ſpinis elongaris, obtuſis.

β mit dornigen Klappen, deren Dörner lang und ſtumpf ſind.

Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 20. 21.
Rumph. *amb. t.* 47. *f.* E.
Petiv. *amb. t.* 20. *f.* 6.
Gualt. *Teſt. t.* 100. 101. *f. A, B. t.* 99. *f.* F. G.
Argenv. Conch. *Pl.* 21. *f.* B. G. I. M.
Klein. Meth. Oſtr. *t.* 9. *f.* 37.
Hill. *Hiſt. of. Anim. Pl.* 9.
Seb. Teſt. *III. t.* 88. *f.* 1—11. *t.* 89. *f.* 4—8.
Knor. *Vergn. V.* 9. *t.* 1. *f.* 13. *t.* 1. *f.*
—— —— *VI.* 9. *t.* 1. *f.*
—— Delic. *nat. I. t. B. IV.* 1. *f.*

L. 2. Spondylus plicatus.

L. 2. Die Faltenklappe.

Linn. S. N. Sp. 153.

Teſta ſubſpinoſa, transuerſe plicata.

Die Schale iſt einigermaßen dornig, und in die Quere gefalten.

α crocea.

α ſafranfarbig.

Gualt. Teſt. t. 99. *f.* E.
Knor. Vergn. III. 6. *t.* 1. *f.*
—— —— *VI.* 12. *t.* 3. *f.*

β lutea.

β gelb.

Knor. Vergn. I. 6. *t.* 3. *f.*

M. Chama.

M. Die Gienmuſchel.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 311.

Teſta biualuis absque labris. Cardinis dens calloſus, gibbus, inſertus foſſulae obliquae.

Eine zweyklappige Schale ohne Lippen. Das Schloß hat einen höckerigen ſchwielenförmigen Zahn, der ſich in ein entgegengeſeztes Grübchen verſenket.

M. 1. Chama cor. M. 1. Die Narrenkappe.

Linn. S. N. Sp. 154.

Belg. Zotskap. *Gall.* Coeur de Boeuf. *Dav. Ital.* Bucardia. *Ginan.*

Teſta cordata ſubgloboſa, laeui, apicibus recuruatis, rima lanceolata hiante.

Die herzförmige, einigermaſſen kuglichte glatte Schale, hat ſchnirkelförmig zuruckgerollte Spizen, und eine lanzetförmige klafende Vorderſpalte.

Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 88.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 111.
Rumph. amb. t. 48. *f.* 10.
Gualt. Teſt. t. 71. *f.* E.
Seb. Thes. III. t. 86. *f.* 1.
Ginan. adr. II. t. 19. *f.* 129.
Knor. Vergn. VI. 8. *t.* 1. *f.*

M. 2. Chama Gigas. M. 2. Das Waſchbecken.

Linn. S. N. Sp. 155.

Belg. Fonteinbak. *Angl.* The wife of the Nail - Scalop. *Gall.* La Faitiere, *Argenv.*

Teſta

Teſta lata, plicata, fornicato ſquamoſa; limbo poſtico hiante, crenato.

Die breite gefaltene Schale iſt mit hohlen Schuppen beſezet, und an der ſtumpfen Hinterfläche mit einer gekerbten Oefnung verſehen.

Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 83. 84.

Rumph. amb.. t. 42. *f. A. B.*

Petiv. amb. t. 5. *f.* 13.

Gualt. Teſt. t. 92. f. A, G. t. 93. f. B.

Argenv. Conch. *Pl.* 23. *f.* E.

Klein Meth. Oſtr. *t.* 1. *f.* 53.

Regenſ. Samml. I. 10. *t.* 48. *f.*

Knor. Vergn. I. 19. *t.* 3. *f.*

—— *Delic. nat.* I. *t. B. III.* 1. *f.*

Da Coſt. Elem. 7. *Pl.* 4. *f.*

Murray. Fund. Teſt. *t.* 2. *f.* 19. 20.

M. 3. Chama Hippopus.

M. 3. Der Pferdefuß.

Linn. S. N. Sp. 156.

Belg. Paardeuoetje. *Rumph. Angl.* The Horſe hooſe. *Gall.* Feuille de Chou. *Argenv.*

Teſta plicatà, ſquamis ſpinoſis muricata, margine poſtico obtuſiſſimo, clauſo, dentato.

Die gefaltene Schale iſt mit dornigen Schüppchen beſezet, die ſtumpfe Hinterfläche iſt geſchloſſen und am Rande gezähnt.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 81. 82.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 187. 188.

Rumph. amb. t. 42. f. C.

Petiv. amb. t. 18. f. 15.

Gualt. Teſt. t. 93. f. A.

Regenſ. Samml. I. 10. t. 49. f.

Knor. Vergn. I. 2. t. 1, 2. f.

—— —— VI. 9. t. 3. f.

Da Coſt. Elem. 7. Pl. 10. f.

M. 4. Chama antiquata. M. 4. Die Seenuß.

Linn. S. N. Sp. 157.

Teſta ſubcordata, ſulcis longitudinalibus, ſtriisque tranſuerſis.

Die faſt herzförmige Schale iſt nach der Länge gefurchet, und in die Quere geſtreifet.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 98.

Gualt. Teſt. t. 71. f. L.

Adans. Seneg. Pl. 16. f. 2.

Knor. Vergn. II. 20. t. 3. f.

M. 5. Chama calyculata.

M. 5. Die Eichelmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 160.

Gall. Coeur allongé. *Dav.*

Teſta lata gibba, ſubtus coarctata, ſulcis longitudinalibus crenulatis.

Die breite hökerige Schale iſt unten eingebogen, und nach der Länge mit gekerbten Furchen beſezet.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 184. 185.
Gualt. Teſt. *t.* 90. *f.* F.
Adans. Seneg. *Pl.* 15. *f.* 8.
Mus. Caes. Vindobon.

M. 6. Chama phrenitica.

M. 6. Die nierenförmige Gienmuſchel.

Teſta reniformi, ſulcis longitudinalibus ſtriisque transuerſis, margine poſtico ſerrato, excurrente.

Die nierenförmige nach der Länge gefurchte, und in die Quere geſtreifte Schale hat einen rückwärts hervorragenden ſägeförmigen Hinterrand.

Valent. Abh. 16. *t.* 27. *f.*
Knor. Vergn. II. 23. *t.* 7. *f.*

Teſta reniformis, antice lata, rotundata, poſtice anguſtata, ſupra arcuata, infra coarctata; ſulci lon-

Die Schale iſt nierenförmig, vorne breit und rundlich, hinten ſchmal, oben bogenförmig erhaben, unten

 gitu-

gitudinales, tranſuerſim ſtriis decuſſati. Areae, areolaeque veſtigium nullum. Apices ſubterminales recurui. Margo anticus complanatus, inferior introrſum excauatus, retrorſum in formam lobi excurrens, limbo crenato. Dentes duo craſſi, poſticus breuis, anticus elongatus curuatus. Ligamentum validum craſſum, exviridi flauoque reſplendens. Color rufus, poſtice prope apices albus. Cauitas alba, limbo externo fuſco.

eingedrückt. Die nach der Länge laufenden Furchen ſind mit Querſtrichen durchgezogen. Weder am Vorder = noch am Hinterrande zeiget ſich eine merkliche Fläche. Die Spizen ſind rückwärts gekrümmet, und ſteben nahe an dem einen Ende. Der Vorderrand iſt flach gedrückt, der untere einwärts ausgehöhlet, und verläuft ſich rückwärts in einen lappenförmigen Fortſaz. Der innere Rand iſt gekerbet. Am Schloße ſind zween ſtarke Zähne, davon der vordere kürzer, der hintere verlängert und gekrümmet iſt. Das dicke ſtarke Band hat im Bruche einen grüngelben Glanz. Die Schale iſt außen braunroth, hinter den Spizen weiß. Die Höhlung weiß, am äußeren Rande braun.

M. 7. Chama Lazarus.

M. 7. Die Muskatenblüthe.

Linn. S. N. Sp. 164.

Belg. Foelie Bladeren. *Gall.* Gateau feuilleté.

Teſta lamellis patentibus, laceris, apice altero oblique ſubſpirali.

Die Schale iſt mit ausgebreiteten krauſen Blättern beſezet, mit einer ſchiefen und faſt ſchnirkelförmigen Spize.

Rumph. amb. t. 48. *f.* 3.

Seb. Thes. III. t. 89. *f.* 5, 6, 9, 11.

Knor. Vergn. I. 8. *t.* 1. *f.*

Mus. Caes. Vindobon.

M. 8. Chama gryphoides. M. 8. Die Felſengienmuſchel

Linn. S. N. Sp. 165,

Belg The ockergeele Oeſter. *Gall.* Huitre écailleuſe a feuilles de couleur de citron. *Argenv.*

Teſta orbiculari muricata, ualua altera planiore, altera productiore ſubſpirali. Die ſcheibenrunde rauhe Schale hat eine flache, und eine beinahe ſchnirkelförmig verlängerte Schale.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 22.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 47. 53.
Gualt. Teſt. t. 101. f. C — I.
Adans. Seneg. Pl. 15. f. 1.
Regenſ. Samml. I. 4. t. 44. f.
Knor. Vergn. I. 21. t. 2. f.
—— —— VI. 16. t. 1. f.

M. 9. Chama Arcinella. M. 9. Der dornige Pferdhuf.

Linn. S. N. Sp. 167.

Belg. Rotz doublet,

Teſta ſpinoſa, ſulcis longitudinalibus, excauato punctatis; areola poſtica papilloſa, intruſa.

Die ſtachlige Schale iſt nach der Länge mit hohlpunktirten Furchen beſezet, und hinten mit einer warzigen eingedrückten Fläche verſehen.

Knor. Vergn. IV. 14. *t.* 1. *f.*

—— —— *VI.* 36. *t.* 1, 2. *f.*

N. Arca. — Die Arche.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 312.

Teſta biualuis, cardine articulato, dentibus numeroſis, alternatim inſertis.

Die zweyklappige Schale hat an dem Schloſſe eine Reihe vieler wechſelweiſe ineinander paßender Zähne.

N. I. Margine integro; apicibus recuruis.

N, I. Mit ganzen Rande und zurückgekrümmten Spizen.

N. I. 1. Arca tortuoſa. — N. I. 1. Die gedrehte Arche.

Linn. S. N. Sp. 168.

Belg. Gedraaide Oeſter. *Rumph. Angl.* Twiſted Lighter. *Petiv. Gall.* La Biſtournée. *Dav.*

Teſta inaequiualui, oblique parallelipeda, ſtriata, valuula ſiniſtra carinata, apicibus recuruis, margine integro.

Die Schale hat die Geſtalt eines gedrehten Parallelepipedums. Die Klappen ſind geſtreifet, davon die linke eine kielförmige Schneide hat. Die Spizen ſind ruckwärts gerollet, der Rand ganz.

Rumph. amb. t. 47. f. K.

Petiv. amb. t. 20. f. 9.

Gualt. Teſt. t. 95. f. B.

Klein. Meth. Oſtrac. t. 8. f. 16.

Knor. Vergn. I. 23. t. 3. f.

N. II. Margine integro, apicibus inflexis.

N. II. Mit ganzem Rande, und einwärts gekrümten Spizen.

N. II. 1. Arca Noae.

N. II. 1. Die Arche Noah.

Linn. S. N. Sp. 169.

Belg. De rechte Noachs-Ark. *Rumph.* *Angl.* Noahs-Lighter *Petiv.* *Gall.* L'Arche de Noe. *Dav.*

Teſta transuerſa, nauiculari, rhombea, ſtriata, antice compreſſa, retuſa, apicibus incuruatis remotiſſimis, margine integro, ſubtus hiante.

Die Schale iſt geſtreckt, hat eine ſchiefartige rautenförmige Geſtalt, iſt geſtreift, vorne zuſammengedrückt und ſtumpf. Die Spizen ſind einwärts gerollet, von einander weit entfernet; der Rand ganz und unten klafend.

Aldrov. Teſt. l. 3. t. 15.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 32.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 208. 209.

Petiv. amb. t. 17. f. 10.

Rumph. amb. t. 44. f. P.

Gualt. Teſt. t. 87. f. H. H. I.

Argenv. Conch. Pl. 23. f. G.

Regenſ. Samml. I. 12. t. 73. f.

Knor. Delic. nat. I. t. B. V, 2. f.

—— *Vergn.* I. 16. t. 1. 2. f.

Martin. Berlin. Beſchaeft. III. 6. t. 5. f.

N. II. 2. Arca barbata.

N. II. 2. Die Bartarche.

Linn. S. *N.* Sp. 170.

Belg. Arcke Noachs Soort. *Mus. Oud. Angl.* The coated Muſcle. *Hill. Gall.* Amande à cils. *Dav. Ital.* Cozze, *Bonan.*

Teſta transuerſa, ſtriis barbatis, apicibus incuruis approximatis, margine integro, ſubtus hiante.

Die Schale iſt geſtreckt, an den Streifen langharig; die Spitzen ſind einwärts gerollt, und aneinander genähert, der Rand ganz, und unten klaſend.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 65.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 79.

Gualt. Teſt. t. 91. f. F.

Mus. Teſſin. t. 6. f. 1.

Argenv. Conch. Pl. 22. f. M.

Ginan. adr. II. t. 23. f. 160.

Adans. Seneg. Pl. 18. f. 9.

Knor. Verg. II. 27. t. 7. f.

Murr. Fund. *Teſtac.* t. 2. f. 22.

Mart. Berlin. *Beſchaeſt.* III. 6. t. 8. f.

N. III. Margine crenato, apicibus recurvatis.

N. III. Mit gekerbtem Rande, und eingerollten Spizen.

N. III. 1. Arca antiquata.

N. III. 1. Die Baſtartarche.

Linn. S. N. Sp. 174.

Belg. Maagt Bloem. *Rumph. Angl.* Virgin Ark. *Petiv. Gall.* Coeur en Arche de Noe. *Favart.*

Teſta oblique cordata, ſulcato ſtriata, area cardinis rhomboidali, antrorſum elongata.

Die Schale iſt ſchiefherzförmig, mit geſtreiften Furchen beſezet, die Angelfläche rautenförmig, vorne lang zugeſpizt.

α Teſta transverſim ſtriata, antrorſum angulata, compreſſa, area cardinis plana.

α Die Schale iſt über die Quere geſtreifet, vorne eckig und zuſammengedrückt. Die Angelfläche eben.

Bonan. Recr. *cl.* 2. f. 73.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. f. 70.

Gualt. Teſt. t. 87. f. B.

Knor. Vergn. I. 24. t. 3. 4. f.

β Teſta

β Teſta coſtis decuſſatim ſtriatis, antice ſubexeurrente, rotundata, area introrſum decliui.

β Die Ribben ſind kreuzweiſe geſtreift, der Vorderrand iſt etwas verlängert und rundlicht, die Schloßfläche gegen die Mitte abhängig.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 65.
Rumph. amb. t. 44. *f.* 5.
Petiv. amb. t. 17. *f.* 8.
Gualt. Teſt. t. 87. *f. A.* C.
Adans. Seneg. Pl. 18. *f.* 8.
Murray. Fund. Teſtac. t. 2. *f.* 15.
Mart. Berl. Beſchaeft. III. 6. *t.* 11. *f.*

N. III. 2. Arca rhombea.

N. III. 2. Das Rautenkörbchen.

Teſta cordata, multiſulcata, coſtis mediis transuerſim ſtriatis, apicibus incuruatis remotis, area cardinis rhombea.

Die herzförmige Schale hat viele Furchen, die Ribben ſind in die Quere geſtreifet, die Spizen einwärts gerollet, und die Angelfläche rautenförmig.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 75.
Knor. Vergn. IV. 14. *t.* 2. *f.*

Teſta cordata, aequiualuis, longitudinaliter ſulcata, coſtis 26, intermediis transuerſim ſtriatis. Apices incuruato recurui, remoti. Area inter-

Die Schale iſt herzförmig, gleichklappig, nach der Länge gefurchet, mit 26. Ribben, davon die mittleren in die Quere geſtreifet ſind.

interjecta plana, vere rhombea, lineis inciſis rhomborum concentricorum figuram exacte referentibus; ligamentum membranaceum aream obtegens, inciſuras lineares explens. Sutura cardinis intus armata dentibus minutis, diagonalem areae majorem conſtituit.

Die Spizen ſind einwärts gerollet, etwas zurückgekrümmet, und von einander entfernet. Die darzwiſchen liegende Angelfläche iſt genau rautenförmig, auf welcher gleichfalls rautenförmige in einander liegende Linien ausgeſchnitten ſind. Das hautige Band bedeket die ganze Angelfläche und verſenket ſich in die ausgeſchnittenen Rautenlinien. Die Nath des Angels bildet die größere Diagonallinie, und iſt inwendig mit einer Reihe kleiner Zähne beſezt.

N. III. 3. Arca decuſſata.

N. III. 3. Die gefleckte Kuchenmuſchel.

Linn. S. N. 177.

Gall. Furie flamboyante; *Favart.*

Teſta orbiculari conuexa, glabra, ſulcis longitudinalibus, ſtriiſque tranſuerſis obſoletis, fuſco maculata, apicibus incuruis, limbo acute crenato.

Die Schale iſt rund und gewölbt, glänzend, mit ſchwachen Furchen der Länge nach, und feinen Streifen über die Quere beſezet; auf der Oberfläche braun gefleckt. Die Spizen ſind einwärts gekrümet. Der innere Rand hat ſcharfe Kerben.

Habitus A. piloſae, cujus forte varietas.

Sie hat die Geſtalt der Sammtmuſchel, davon ſie vielleicht eine Abänderung iſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 82.

Bonan. Recr. cl. 2. *f.* 60.

Knor.

Knor. Vergn. VI. 14. *t.* 4. *f.*

N. IV. Margine crenato, apicibus inflexis.

N. IV. Mit gekerbten Rande und einwärts gekrümmten Spitzen.

N. IV. 1. Arca Pectunculus.

N. IV. 1. Die geſtrahlte Kuchenmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 180.

Belg. Geribde Poſſer-doublet. *Mus. Leers. Gall.* Petoncle ſans oreilles. *Dav. Angl.* Spotted Ark.

Teſta orbiculari, complanata, ſulcata, radiata, transuerſim rugoſa, apicibus incuruis, area decliui lanceolata, limbo plicato.

Die Schale iſt rund und etwas platt, mit ſtrahligen Furchen und nach der Quere laufenden Runzelſtreifen. Die Spitzen ſind einwärts gekrümmet, die Angelfläche ſchmal, gegen die Mitte abhängig; der innere Rand gefalten.

Bonan. Mus. Kirch. cl. 2. *f.* 129.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 73.
Knor. Vergn. V. 12. *t.* 4. *f.*
Mart. Berlin. Beſchaeft. III. 6. *t.* 3, 4. *f.*

N. IV. 2. Arca piloſa.

N. IV. 2. Die Sammtmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 182.

Belg. See Noot. *Angl.* Cockle with heary ſtreaks. *Petiv. Gall.* Noix de Mer *Argenv. Ital.* Muſculo hirſuto. *Mus. Moſcard.*

Teſta

Teſta rotunda, umbonata, longitudinaliter tenuiſſime ſtriata, apicibus incuruis, limbo crenato.

Die Schale iſt rund, bauchig, der Länge nach ſehr fein geſtreift, die Spizen einwärts gekrümmet, der innere Rand gekerbet.

α holoſericea, fuſca.

α mit ſammtartigen Ueberzug, von brauner Farbe.

β glabra, fulua.

β mit glatter gelbbrauner Schale.

Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 80.

Petiv. Gaz. *t.* 95. *f.* 7.; *t.* 75. *f.* 7.

Gualt. Teſt. *t.* 73. *f.* *A.*

Knor. *Vergn.* *VI.* 12. *t.* 4. *f.*

Mart. *Berlin.* *Beſchaeft.* *III.* 6. *t.* 1. *f.*

N. IV. 3. Arca ſcripta.

N. IV. 3. Die gezeichnete Kuchenmuſchel.

Teſta orbiculari conuexa laeui, lineis angulatis fuluis picta, apicibus incuruis, limbo crenato.

Die Schale iſt rund und gewölbt, von glatter, und mit gelbbraunen Winkelzügen bemahlter Oberfläche. Die Spizen ſind einwärts gekrümmet, der innere Rand gekerbet.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 80.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta

Teſta conuexa laeuis, ſtriis longitudinalibus tenuiſſimis, ut in A. piloſa, cujus forte varietas eſt. Area decliuis, anguſtata; Cardo rectus linearis. Dentes intus 20 in arcum digeſti, extimi utrinque craſſiores. Ambitus orbicularis. Limbus crenatus.

Die Schale iſt gewölbt, und der Länge nach wie die Sammtmuſchel, davon ſie vielleicht eine Abänderung iſt, ſehr zart geſtreifet. Die Schloßfläche iſt einwärts abhängig, und ſchmal. Die Schloßlinie gerade. Inner derſelben ſtehen 20 Zähne in bogenförmiger Stellung. Der Umfang iſt zirkelrund. Der innere Rand gekerbet.

O. Oſtrea.

O. Die Auſter.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 313.

Teſta biualuis, ſubaurita; Cardo edentulus, foſſula media excauata ouali, ſtriis lateralibus transuerſis.

Die zweyklappige Schale iſt einigermaßen geöhret. Das Schloß iſt ohne Zahn, in der Mitte mit einem ausgehohlten eyförmigen Grübchen, an den Seiten mit Querſtreifen verſehen.

O. I. Pectines auriculis aequalibus.

O. I. Kammuſcheln mit gleichſeitigen Ohren.

O. I. 1. Oſtrea maxima.

O. I. 1. Die Pilgrimsmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 185.

Belg.

Belg. St. Jacobs Schulp. *Rumph. Angl.* St. James Shell. *Gall.* Conque de St. Jacques bariolée. *Argenv. Ital.* Capa ſanta.

Teſta inaequiualui, radiis roduntatis, longitudinaliter ſtriatis.

Die ungleichſeitige Schale hat rundliche nach der Länge geſtreifte Schalen.

Liſt. angl. t. 5. f. 29.
— *Hiſt.* Conch. l. 3. f. 163.
Gualt. Teſt. t. 98. f. A. B.
Regenſ. Samml. I. 2. t. 19. f.
Knor. Vergn. I. 14. t. 1, 2. f.
—— —— II. 14. t. 1. f

O. I. 2. Oſtrea Jacobaea.

O. I. 2. Die Jakobsmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 186.

Belg. Spaanſche St. Jacobs doublet. *Gall.* Coquille de St. Jacques d' Eſpagne.

Teſta inaequiualui, radiis rectangulis, longitudinaliter ſulcatis.

Die ungleichklappige Schale hat geradwinklichte, nach der Länge gefurchte Strahlen.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 3, 4.
Gualt. Teſt. t. 99. f. B.
Ginan. adr. II, t. 16. f. 123.

Regenſ. Samml. I. 7. t. 3. f.

Knor. Vergn. VI. 38. t. 1. f.

O. I. 3. Oſtrea Ziczac.

O. I. 3. Die Neptuns-doſe.

Linn. S. N. Sp. 187.

Belg. Joppe doublet.

Teſta inaequiualui, radiis (18) complanatis, plicis intus prope limbum duplicatis.

Die ungleichklappige Schale hat (18) plattgedrückte Strahlen, mit gedoppelten Falten am inneren Rand.

Regenſ. Samml. I. 11. t. 53. f.

Knor. Vergn. II. 19. t. 3. f. 20. t. 1. f.

O. I. 4. Oſtrea Pleuronectes.

O. I. 4. Die Kompasmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 190.

Belg. Kompas-Schulp. *Angl.* The thin Scallop. *Hill.* *Gall.* L'Euentail. *Dav.*

Teſta aequiualui orbiculata laeui, radiis internis (24) geminatis.

Die gleichklappige ſcheibenrunde glatte Schale, hat inwendig (24) gepaarte Strahlen.

Color operculi rufus, fornicis albus.

Der Deckel iſt braunroth; die gewölbte Klappe weiß.

Rumph.

Rumph. amb. t. 45. f. A. B.
Petiv. Gaz. t. 49. f. 13.
—— *amboin. t. 17. f. 14.*
Gualt. Teſt. t. 73. f. B.
Argenv. Conch. Pl. 24. f. G.
Klein. Meth. Oſtr. t. 9. f. 30.
Hill. Hiſt of. Anim. Pl. 9.
Knor. Vergn. I. 20. t. 3. 4. f.

O. I. 5. Oſtrea Radula. O. I. 5. Die Jägertaſche.

Linn. S. N. Sp. 191.

Belg. Jaagers Weytaſch. *Angl.* Common Amboina Scallop. *Petiv.* *Gall.* Gibeciere en Manteau.

Teſta ſubaequiualui ouali, radiis (12) conuexis decuſſatim ſtriatis, auriculis aequalibus.

Die einigermaßen gleichklappige eyförmige Schale hat (12) erhabene kreuzweis geſtreifte Strahlen, und gleichgroße Ohren.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 12.
Rumph. amb. t. 44. f. A.
Petiv. amboin. t. 17. f. 1.
Knor. Vergn. V. 9. t. 4. f.

O. I. 6. Oſtrea Plica. | O. I. 6. Der gewölkte Mantel.

Linn. S. N. Sp. 192.

Angl. The little yelow Scallop. *Hill.*

Teſta aequiualui glabra, radiis (6) conuexis glabris, decuſſatim ſtriatis.

Die gleichklappige glatte Schale hat (6) erhabene kreuzweis geſtreifte Strahlen.

Rumph. amb. t. 44. *f.* O.

Argenv. Conch. Pl. 24. *f.* C.

Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 10.

Knor. Vergn. V. 10. *t.* 5. 6. *f.*

O. II. Pectines auriculis inaequalibus, altera exciſa, ſcabra.

O. II. Kammmuſchel mit ungleichen Ohren, deren eines ausgeſchnitten und rauh iſt.

O. II. 1. Oſtrea Pallium. | O. II. 1. Der Königsmantel.

Linn. S. N. Sp. 193.

Belg. Königs-Mantel. *Angl.* The Ducal Mantie Scallop. *Gall.* Manteau ducal.

Teſta aequiualui rotundata, radiis 12. obtuſis ſtriata, ſquamisque imbricata.

Die gleichklappige rundliche Schale hat 12. ſtumpfe, geſtreifte, und mit ziegelförmigen Schuppen bedeckte Strahlen.

Rumph.

Rumph. amb. t. 44. f. B. C.

Gualt. Teſt. *t.* 71. *f.* F.

Argenv. Conch. *Pl.* 24. *f.* J

Regenſ. Samml. I. 6. *t.* 59. *f.*

Knor. Vergn. I. 19. *t.* 2. *f.*

—— —— *II.* 21. *t.* 1, 2. *f.*

—— —— *V.* 27. *t.* 2. *f.*

Da Coſt. Elem. 6. *Pl.* 1. *f.*

O. II. 2. Oſtrea nodoſa. O. II. 2. Die Korallenmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 194.

Belg. Koraal - doublet. *Rumph. Gall.* La Coralline. *Dav. Angl.* The Coral Scallop. *Hill.*

Teſta aequiualui, radiis conuexis, ſulcatis, nodoſo articulatis.

Die Strahlen der gleichklappigen Schale ſind erhaben, geſtreifet, uud mit knotigen Buckeln unterbrochen.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 24.

Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 18.

Rumph. amb. *t.* 48. *f.* 8.

Gualt. Teſt. *t.* 91. *f.* C. D.

Argenv. Conch. *Pl.* 24. *f* F.

Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 10.

Knor. Vergn. IV. 13. *t.* 5. *f.*

Spengl. berlin. *Beſchaeft. II.* 13. *t.* 12. *f.*

O. II. 3. Oſtrea elongata.

Teſta ouato elongata, longitudinaliter ſtriata, radiis (8) transuerſim rugoſis, auricula altera minima.

O. II. 3. Der lange Mantel.

Die eyförmige verlängerte und der Länge nach geſtreifte Schale hat (8) in die Quere gerunzelte Strahlen, und ein ſehr kleines Ohr.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ouata, elongata, planiuſcula ſubpellucida; ſtriae eleuatae longitudinales; coſtae 8. transuerſim rugoſae. Margo repandus plicatus. Auriculae inaequales ſupra muricatae, altera minima. Color pallide incarnatus.

Die Schale iſt eyförmig, verlängert, flach und halb durchſichtig. Nach der Länge laufen erhabene Streifen. Die acht Ribben ſind runzelicht. Der Rand iſt ausgeſchweift und gefalten. Die ungleichen Ohren, deren eines ſehr klein iſt, ſind oben rauh. Von blaſſer fleiſchrother Farbe.

O. II. 4. Oſtrea ſulcata.

Teſta aequiualui rotundata, longitudinaliter ſtriata, radiis

O. II. 4. Der gefurchte Mantel.

Die gleichklappige rundliche Schale iſt nach der Länge ge-

(12), auriculis ſubaequalibus. ſtreiſet, mit (12.) ſtrahligen Rib- ben und einigermaßen unglei- chen Ohren verſehen.

α albo fuſcoque maculata, α Weiß und braun gefleckt,

β tota flaua. β ganz gelb.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſubpellucida rotundata, con- uexa, aequiualuis, ſtriis arctis lon- gitudinalibus; Coſtis duodecim ra- diatis. Auriculae fere aequales la- tae.

Die Schale iſt rundlich, bäuchig und halb durchſichtig; die Klappen von gleicher Größe, mit gedräng- ten nach der Länge laufenden Strei- fen beſezet. Die Ohren ſind bei- nahe gleich und breit.

O. II. 5. Oſtrea cinna- barina.

O. II. 5. Der bandir- te Mantel.

Belg. Gebanderde Mantel. *Gall.* Manteau bandé.

Teſta aequiualui, radiis numeroſis inaequalibus, trans- uerſim ruguloſis.

Die gleichklappige Schale iſt mit ſehr vielen ungleichen, und in die Quere geſtreiften Strahlen verſehen.

Gualt. Teſt. t. 73. f. C.

Regenſ. Samml. I. 3. t. 36. f. 4. t. 38. f.

Knor. Vergn. V. 15. t. 1. f.

Teſta rotundata, magna, conuexiuſcula, aequiualuis, longitudinaliter multiſulcata; Radii numeroſi inaequales, ſtriis transuerſis undulatis decuſſati; Auricula altera latior, antice exciſa, margine ciliato. Color extus cinnabarinus, cingulis aliquot pallidis.

Die rundliche groſſe, etwas bäuchige und gleichklappige Schale iſt der Länge nach gefurchet. Die häufigen Strahlen ſind ungleich, und mit wellenförmigen Querſtreichen durchkreuzet. Ein Ohr iſt breiter, vorne ausgeſchnitten, und am Rande rauh. Die ganze Schale iſt auswendig zinnoberroth mit blaſſen Querreiſen.

O. II. 6. Oſtrea miniata.

O. II. 6. Der menningrothe Mantel.

Teſta inaequiualui multiſtriata ſcabra, auriculis ſubaequalibus.

Die ungleichklappige Schale hat ſehr viele rauhe Streife, und beinahe gleiche Ohren.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta rotundata, ſtriis longitudinalibus numeroſis muricatis. Valuae inaequales, altera plana, altera conuexa, excreſcentiis transuerſis lameloſo laceris. Auriculae ſubaequales, altera exciſa margine ciliato. Color albus maculis confluentibus miniatis.

Die rundliche Schale iſt der Länge nach mit rauhen Streifen verſehen. Die Klappen ſind ungleich, deren eine flach, die andere erhaben, und in die Quere mit krauſen Blättern beſezet iſt. Die Ohren ſind beinahe gleich, eines ausgeſchnitten, und am Rande rauh. Die Farbe iſt weiß mit zuſammfließenden menningfarbigen Flecken.

O. II. 7. Oſtrea varia.

O. II. 7. Der bunte Mantel.

Linn.

Linn. S. N. Sp. 199.

Belg. Geſtippelte Mantel. *Gall.* Manteau pointillé.

Teſta aequiualui, radiis (30) ſcabris, auricula altera minima.

Die gleichklappige Schale hat (30) rauhe Strahlen, und ein ſehr kleines Ohr.

α cinnabarina, maculis albidis violaceisque.

α zinnoberfarbig mit weißen und violeten Flecken.

Knor. Vergn. V. 13. *t.* 2. *f.*

β atro violacea.

β ſchwarz violet.

γ alba nebulis violaceis.

γ weiß mit violeten Fleken.

δ luteſcens, fuſcoque varia.

δ gelblich, und braun geſleckt.

Gualt. Teſt. t. 74. *f.* R.
Knor. Vergn. II. 18. *t.* 3. *f.*
——— ——— *V.* 11. t. 3. *f.*

O. II. 8. Oſtrea glabra.

O. II. 8. Der glatte Mantel.

Linn. S. N. Sp. 201.

Teſta aequiualui, radiis (10) laeuibus planiuſculis, ſtriis internis eleuatis, duplicatis.

Die gleichklappige Schale hat (10) glatte etwas flache Strahlen, und innwändig erhabene gedoppelte Streifen.

α flava. — α gelb.

β nigra. — β ſchwarz.

Gualt. Teſt. t. 73. f. H.

Regenſ. Samml. I. 1. t. 10. f.; 8. t. 15. f.

Knor. Vergn. I. 8. t. 5. f.

O. III. 9. Oſtrea maculata. — O. III. 9. Der gefleckte Mantel.

Teſta aequivalvi, longitudinaliter ſtriata, radiis (10) convexis. — Die gleichklappige Schale iſt nach der Länge geſtreifet, und mit (10) erhabenen Strahlen verſehen.

Regenſ. Samml. I. 3. t. 30. 31. f.

Knor. Vergn. II. 18. t. 5. f.

Teſta aequivalvis convexa glabra, longitudinaliter ſtriata; Coſtae (10) convexae. Auriculae ſubaequales. Color ſupra ex albo fuſcoque nebuloſus. — Die gleichklappige bäuchige glatte Schale iſt der Länge nach geſtreifet. Die (10) Strahlrippen ſind erhaben. Die Ohren faſt gleich. Die Farbe iſt weiß, und braun wolkicht.

O. II. 10. Oſtrea coarctata. — O. II. 10. Das Schüſſelchen.

Teſta convexa glabra, radiis (6) convexis, margine coarctato. — Die bäuchige glatte Schale hat (6) erhabene Strahlen und einen eingefaßten Rand.

Valua ſolitaria. Eine einzelne Klappe.

Knor. Vergn. II. 21. t. 5. f.

Teſta conuexa tenuis glabra, longitudinaliter obſolete ſtriata. Radii (6) conuexi craſſi. Margo deorſum flexus undique coarctatus; Limbus crenulatus. Auriculae inaequales; hinc diſtincta ab O. Plica.

Die bäuchige dünne glatte Schale iſt der Länge nach mit matten Streifen verſehen. Die (6) Strahlen ſind erhaben und dick. Der Rand iſt mit einer Stulpe eingefaßt und innwändig gekerbet. Die Ohren ſind ungleich, wodurch ſich dieſe Art von dem gewölkten Mantel unterſcheidet.

O. II. 11. Oſtrea ſolaris.

O. II. 11. Der goldgelbe Mantel.

Teſta rotundata glabra, radiis (20) conuexis, ſulcis longitudinaliter ſtriatis.

Die rundliche glatte Schale hat (20) erhabene Strahlen, und nach der Länge geſtreifte Zwiſchenfurchen.

Valua ſolitaria. Eine einzelne Klappe.

Mus. Caes. Vindobon.

Valua complanata rotundata, radiis (20) conuexis laeuibus, ſulcis intermediis obſolete ſtriatis. Auriculae ſubaequales? Color viuidiſſimus aurantiacus.

Die Klappe iſt rund und flach gedrückt, die (20) Strahlen ſind erhaben und glatt. Die Zwiſchenfurchen matt geſtreifet. Die Ohren etwas ungleich. Die Farbe iſt ein lebhaftes goldgelb.

O. II. 12. Oſtrea opercularis.

O. II. 12. Die ſcharfribbige Kammuſchel.

Linn. S. N. Sp. 136. 202.

Belg. Oranje Mantel. *Gall.* Manteau d'Orange.

Teſta rotundata, radiis (20) carinatis, decuſſatim ſtriato ſcabra, operculo conuexiore.

Die rundliche Schale hat (20) kielförmige, und durch Querſtreife durchkreuzte Strahlen; und einen etwas bäuchigen Deckel.

Knor. Vergn. II. 3. *t.* 2. 3. *f.*

Regenſ. Samml. I. 2. *t.* 17. *f.*

O. II. 13. Oſtrea Nucleus.

O. II. 13. Der Steinkern.

Teſta aequiualui, radiis (20) conuexis glabris, valua utraque conuexa.

Die gleichklappige, beiderſeits bäuchige Schale hat (20) erhabene glatte Ribben.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta rotunda aequiualuis coſtis eleuatis (20), ſulcis intermediis latis transuerſe ſulcatis. Auriculae ſubaequales. Valua utraque umbonata, albo fuſcoque nebuloſa.

Die rundliche gleichklappige Schale hat (20) erhabene Strahlribben, und breite nach der Quere geſtreifte Zwiſchenfurchen. Die Ohren ſind beinahe gleich. Beide Klappen bäuchig, von weiß und braun gewölkter Farbe.

O. II. 14. Oſtrea gibba. O. II. Die gewölbte Doſe.

Linn. S. N. Sp. 203.

Belg. Adama Doublet.

Teſta aequiualui, radiis (24) ſubangulatis, ſulcis intermediis decuſſatim ſtriatis, valua utraque conuexa.

Die gleichklappige, beiderſeits bäuchige Schale hat (24) einigermaßen eckige Strahlen, die mit Querſtreifen durchkreuzet ſind.

Brown. Hiſt. of. Jam. t. 40. f. 10.
Regenſ. Samml. I. 2. t. 16. f.
Knor. Vergn. I. 18. t. 2. f.
—— —— II. 5. t. 4. f.

O. II. 15. Oſtrea pyxidata. O. II. 15. Die gefurchte Doſe.

Teſta inaequiualui, radiis (32) conuexis laeuibus. Valua altera plana.

Die Schale, welche aus einer bäuchigen, und einer flachen Klappe beſtehet, hat (32) erhabene glatte Strahlen.

Mus. Caeſ. Vindobon.

Teſta rotundata, radiis (32) conuexis laeuibus. Valua una plana, altera conuexa, prope auriculam exciſam ciliata. Color albus, fuſco carneoque variegatus.

Die rundliche Schale hat (32) erhabene glatte Strahlen. Eine Klappe iſt flach, die andere bäuchig und nächſt dem ausgeſchnittenen Ohre rauh. Weiß mit fleiſchrothen Flecken.

O. II. 16. Oſtrea undata.

Teſta aequiualui ouata, radiis (18) conuexis, ſulcis tranſuerſim ſtriatis.

O. II. 16. Die wellenförmige Taſche.

Die gleichklappige Schale hat (18) erhabene Strahlen, mit nach der Quere geſtreiſten Zwiſchenfurchen.

Knor. Vergn. II. 4. t. 2. 3. f.

Valuae ſolitariae ouatae, radiis (18-20) conuexis glabris, ſtriis tranſuerſis intercoſtalibus. Color albus, maculis tranſuerſis undatis fuſcis.

Die einzelnen Klappen haben (18-20) erhabene Strahlen, und in die Quere geſtreiſte Zwiſchenfurchen. Die Farbe iſt weiß mit wellenförmigen braunen Querflecken.

O. III. Pectines cardine ſubobliquo, auriculis breuibus, acutis.

O. III. Kammuſcheln mit etwas ſchiefen Schloße, und kurzen ſpizigen Ohren.

O. III. 1. Oſtrea faſciata.

O. III. 1. Die Eismuſchel.

Linn. S. N. Sp. 204.

Teſta aequiualui gibba, radiis (20) tenuibus, ſcabris, cardine obliquo, auriculis acutis.

Die gleichklappige höckerige Schale hat (20) dünne raue Strahlen, ein ſchiefes Schloß, und ſpizige Ohren.

Gualt.

Gualt. Teſt. t. 74. f. E. E. ?

Mus. Caeſ. Vindobon.

O. III. 2. Oſtrea Lima. O. III. 2. Die Feile.

Linn. S. N. 206.

Belg. Raſp. Doublet. *Rumph. Angl.* Grater Scallop. *Petiv. Gall.* Ratiſsoir. *Argenv.*

Teſta aequiualui, antice complanata, radiis (22) fornicato ſquamoſis, cardine obliquo, auriculis inaequalibus.

Die gleichklappige vorne flachgedrückte Schale hat (22) mit rinnenförmigen Schuppen beſezte Strahlen, ein ſchiefes Schloß, und ungleiche Ohren.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 3. f. 14.

Rumph. amb. t. 44. *f.* D.

Petiv. amb. t. 8. *f.* 4.

Argenv. Conch. Pl. 24. *f.* E.

Knor. Vergn. VI. 34. *t.* 3. *f.*

O. III. 3. Oſtrea bullata.

O. III. 3. Die Blaſentaſche.

Teſta ouata aequiualui umbonata, ſulcis longitudinalibus (32); cardine transuerſo, auriculis aequalibus.

Die gleichklappige eyförmige bäuchige Schale hat (32) nach der Länge laufende Furchen, einen ſchiefen Rand, und gleiche Ohren.

Mus.

Teſta oblongo ouata, tumida; ſulcis (32) longitudinalibus. Umbones attenuati in apices breues recuruos. Cardo transuerſus. Lacuna media lata. Auriculae utrinque acutae aequales, Color albus.

Die eyförmig längliche aufgeblaſene Schale hat (32) nach der Länge laufende Furchen. Die Wölbungen verdünnen ſich in kurze, rückwärts gekrümmte Spizen. Das Schloß ſtehet ſchief. Die Höhlung in der Mitte derſelben iſt breit. Die Ohren ſind ſpizig; und einander gleich. Von weißer Farbe.

O. III. 4. Oſtra ſcabra.

O. III. 4. Die rauhe Taſche.

Teſta ouata complanata, ſtriis longitudinalibus deorſum ſcabris, auriculis inaequalibus, altera emarginata.

Die eyförmige zuſammengedrückte Schale hat nach der Länge laufende abwärts rauhe Strahlen, und ungleiche Ohren, deren eines eingeſäumet iſt.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 3. *f.* 13.

Knor. Vergn. VI. 38. *t.* 5. *f.*

Teſta ouata compreſſa; ſtriae longitudinales numeroſae, deorſum ad tactum ſcabrae. Cardo ſubobliquus. Auriculae inaequales, minore emarginata, inter quas teſta hiat. Color niueus.

Die eylange zuſammengedrückte Schale iſt nach der Länge mit ſehr vielen Runzeln beſezet, und abwärts rauh anzufühlen. Das Schloß ſtehet etwas ſchief. Die Ohren ſind ungleich; deren kleineres eingeſäumet iſt, zwiſchen welchen die Schale klafet. Von ſchneeweißer Farbe.

O. IV. 1. Oſtrea Malleus. O. IV. 1. Der polniſche Hammer.

Linn. S. N. Sp. 207.

Belg. Mes hamer. *Rumph. Angl.* The Hammer-Oiſter. *Hill. Gall.* Le Mart.au. *Dav.*

Teſta rudi flexuoſa triloba, lobis tranſverſis oppoſitis.

Die rauhe gedrehte Schale beſtehet aus drey Lappen, deren zween einander entgegen geſezet ſind.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 54.
Rumph. amb. t. 47. *f. A.*
Petiv. amb. t. 20. *f.* 10.
Gualt. Teſt. t. 96. *f.* D. E.
Klein. Meth. Oſtrac. t. 8. *f.* 14.
Seb. Thes. *III. t.* 91. *f.* 4. 5. *t.* 93. *f.* 12.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 9.
Argenv. Conch. *Pl.* 19. *f. H.*
Knor. Vergn. III. 4. *t.* 1. *f.*
Müll. Linn. Naturſyſt. VI. 1. *B.* 2. *t.* 2. *f.*

O. IV. 2. Oſtrea Folium. O. IV. Das Lorbeerblatt.

Linn. S. N. Sp. 209.

Belg. Laurier-blad. *Angl.* The tree Oiſter. *Hill. Gall.* La Feuille du Laurier.

Teſta ouata, margine obtuſe plicato, valuae planioris rachi ſpinoſa amplexicauli.

Die eyrunde am Rande ſtumpf gefaltene Schale hat an der flächeren Klappe eine ſtachlichte klauenförmige Mittelribbe.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 32.

Rumph. amb. t. 47. *f. A.*

Petiv. amb. t. 20. *f.* 1.

Klein. Meth. Oſtrac. t. 8. *f.* 22.

Knor. Vergn. I. 23. *t.* 2. *f.*

O. IV. 3. Oſtrea criſtata.

O. IV. 3. Die Kammauſter.

Teſta rotundata, lamellis imbricatis, margine obtuſe plicato, dentato, apice altero porrecto.

Die rundliche Schale iſt mit Blättchen ziegelförmig beſezet, am Rande ſtumpf, und zahnförmig gefalten. Eine Schloßſpize raget hervor.

Gualt. Teſt. t. 104. *f.* F.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta inaequiualuis membranis imbricatis rugoſis. Margo repandus, obtuſe plicato dentatus. Apex valuae alterius paraſiticae longior, prominens. Cardinis tendo medius latus conicus. Color albus, maculis diſperſis nigris.

Die Schale welche aus ungleichen Klappen beſtehet, iſt mit runzelichten Blättern ziegelförmig beſezet. Der Rand ausgeſchweifet, mit ſtumpfen zahnförmigen ineinander beißenden Falten. Die Spize der aufſizenden Schale iſt verlängert, und in die Höhe geſtrecket. In der Mitte des Schloßes iſt ein breiter kegelförmiger Knorpel. Die Farbe iſt weiß mit zerſtreuten ſchwarzen Flecken.

O. IV. 4. Oſtrea edulis. O. IV. 4. Die gemeine Auſter.

Linn. S. N. Sp. 211.

Belg. Oeſter. *Angl.* Oyſter. *Gall.* Huitre. *Ital.* Oſtrica. *Gin.*

Teſta ſubrotunda complanata, membranis undulatis imbricata, valuula altera plana integerrima.

Die rundliche plattgedrückte Schale iſt mit runzelichten Blättern ziegelförmig bedecket; mit ganzem Rande an der flachen Klappe.

Liſt. angl. t. 4. f. 21.

Bonan. Recr. cl. 2. *f.* 70.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 195. 196.

Gualt. Teſt. t. 102. *f. B.*

Klein. Meth. Oſtrac. t. 8. *f.* 21.

Ginan. adr. II. t. 18. *f.* 127.

Baſt. ſubſ. I. t. 8. *f.* 12.

Knor. Vergn. III. 24. *t.* 2. *f.* 25. *t.* 2. *f.*

O. IV. 5. Oſtrea denticulata. O. IV. 5. Die gezähnelte Auſter.

Teſta rotundata foliacea, valua altera plana paraſitica, cardine utrinque denticulato.

Die rundliche blätterige Schale hat eine flache aufſitzende Klappe, und an beiden Seiten des Schloßes kleine Zähnchen.

STAATSBIBLIOTHEK BAMBERG

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta inaequiualuis, valua altera conuexa ſubouata glabra, altera explanata, rotunda, majore, paraſitica. Cartilago latiſſimus nitidus, Latera poſtica utrinque acute denticulata, inſerenda foueolis teſtae oppoſitae.

Die Klappen der Schale ſind ungleich, deren eine etwas bäuchig eyförmig und glatt, die andere aber, welche aufſizt, iſt flachgedrückt, rundlich und größer. Der Knorpel iſt ſehr breit und glänzend. An den Seiten des Schloßes iſt beiderſeits eine Reihe kleiner ſpiziger Zähne, die in die Grübchen der entgegen geſezten Schale einbeißen.

O. IV. 6. Oſtrea cucullata.

O. IV. 6. Die Runzelkappe.

Teſta inaequiualui plicato rugoſa, margine dentato, intus ſtriato; valua majore cuculata.

Die ungleiche Schale iſt gefalten, und runzelicht, der Rand gezähnt, und inwändig geſtreifet, die größere Klappe kappenförmig.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſolida ponderoſa, plicis longitudinalibus, rugisque transuerſis inaequalis. Valuae inaequales; altera cucullata, rudi, apice porrecto, poſtice longitudinaliter ſecto; altera minore plana. Margo utriusque obtuſe dentatus. Limbus ſtriis diſtantibus eleuatis geminis. Color extus atro violaceus.

Die dichte ſchwere Schale iſt der Länge nach mit breiten Falten, und in die Quere mit Runzeln beſezet. Die Klappen ſind ungleich, die eine kappenförmig, rauh, mit hervorragender ſtumpfen Spize, die hinten flach abgeſchnitten iſt; die andere iſt kleiner und flach. Der Rand beider Klappen hat ſtumpfe Zähne. Am Innerrande ſind erhabene paarweis ſtehende Streifen. Die Farbe iſt auswändig dunkelviolet.

O. IV.

O. IV. 7. Oſtrea Ephippium.

Ö. IV. 7. Der polniſche Sattel.

Linn. S. N. Sp. 215.

Belg. Poolſche Zadel. *Angl.* Flat Pearl Oyſter. *Petiv. Gall.* Selle de Pologne.

Teſta aequiualui rotundata compreſſo membranacea, cardine transuerſim ſulcato.

Die rundliche glatt gedrückte häutige Schale hat gleiche Klappen, und ein in die Quere gefurchtes Schloß.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 62.
Rumph. amb. t. 47. *f.* B.
Petiv. amb. t. 20. *f.* 4.
Seb. Thes. t. 90. *f.* 10.
Knor. Vergn. VI, 21. *t.* 1. *f.*
Da Coſt. Elem. Pl. 6. *f.* 6.
Müll. Linn. Naturſyſt. VI. 1. *B.* 13. *t.* 1. *f.*
Mart. Berl. Beſchaeft. III. 7. *t.* 22. *f.*

P. Anomia.

P. Die Baſtardmuſchel.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 314.

Teſta inaequiualuis, valua altera planiuſcula, cardinis cicatricula lineari.

Die Schale hat ungleiche Klappen, deren eine etwas flach iſt, und eine kleine linienförmige Narbe am Schloſſe.

P. 1. Anomia Ephippium.

P. 1. Die Klebauſter.

Linn. S. N. Sp. 218.

Gall. Pelure d'oignon. *Argenv.*

Teſta ſuborbiculata rugoſo plicata, valua planiore perforata.

Die rundliche mit Runzeln und Falten beſezte Schale hat eine flache durchbohrte Klappe.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 38.
Argenv. Conch. Pl. 19. *f.* C.
Ginan. adr. II. t. 27. *f.* 172.
Müll. Linn. *Naturſ. VI.* 1. *B.* 12. *t.* 3. *f.*

P. 2. Anomia Cepa.

P. 2. Die Zwibelſchale.

Linn. S. N. Sp. 219.

Belg. Paarſche Bernſteen Oeſter. *Gall.* Huitre electrique.

Teſta ſubrotunda amethyſtina, valua ſuperiore conuexa, inferiore perforata.

Die rundliche Schale iſt amethyſtfärbig, ihre obere Klappe bauchig, die untere durchbohret.

Knor. Vergn. VI. 9. *t.* 5. *f.*

P. 3.

P. 3. Anomia electrica. P. 3. Die Bernſteinauſter.

Linn. S. N. Sp. 220.

Belg. Bernſteen - Oeſter. *Angl.* Small Amber Oyſter. *Petiv. Gall.* Huitre d'ambre jaune.

Teſta ſubrotunda laeui flaua, valua altera conuexa gibboſa.

Die rundliche glatte gelbe Schale hat eine bäuchige höckerige Klappe.

Rumph. amb. t. 47. *f.* L.
Knor. Vergn. V. 25. *t.* 6. *f.*

P. 4. Anomia truncata. P. 4. Die geſtumpfte Baſtardmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 229.

Teſta ſuborbiculata, obſolete ſtriata, cardine truncato, limbo denticulato.

Die rundliche feingeſtreifte Schale iſt am Schloße abgeſtumpft, am inneren Rande aber gezähnelt.

Liſt. angl. l. 9. *f.* 50.
Mus. Caes. Vindobon.

P. 5. Anomia caput ſerpentis. P. 5. Der Schlangenkopf.

Linn. S. N. Sp. 236.
Gall. Le ſcarabée *Dav.*

Teſta ouata ſtriata, valuae alterius apice longiore perforato, margine crenulato.

Die eyförmige geſtreifte Schale hat an der einen Klappe eine längere durchbohrte Spize, und am Rande feine Kerben.

Colum. purp. p. 22. f. 2.
Gualt. Teſt. t. 96. f. B.
Mus. Caes. Vindobon.

P. 6. Anomia vitrea.

P. 6. Die Glasbohrmuſchel.

Gall. La Poullete. *Dav.*

Teſta ouata conuexa laeui, valuae alterius apice incuruato pertuſo, margine integerrimo.

Die eyförmige bäuchige glatte Schale iſt an der ſchnabelförmigen Spize der einen Klappe durchbohret, und am Rande ganz.

Ob plicarum defectum à Terebratula Linnaei diſtinguenda.

Sie muß wegen ihrer ungefaltenen Oberfläche von der Bohrmuſchel des Linne unterſchieden werden.

Argenv. Conch. Suppl. Pl. 3. f. E.
Knor. Vergn. IV. 30. t. 4. f.
Da Coſt. Elem. 6. Pl. 3. f.

Teſta ouata laeuis tenuiſſima, inſtar membranae pellucida. Valuae conuexa conuexae absque ſtriis, aut plicis. Valua ſuperior ouata, poſtice in apicem incuruata prominentem & pertuſum; Foramen repletum ligamento filiformi. Valua inferior rotunda, poſtice gerens callos. Margo tenuis, clauſus, integerrimus, anticus retuſus. Color albus.

Die Schale iſt eyförmig glatt, von der Dünne einer feinen Haut, und durchſichtig. Beide Klappen ſind bauchig, ohne Streifen und Falten. Die obere iſt eyförmig, und verlängert ſich in eine gekrümte oder ſchnabelförmige hervorragende durchbohrte Spize, in deren Oefnung ſich ein fadenförmiges Band befindet. Die untere Klappe iſt rund, und hinten mit zween Schwüllen verſehen. Der Rand iſt dünn, geſchloſſen, ganz, und vorne ſtumpf. Die ganze Schale weiß.

P. 7. Anomia Placenta.

P. 7. Die Fenſterſcheibe.

Linn. S. N. Sp. 241.

Belg. Transparant. *Angl.* The chineſe pellucid Oyſter. *Da Coſt.* *Gall.* Vitre chinoiſe. *Dav.*

Teſta orbiculata complanata foliacea, cardinum callis linearibus adnatis.

Die ſcheibenrunde plattgedrückte ſchieferige Schale hat am Schloße zwo wulſtartige angewachſene Erhöhungen.

α valuis planis.

α mit flachen Klappen.

Gualt. Teſt. t. 104. f. B.
Seb. Thes. t. 90. f. 8, 9.
Knor. Vergn. II. 24. t. 1. f.
Da Coſt. Elem. 7. Pl. 13. F.

β valuis flexuoſo bilobis.

β mit lappenförmig gefaltenen Klappen.

Mus. Caeſ. Vindobon.

Q. Mytilus.

Q. Die Mießmuſchel.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 315.

Teſta biualuis, cardinis linea excauata, longitudinali, edentula.

Die zweyklappige Schale hat am Schloſſe einen vertieften langen Streif ohne Zahn.

Q. I. Paraſitici, unguibus affixi.

Q. I. Angewachſene mittelſtelnes klauenförmigen Fortſazes.

Q. I. 1. Mytilus Criſta Galli.

Q. I. 1. Der Hahnenkamm.

Linn. S. N. Sp. 243.

Belg. Haanekam. *Rumph. Angl.* Curry Comb Oyſter *Pet. Gall.* Oreille de Cochon. *Dav.*

Teſta angulato plicata, dorſo limboque punctato ſcabris, valua ſpinoſa paraſitica.

Die eckiggefaltene Schale iſt auf dem Rücken und an dem inneren Rande mit erhabenen Punkten beſezet, und an einer Klappe ſtachlig und angewachſen.

Rumph.

Rumph. amb. t. 47. f. D.

Petiv. amb. t. 20. f. 2.

Argenv. Conch. Pl. 20. f. D.

Gualt. Teſt. t. 104. f. C.

Knor. Verg. IV. 10. t. 3, 5. f.

—— —— V. 16. t. 1. f.

—— Delic. nat. I. t. B. IV. f. 8.

Q. I. 2. Mytilus Hyotis.

Q. I. 2. Der Blätterkamm.

Linn. S. N. Sp. 244.

Belg. Getakte Haane Kam. *Rumph.* *Angl.* Great Finger Oyſter. *Pet.* *Gall* Crete de Coq. *Dav.*

Teſta plicata, transuerſe rugoſa, valuis fornicato ſpinoſis, limbo laeui.

Die gefaltene und der Quere nach runzelichte Schale iſt auf beiden Klappen mit rinnenförmigen Stacheln beſezet, und am inneren Rande glatt.

Rumph. amb. t. 47. f. C.

Petiv. Gaz. t. 20. f. 5.

Argenv. Conch. Pl. 20. f. H.

Gualt. Teſt. t. 103.

Knor. Vergn. I. 29. t. 2. f.

Q. I. 3.

Q. I. 3. Mytilus Frons. | Q. I. 3. Das Kammblatt.

Linn. S. N. Sp. 245.

Belg. Gekamd Laurierblad, *Angl.* The Hogs Ear Oyſter. *Hill.* *Gall.* La Feuille. *Dav.*

Teſta angulato plicata, valuis tranſuerſim rugoſis, limbo alterius punctato ſcabro.

Die eckig gefaltene in die Quere gerunzelte Schale iſt am inneren Rande mit erhabenen Punkten verſehen.

Argenv. Conch. t. 19. f. D.?
Gualt. Teſt. t. 104. f. D.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 9.
Knor. Vergn. IV. 8. t. 3. f.

Q. II. Plani ſubauriti.

Q. II. Platte, mit unvollkommenen Ohren.

Q. II. 1. Mytilus margaritiferus. | Q. II. 1. Die Perlmutter.

Linn. S. N. Sp. 246.

Belg. Perle moer-Schulp. *Rumph.* *Angl.* Pearl Oyſter. *Pet.* *Gall.* Mere Perle *Dav.*

Teſta compreſſa rotundata ſubaurita, tunicis membranaceis imbricata, cardine tranſuerſim elongato.

Die plattgedrückte rundliche und einigermaßen mit Ohren verſehene Schale iſt mit ziegelförmigen Blättern bedecket, und mit einem in die Quere verlängerten Schloße verſehen.

Color

Color tunicarum ſordide virideſcens, radiis latis albis. Speciminis unius valua ponderoſa craſſa, ſpithamam diametro excedens, magaritam fouens adnatam praegrandem.

Die Farbe der Blätter iſt ſchmuziggrün, mit breiten weißen Strahlen. Die Klappe eines Stückes iſt ſchwer, dick, im Durchmeſſer mehr denn eine Spanne lang und enthält eine ſehr große angewachſene Perle.

Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 1.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 3. *f.* 56, 57, 58.

Rumph. amb.. t. 47. *f.* F.

Gualt. Teſt. t. 84. *f.* E. F. G.

Argenv. Conch. *Pl.* 20. *f. A.*

Knor. Vergn.. II. 25. *t.* 1. *f.*

Müll. linn. Naturſ. VI. 1. *B.* 13. *t.* 2, 3. *f.*

Q. III. Ventricoſiuſculi.

Q. III. Etwas bäuchige.

Q. III. 1. Mytilus lithophagus.

Q. III. 1. Die Steinmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 248.

Belg. Steen Moſſel. *Angl.* Stone Peircer. *Pet.* *Gall.* La Datte. *Dav.*

Teſta ſubcilindrica, extremitatibus rotundatis, apicibus recuruis.

Die einigermaßen walzenförmige Schale hat rundliche Seitenende, und zurückgekrümte Endſpizen.

Epidermis decidua, caſtanea, ſaepe transuerſim ſtriata.

Die Oberhaut fällt ab, iſt von kaſtanienbrauner Farbe, und öfters in die Quere geſtreifet.

Liſt.

Liſt. angl. t. 8. f. 37.
Bonan. Recr. cl. 2. f. 28.
Rumph. amb. t. 46. f. F.
Petiv. amb. t. 19. f. 13.
Gualt. Teſt. t. 90. f. D.
Argenv. Conch. Pl. 27. f. L.
Mus. Caes. Vindobon.

Q. III. 2. Mytilus exuſtus.

Q. III. 2. Die gekerbte Mießmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 251.

Teſta ouata, elongata, decuſſatim ſtriata, limbo crenulato.

Die eyförmige verlängerte Schale iſt in die Quere geſtreifet, und am Rande mit feinen Kerben verſehen.

Color extus roſeus.

Von roſenfarber Oberfläche.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 206.
Mus. Caes. Vindobon.

Q. III. 3. Mytilus edulis.

Q. III. 3. Die gemeine Mießmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 253.

Belg. Moſſel. *Gall.* Moule. *Ital.* Muſculo. *Gin.*

Teſta

Teſta ouato trilatera laeui violacea, antice carinata, apicibus acuminatis, terminalibus bidentatis.

Die eyförmige dreyſeitige glatte Schale iſt von violeter Farbe, vorne mit einer kielförmigen Schneide, und an den Endſpizen mit zween Zähnchen verſehen.

α violacea, unicolor.

α violet, einfärbig.

β violacea, radiis rubris.

β violet, mit rothen Strahlen.

Liſt. angl. l. 4. f. 28.
— *Hiſt. Conch. l. 3. f.* 200.
Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 30.
Gualt. Teſt. *t.* 91. *f.* E.
Ginan. adr. *II. t.* 23. *f.* 168.
Memoir. de Paris. 1711. *t.* 3. *f.* 4, 5.
Baſt. Subſ. *t.* 11. *f.* 11.
Regenſ. Samml. *I.* 12. *t.* 71. 72. *f.*
Knor. Vergn. IV. 15. *t.* 1. *f.*

Q. III. 4. Mytilus pictus.

Q. III. 4. Die gefärbte Mießmuſchel.

Gall. Moule arboriſée. *Dav.*

Teſta ouata trilatera, griſea, laeui, antice carinata, apicibus acuminatis terminalibus, bidentatis.

Die eyförmige, dreyſeitige, lichtgraue glatte Schale iſt vorne mit einem kielförmigen Rande, und an den Endſpizen mit zween Zänchen verſehen.

α griſea

α griſea, unicolor.

α lichtgrau, einfärbig.

Mus. Caeſ. Vindobon.

β griſea, lineis angulatis rufis.

β lichtgrau, mit rothbraunen Winkelzügen.

Mus. Caeſ. Vindobon.

γ ex luteo virens, maculis laete viridibus, lineis angulatis rufis.

γ gelblich grün, mit hellgrünen Flecken, und rothbraunen Winkelzügen.

Knor. Vergn. IV. 15. t. 5. f.

Teſta ouato elongata laeuis, antice carinata, poſtice complanata hians, ideoque trilatera, Apices terminales acuminati, dentibus duobus acutis validis, mutuo inſertis, extus conſpicuis. Cauitas variegante nitore replendens. Priori ſimilis, qua tamen gracilior, colore inſuper dentiumque ſtructura praecipue diſtinguitur.

Die eyförmige verlängerte glatte Schale iſt vorne kielförmig erhoben, hinten flachgedrückt klaffend, und daher dreyſeitig. Die Spizen ſtehen an einen verdünten Ende, wo ſich zwo ſtarke ſpitzige von außen ſichtbare Zähne befinden. Die Höhlung hat einen bunten Glanz. Dieſe Art iſt der vorigen ähnlich, aber ſchmähler, und weicht davon durch die Verſchiedenheit der Farbe und der Zähne vorzüglich ab.

Q. III. 5. Mytilus ungulatus.

Q. III. 5. Die Klauenmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 254.

Belg. De breede purpuragtige Moſſel.

Teſta ouato elongata laeui, valuis conuexis poſtice incuruatis, extremitatibus attenuatis, denticulatis.

Die eyförmige verlängerte glatte Schale hat bäuchige hinten eingebogene Klappen; und zugeſpizte gezähnelte Ende.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 201.
Gualt. Teſt. t. 91. *f. E.*
Regenſ. Samml. I. 4. *t.* 47. *f.*

Q. III. 6. Mytilus bidens.

Q. III. 6. **Die geribbte Mieſsmuſchel.**

Linn. S. N. Sp. 255.

Angl. Deep furrowed Cape Muscle, *Petiv. Gall.* Gueule de Souris. *Dav.*

Teſta ouato elongata, longitudinaliter ſulcata, apicibus terminalibus dentatis.

Die eyförmige verlängerte nach der Länge gefurchte Schale hat gezähnelte Endeſpizen.

Petiv. Gaz. t. 57. *f.* 9.
Knor. Vergn. IV. 30. *t.* 3. *f.*

Q. III. 7. Mytilus Modiolus.

Q. III. 7. **Die Papusmuſchel.**

Linn. S. N. Sp. 256.

Belg. Zand Moſſel. *Angl*. The Caroline Muscle *Hill*. *Gall*. Moule de la terre des Papous. *Dav*.

Teſta ouato elongata laeui, poſtice coarctata, hiante, apicibus recuruis, ſubterminalibus.

Die eyrunde verlängerte glatte Schale iſt hinten eingedrückt und klaſend, mit zurückgebogenen nahe am Ende ſtehenden Spizen.

α margine cardinali obtuſo.

α mit ſtumpfem Schloßrande.

β margine cardinali excurrente, ſeu antrorſum angulato.

β mit auslaufendem, oder, vorne zu, eckigem Schloßrande.

Liſt. *Hiſt*. Conch. *l*. 3. *f*. 198.
Petiv. *Gaz*. *t*. 71. *f*. 11.
—— *amboin*. *t*. 19. *f*. 16.
Rumph. *amb*. *t*. 46. *f*. B.
Gualt. *Teſt*. *t*. 91. *f*. *H*.
Argenv. Conch. *Pl*. 22. *f*. C.
Hill. *Hiſt*. of. *Anim*. *Pl*. 9.
Adans. Seneg. *Pl*. 15. *f*. 1.
Knor. *Vergn*. *IV*. 15. *t*. 3. *f*.

Q. III. 8. Mytilus Hirundo.

Q. III. 8. Die Vogelmuſchel.

Linn. *S*. *N*. *Sp*. 262.

Belg. Vogeltje. *Angl*. Flying Muscle. *Petiv*. *Gall*. L'hirondelle. *Dav*.

Teſta

Teſta complanata laeui, valuis baſi transuerſa bilobis, lobo altero elongato.

Die plattgedrückte glatte Schale iſt an dem nach der Quere ſtehenden Schloßrande mit zween Flügeln verſehen, deren einer verlängert iſt.

α castanea, fuſcoque radiata.

α kaſtanienfärbig, mit braunen Strahlen.

β viridis, radiis obſoletis ferrugineis.

β grün, mit matten eiſenroſtigen Strahlen.

Bonan. Recr. *cl.* 2. *f.* 58.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 55.
Rumph. amb. t. 46. *f.* G.
Petiv. amb. t. 19. *f.* 9.
Argenv. Conch. *Pl.* 19. *f. B.*
Gualt. Teſt. *t.* 94. *f. A. B.*
Knor. Vergn. IV. 8. *t.* 5. *f.*
—— —— *V.* 10. *t.* 1, 2. *f.*
—— *Del. nat. I. t. B. IV. f.* 7.

R. Pinna.

R. Die Steckmuſchel.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 316.

Teſta biualuis, valuis coalitis, cardine edentulo.

Die Schale hat zwo aneinander verwachſene Klappen, und am Schloſſe keine Zähne.

R. 1. Pinna pectinata.

R. 1. Der geräucherte Schinken.

Linn. S. N. Sp. 264.

Teſta faſtigiata griſea glabra, obtuſe ſulcata, ſquamis fornicatis cylindricis.

Die graue Schale iſt zugeſpizt, glatt, mit ſtumpfen Furchen, und hohlen zilindriſchen Schuppen beſezet.

Gualt. Teſt. t. 79. *f. A.*
Seb. Thes. III. t. 91. *f.* 3.
Knor. Vergn. II. 26. *t.* 1. *f.*
—— *Delic. nat. I. t. B. V. f.* 3.

R. 2. Pinna nobilis.

R. 2. Der edle Schinken.

Linn. S. N. Sp. 265.

Teſta faſtigiata ſulcata rubicunda, ſquamis canaliculato tubuloſis.

Die zugeſpizte gefurchte röthliche Schale hat hohle rinnenartige Schuppen.

Bonan. Recr. cl. 2. *ſ.* 24.
Argenv. Conch. Pl. 21. *f. B.*
Adans. Seneg. Pl. 15. *f.* 5.
Knor. Vergn. II. 26. *t.* 2. *f.*

R. 3. Pinna muricata. R. 3. Die gedornte Steckmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 266.

Belg. Gedoord Hammetje. *Angl.* Prickley Ham Muscle *Petiv. Gall.* Jamboneau épineux.

Teſta ſtriata albida, ſquamis fornicatis, approximatis, acutis.

Die gefurchte weißliche Schale hat hohle, dünne, gedrängt ſtehende Schüppchen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. *f.* 215.

Rumph. amb. t. 46. *f. M.*

Petiv. amb. t. 19. *f.* 14.

Gualt. Teſt. t. 79. *f. D.*

Knor. Vergn. VI. 20. *t.* 1. *f.*

R. 4. Pinna incuruata. R. 4. Der lange Schinken.

Teſta faſtigiata, ouata, ſquamis fornicatis breuibus, extremitate altera rotundata.

Die eyförmige zugeſpizte Schale iſt mit kurzen hohlen Schuppen beſezet, und an einem Ende rundlich.

Seb. Thes. t. 91. *f.* 1.

Gualt. Teſt. t. 80.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ouata elongata grandis, extremitate una attenuata, altera rotundata, Valvae convexae ſuperficies externa vix manifeſte ſtriata, tecta ſquamulis fornicatis breuibus approximatis. Color præſertim ca-

Die Schale iſt eyförmig verlängert, an einem Ende zugeſpizet, am andern rundlich, von beträchtlicher Gröſze. Die Klappen ſind gewölbet die äußere Oberfläche kaum merklich geſtreifet, und mit gedrängten uita-

uitatis carneus, Apices intus ſaepe margaritacei.

kurzen hohlen Schüppchen beſezet. Die Farbe beſonders der Höhlung iſt fleiſchroth. Die Spitzen haben inwendig oft einen Perlmutterglanz.

R. 5. Pinna Vexillum.

R. 5. Die Fahne.

Teſta faſtigiato triangula laeui, margine poſtico excurrente lobiformi.

Die zugeſpizte dreyeckige glatte Schale hat einen lappenförmig ausgebreiteten Vorderrand.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta faſtigiata, conuexa, craſſa, laeuis. Valuae triangulæ, extremitate una attenuata, oppoſita obtuſa, lata; Margo poſticus curuilineus, ſupra excurrens lobiformis. Color fuſcus.

Die Schale iſt zugeſpizt, bäuchig, dick und glatt. Die Klappen ſind dreyeckig, das eine End zugeſpizt, das andre ſtumpf und breit. Der Hinterrand iſt krummlinig, und obenzu lappenförmig ausgebreitet. Von brauner Farbe.



Ordo

Ordo tertius. Dritte Ordnung.

Uniualuia. Einſchalige.

A. Argonauta. A. Der Segler.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 317.

Teſta unilocularis, cymbiformis, membranacea, ſpira inuoluta.

Die einkammerige, nachenförmige, dünne Schale hat einen eingerollten Schnirkel.

A. 1. Argonauta Argo. A. 1. Der papierne Segler.

Linn. S. *N. Sp.* 271.

Belg. Docke huiiien. *Rumph.* *Angl.* The paper Nautilus. *Hill.* *Gall.* Nautile papyracé. *Argenv.* *Ital.* Polpo Moſcardino.

Teſta compreſſa, carina nodulosa.

Die zuſammengedrückte Schale hat einen knotigen Kiel.

α carina tenui, teſtae rugis biſurcatis.

α mit ſchmalem Kiele und gabelförmigen Runzeln.

Belg. Docke-huiſje *Rumph.* *Angl.* The great britele Saylor, *Petiv.* *Gall.* Nautile papyracé à carene retrecie *Ital.* Moſcarolo. Bonan. *Germ.* Der ſchmalkielige Seegler.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. s. 4. f. 7.
Rumph. amb. t. 18. f. A.
Petiv. amb. t. 10. f. 1.
Gualt. Teſt. t. 11. f. A. B. t. 12. f. A.
Klein. Meth. Oſtr. t. 1. f. 3.
Seb. Thes. III. t. 84. f. 5, 7.
Gev. Beluſt. 2. t. 4, 5. f.
Argenv. Conch. Pl. 5. f A.
—— Zoom. Pl. 2. f. 2.
Hill. Hiſt. of. Anim. 7. Pl.
Knor. Vergn. I. 2. t. 1. f.
—— —— VI. 31. t.
—— Delic. nat. I. t. B. I. f. 3.
Mart. Konch. Kab. I. 17. t. 157 f.
Da Coſt. Elem. Pl. 3. f. 6.

β carina lata, obtuſe ſerrata, coſtis rarioribus.

β mit breitem Kiele und von einander entfernten Ribben.

Belg. Breedkielde papiere Nautilus. *Angl.* The Courſe brittle Saylor. *Petiv.* *Gall.* Nautile papyracé a large carene.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. f. s. 4. f. 6.
Rumph. amb. t. 18. f. B.
Petiv. amb. t. 10. f. 2. t. 22. f. 10.
Gualt. Teſt. t. 12. f. C.
Gev. Beluſt. 2. t. 6, 7. f.

Ar-

Argenv. Conch. Pl. 5. f. B.
Seb. Thes. III. t. 84. f. 9 — 12.
Knor. Vergn. I. 2. t. 2. f.
—— Del. nat. I. t. B. 1. f. 4.
Mart. Konch. Kab. I. 17. t. 158, 159. f.
Murray. Fund. Teſtac. t. 1. f. 8.

B. Nautilus.

B. Die Kammerſchnecke.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 318.

Teſta polythalamia, diſſepimentis ſiphone communicante perforatis.

Die Scheidewände der vielkammerigen Schale ſind mit einer gemeinſchaftlichen Röhre durchbohret.

B. 1. Nautilus Pompilius.

B. 1. Der dicke Schifboot.

Linn. S. N. Sp. 273.

Belg. Parl-Slakke; *Rumph. Angl.* Thick Sail-Shell. *Gall.* Nautile à cloiſons. *Argenv.*

Teſta ſubrotunda compreſſa, apertura cordata, anfractibus obtectis, inuolutis, laeuibus.

Die rundliche zuſammengedrückte Schale hat eine herzförmige Mündung und verborgene, eingerollte, glatte Windungen.

Liſt. Hiſt. Concb. l. 4. s. 4. f. 7.
Rumph. amb. t. 18. f. A.
Petiv. amb. t. 10. f. 1.
Gualt. Teſt. t. 11. f. A. B. t. 12. f. A.
Klein. Meth. Oſtr. t. 1. f. 3.
Seb. Thes. III. t. 84. f. 5, 7.
Gev. Beluſt. 2. t. 4, 5. f.
Argenv. Conch. Pl. 5. f A.
—— Zoom. Pl. 2. f. 2.
Hill. Hiſt. of. Anim. 7. Pl.
Knor. Vergn. I. 2. t. 1. f.
—— —— VI. 31. t.
—— Delic. nat. I. t. B. I. f. 3.
Mart. Konch. Kab. I. 17. t. 157 f.
Da Coſt. Elem. Pl. 3. f. 6.

β carina lata, obtuſe ſerrata, coſtis rarioribus.

β mit breitem Kiele und von einander entfernten Ribben.

¶ *Belg.* Breedkielde papiere Nautilus. *Angl.* The Courſe brittle Saylor. *Petiv. Gall.* Nautile papyracé a large carene.

Liſt. Hiſt. Concb. l. 4. f. s. 4. f. 6.
Rumph. amb. t. 18. f. B.
Petiv. amb. t. 10. f. 2. t. 22. f. 10.
Gualt. Teſt. t. 12. f. C.
Gev. Beluſt. 2. t. 6, 7. f.

Ar-

Argenv. Conch. *Pl.* 5. *f.* B.
Seb. Thes. III. t. 84. *f.* 9 — 12.
Knor. Vergn. I. 2. *t.* 2. *f.*
—— *Del. nat.* I. t. B. 1. *f.* 4.
Mart. Konch. Kab. *I.* 17. *t.* 158, 159. *f.*
Murray. Fund. *Teſtac.* t. 1. *f.* 8.

B. Nautilus. — B. Die Kammerſchnecke.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 318.

Teſta polythalamia, diſſepimentis ſiphone communicante perforatis.

Die Scheidewände der vielkammerigen Schale ſind mit einer gemeinſchaftlichen Röhre durchbohret.

B. 1. Nautilus Pompilius. — B. 1. Der dicke Schifboot.

Linn. S. N. Sp. 273.

Belg. Parl-Slakke; *Rumph. Angl.* Thick Sail-Shell. *Gall.* Nautile à cloiſons. *Argenv.*

Teſta ſubrotunda compreſſa, apertura cordata, anfractibus obtectis, inuolutis, laeuibus.

Die rundliche zuſammengedrückte Schale hat eine herzförmige Mündung und verborgene, eingerollte, glatte Windungen.

Bonan. Recr. cl. 1. f. 1, 2.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. s. 4. f. 3, 4.

Rumph. amb. t. 17. f. A.

Valent. Abh. 1. t. 4. f.

Petiv. Gaz. t. 99. f. 9.

——— amb. t. 3. f. 7.

Gualt. Teſt. t. 17. f. A, B.

Argenv. Conch. Pl. 5. f. E.

Klein. Meth. Oſtr. t. 1. f. 1, 2.

Knor. Vergn. I. 1. t. 1. f. 2. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 18. t. 164. f.

— — — — 19. t. 165. 166, 167. f.

Da Coſt. Elem. Pl. 2. f. 16.

B. 2. Nautilus Spirula. B. 2. Das Poſthorn.

Linn. S. N. Sp. 279.

Belg. Poſthoorntje *Rumph*, *Angl.* The Rams Horn. *Da Coſt. Gall* Corne d'Ammon.

Teſta inuoluta, tereti, anfractibus conſpicuis, apertura orbiculari.

Die eingerollte walzenförmige Schale hat ſichtbare Windungen, und eine runde Mündung.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 4. f. 2.

Bonan. Mus. Kirch. cl. 1. ſ. 39.

Rumph.

Rumph. amb. t. 20. f. 1.
Petiv. amb. t. 22. f. 4.
Gualt. Teſt. t. 19. f. E.
Swammerd. Bibl. nat. I. 7. t. 7. 8. f.
Gev. Beluſt. 3. t. 8. f. a. b.
Knor. Vergn. I. 2. t. 6. f.
Mart. Konch. Kab. I. 20. t. 184. 185. f.
Da Coſt. Elem. Pl. 2. f. 19.

C. Conus. — C. Die Tutenſchnecke.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 319.

Teſta conuoluta turbinata; apertura longitudinalis edentula; columella laeuis.

Die zuſammengerollte tutenförmige Schale hat eine nach der Länge herab laufende Mündung, ohne Zähne, und eine glatte Spindel.

C. I. Spira planiuſcula. — C. I. Mit einem flachen Wirbel.

C. I. 1. Conus marmoreus. — C. I. 1. Die Herztute.

Linn. S. N. Sp. 290.

Teſta conica, maculis ſubcordatis albis; ſpirae anfractibus canaliculatis.

Die kegelförmige Schale hat herzähnlige weiße flecken, und rinnenförmig ausgekehlte Wirbelgewinde.

α nigreſcens, maculis aggregatis.

α ſchwärzlich, mit nahe aneinander ſtehenden Flecken,

Belg. Hart-Toot. *Rumph. Angl.* Tyger-Shell *Hill. Gall.* Tigre noir. *Argenv.*

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 39.
Rumph. amb. t. 32. f. N.
Petiv. Gaz. t. 47. f. 11.
Valent. Abb. t. 3. f. 25. t. 7. f. 65. A.
Gualt. Teſt. t. 22. f. D.
Seb. Thes. III. t. 46. f. 1 — 4. 13 — 19.
— — — t. 47. f. 1. t. 55. f. 23.
Adans. Seneg. Pl. 6. f. 1.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 7.
Regenſ. Samml. I. 5. t. 53. f.
Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 685. f.

β teſta rufa, maculis aggregatis.

β rothbraun, mit nahe aneinander ſtehenden Flecken.

Belg. Root-Hart-Toot. *Gall.* Leopard rouge. *Argenv.*

Bonan. Recr. cl. 3. f. 123.
Rumph. amb. t. 32. f. 1.

Valent.

Valent. Abh. t. 5. f. 43.
Seb. Thes. III. t. 42. f. 2. 4.
Argenv. Conch. Pl. 12. f. O.
Knor. Vergn. I. 15. t. 2. f.
—— —— IV. 17. 1. f.
Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 686. f.

γ teſta nigra, maculis rarioribus.

γ ſchwarz, mit etwas zerſtreuten Flecken.

Belg. Schout by Nagt. *Gall.* Contre Ammiral

Valent. Abh. t. 2. f. 10. t. 5. f. 44.
Seb. Thes. III. t. 46. f. 5 — 12. t. 47. f. 5. 6.
Knor. Vergn. I. 7. t. 4. f.
Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 687. 688. f.

C. I. 2. Conus imperialis.

C. I. 2. Die Krontute.

Linn. S. N. Sp. 291.

Belg. Kroon-Horn. *Rumph.* *Angl.* Crown-Stamper. *Petiv.* *Gall.* Couronne imperiale *Argenv.*

Teſta conica alba, faſciis ochraceis, lineisque articulatis transuerſis.

Die kegelförmige weiße Schale hat ochergelbe Bänder, und linienförmige unterbrochene Quergürteln.

Spi-

Spirae anfractus coronati.

Die Wirbelgewinde ſind mit Knoten gekrönet.

Rumph. amb. t. 34. f. H.
Petiv. amb. t. 7. f. 6.
Gualt. Teſt. t. 22. f. A.
Seb. Thes. III. t. 47. f. 18 — 20.
Argenv. Conch. Pl. 11. f. F.
Knor. Vergn. II. 11. t. 2. f.
Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 690. 691. f.

C. I. 3. Conus fuſcatus.

C. I. 3. Die ſchwarzbraune Krontute.

Belg. Tuecte Kron-hoorn. *Angl.* Blaauw's Stamper. *Pet.*

Teſta alba fuſco maculata, lineis transuerſis obſcurioribus interruptis.

Die weiße und braungefleckte Schale hat linienförmige unterbrochene ſchwarzbraune Gürteln.

Rumph. amb. t. 34. f. J.
Petiv. amb. t. 15. f. 17.
Klein Meth. Oſtr. t. 4. f. 84.
Seb. Thes. III. t. 3. f. 35.
Argenv. Conch. Pl. 12. f. E.
Regenſ. Samml. I. 3. t. 35. f.
Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 692. 693. f.

Teſta

Teſta obuerſe conica fuſca, maculis longitudinalibus confluentibus albis. Cingula tenuia transuerſa, atrofuſca, interdum albo articulata. Spira planiuſcula. Anfractus dentibus coronati. Mucro centralis prominulus.

Die Schale iſt verkehrt kegelförmig, von brauner Farbe. Nach ihrer Länge herab, laufen zuſammenfließende weiſſe Flecken. Die linienförmigen ſchwarzbraunen Gürteln ſind manchmal weiß gegliedert. Der Wirbel iſt etwas flach. Die Gewinde ſind mit knotigen Kronen beſezet. Die Wirbelſpize ragt in der Mitte hervor.

C. I. 4. Conus litteratus.

C. I. 4. Die Tigertute.

Linn. S. N. Sp. 292.

Belg. Letter-Hoorn. *Rumph.* *Angl.* Horn-Book-ſtamper. *Pet.* *Gall.* Damier. *Dav.*

Teſta conica alba, maculis quadratis, ſeriatim digeſtis.

Die kegelförmige weiße Schale iſt mit würflichten Flecken reihenweiſe beſezet.

Bonan. Recr. *el.* 3. *f.* 363.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. 5. 10. *p.* 2. *f.* 20.
Rumph. *amb. t.* 31. *f.* D.
Petiv. Gaz. *t.* 41. *f.* D.
—— *amb. t.* 2. *f.* 5.
Gualt. Teſt. *t.* 21. *f.* O.
Argenv. Conch. *Pl.* 12. *f.* I.

Sed.

Seb. Theſ. III. t. 45. f. 1. — 5.
Regenſ. I. 3. t. 29. f.
Knor. Vergn. I. 16. t. 3. f.
—— —— III. 3. t. 2. f.
—— —— IV. 26. t. 1. f.
—— Delic nat. I. t. B. III. 4. f.
Mart. Konch. Kab. II. 60. t. 666 — 669. f.
Da Coſt. Elem. Pl. 5. f. 9.

α punctis fuſcis ſubaequalibus; absque faſcia transuerſa.

α mit beinahe gleichgroßen braunen Punkten, ohne Querband.

β punctis fuſcis ſubaequalibus, absque faſcia transuerſa, ſpira nodoſo coronata.

β mit beinahe gleichgroßen braunen Punkten ohne Querband, und gekrönter Wirbelſpize.

γ punctis fuſcis confertis, faſcia gemina flaua.

γ mit gedrängt ſtehenden braunen Punkten und gedoppelten gelben Bande.

δ punctis fuſcis diſtinctis. faſciis tribus flaueſcentibus.

δ mit zerſtreuten braunen Punkten, und drey gelblichen Bändern.

ε maculis quadratis fuſcis, faſciisque tribus transuerſis latis.

ε mit würflichten braunen Flecken, und drey breiten Querbändern.

ζ maculis punctisque confluentibus fuluis.

ζ mit zuſammenfließenden rothgelgelben Flecken, und Punkten.

C. I. 5. Conus generalis.

C. I. 5. Das Klöppelküſſen.

Linn. S. N. Sp. 293.

Belg. Speeldewerk Kuſſen. *Rumph.* *Angl.* Net-liſted-Stamper *Petiv.* *Gall.* La Flamboyante *Argenv.*

Teſta conica ferruginea, faſciis tribus interruptis albis, anfractibus canaliculatis.

Die kegelförmige roſtfärbige Schale hat drey weiße unterbrochene Bänder, und ausgekehlte Wirbelgewinde.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *s.* 10. *p.* 2. *f.* 34.

Petiv. *Gaz.* I. *t.* 27. *f.* 11.

—— *amb. t.* 3. *f.* 9.

Rumph. *amb. t.* 33. *f.* Y.

Gualt. *Teſt. t.* 20. *f.* G.

Seb. Thes. *III. t.* 54. *f.* 11 — 13.

Argenv. Conch. *Pl.* 12. *f.* T.

Regenſ. Samml. I. 6. *t.* 65. *f.*

Knor. *Vergn.* III. 17. *t.* 4, 5. *f.* 18. *t.* 3, 4. *f.*

Mart. Konch. Kab. *II.* 58. *t.* 648 — 652. *f.*

Da Coſt. Elem. *Pl.* 5. F. 8.

α faſciis fuſcis.

α mit braunen Bändern.

β faſciis fulvis.

β mit rothgelben Bändern.

C. I. 6. Conus candidus.

C. I. 6. Die weiße Krontute.

Teſta conica glabra alba, ſpirae anfractibus coronatis.

Die kegelförmige glatte weiſſe Schale hat gekrönte Wirbelgewinde.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta conica ſolida niuea; Venter conuexiuſculus; Apex centralis prominulus, decorticatus, amethyſtinus.

Die kegelförmige dichte Schale iſt weiß, einigermaßen bauchig. Die abgenüzte in der Mitte hervorragende Wirbelſpize iſt amethyſtfarbig.

C. I. 7. Conus Virgo.

C. I. 7. Die Mennonitentute.

Linn. S. N. Sp. 294.

Belg. Mennoniſt Toot. *Rumph. Angl.* Wax-ſtamper. *Petiv. Gall.* Bout de Chandelle. *Dav.*

Teſta conica pallida, transuerſim rugoſo ſtriata, baſi violacea.

Die kegelförmige weißliche, der Quere nach runzelicht geſtreifte Schale hat eine violete Grundſpize.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *s.* 10. *p.* 2. *f.* 3.
Rumph. amb. t. 31. *f.* E.
Petiv. amb. t. 8. *f.* 9.
Gualt. Teſt. t. 20. *f.* B.

Seb.

Seb. *Thes.* III. t. 47. f. 8, 9.

Knor. *Vergn.* III. 22. t. 1. f.

Mart. Konch. Konch II. 53. t. 585. f.

C. I. 8. Conus teſſulatus.

C. I. 8. Der Eſtrich.

Belg. Italianſche Vloerken. *Angl.* The italien Parement. *Gall.* Nappe d'Italie.

Teſta conica alba, maculis oblongis cinnabarinis; baſi ſulcata, amethyſtina.

Die kegelförmige weiße Schale hat langwürflichte zinnoberrothe Flecken und eine gefurchte ametyſtfarbige Grundſpize,

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *s.* 10. *p.* 2. *f.* 17.

Valent. Abh. 6. t. 52. f.

Gualt. *Teſt.* t. 21. f. H.

Seb. Thes. III. t. 55. f. 4 — 9.

Regenſ. *Samml.* I. 8. t. 19. f.

Knor. *Vergn.* II. 12. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 653. f.

An praecedentis varietas?

Vielleicht eine Abänderung der vorhergehenden Art.

C. I. 9. Conus Capitaneus.

C. I. 9. Die Käſetute.

Linn. S. N. Sp. 295.

Belg. Groene Kaas *Rumph. Angl.* Green ſtamper. *Pet. Gall.* L'Hermine *Dav.*

Teſta conica glabra, faſciis duabus albis fuſco maculatis.

Die kegelförmige glatte Schale hat zwey braun gefleckte Querbänder.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *s.* 10. *p.* 2. *f.* 27.

Rumph. amb. *t.* 33. *f.* X.

Petiv. amb. *t.* 9. *f.* 11.

Gualt. Teſt. *t.* 22. *f.* M.

Seb. Thes. *III. t.* 22. *f.* 26, 27, 30, 31, 33.

Argenv. Conch. Pl. 12. *f.* K.

Regenſ. Samml. *I.* 7. *t.* 7. *f.*

Knor. Verg. I. 15. *t.* 3. *f.*

—— —— *V.* 16. *t.* 2. *f.*

Mart. Konch. Kab. *II.* 59. t. 660-662. *f.*

α oliuacea. — *α* olivengrün.

β rufa. — *β* rothbraun.

C. I. 10. Conus miles. — C. I. 10. Die Zwirntute.

Linn. S. N. Sp. 296.

Belg. Arakans-Garen. *Rumph. Angl.* Garter ſtamper. *Petiv. Gall.* Le Nauet. *Argenv.*

Teſta conica albida, faſciis duabus tranſuerſis fuſcis.

Die kegelförmige weiße Schale hat zwey braune Querbänder.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. s. 10. p 2. f. 34.

Rumph. amb. t. 33. f. W.

Petiv. amb. t. 8. f. 1.

Gualt. Teſt. t. 20. f. N.

Seb. Thes. III. t. 42. f. 23, 25.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. L.

Knor. Vergn. I. 15. t. 4. f.

—— —— III. 1. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 663. 664. f.

C. I. 11. Conus Centurio.

C. I. 11. Der Orangenkegel.

Teſta conica, baſi attenuata transuerſim ſulcata, anfractibus canaliculatis.

Die kegelförmige Schale iſt an dem zugeſpizten Grunde in die Quere gefurchet, und an den Gewinden ausgekehlet.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta conica, laeuis; Baſis attenuata, ſulcis transuerſis. Spira planiuſcula. Anfractus contigui, canaliculati. Vertex obtuſus centralis Color aurantius. Faſciae duae transuerſae albae, lineis aurantiis angulatis oblique transcurrentibus.

Die Schale iſt kegelförmig und glatt. Der Grund zugeſpizt, und in die Quere gefurchet. Der Schnirkel flach. Die Gewinde berühren einander, und ſind rinnenförmig ausgekehlet. Der ſtumpfe Wirbel ſtehet in der Mitte. Die Farbe iſt orangengelb. Zwey breite Querbänder ſind mit ſchiefen orangenfarbigen eckigen Linien durchzogen.

C. II. Spira pyramidata. | C. II. Mit einem pyramidenförmigen Wirbel.

C. II. 1. Conus Princeps.

C. II. 1. Die Baſtardbauernmuſik.

Linn. S. *N.* *Sp.* 297.

Belg. Baſtert Tygers Katje. *Gall.* La fauſſe Hebraique. *Dav.*

Teſta turbinata fuſco nigra, lineis longitudinalibus, flexuoſis, pallidis.

Die ſpizwirblige Schale iſt braunſchwarz, und mit blaſſen gekrümten Strichen nach der Länge herab beſezet.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *s.* 10. *p.* 2. *f.* 26.
Valent. Abh. 11. *t.* 94. *f.*
Gualt. *Teſt.* *t.* 25. *f.* Q.
Argenv. Conch. *Pl.* 12. *f.* B.
Seb. *Thes.* *III.* *t.* 47. *f.* 30, 31.
Knor. *Vergn.* *III.* 4. *t.* 2. *f.*
Mart. Konch. *Kab.* *II.* 63. *t.* 699. 700. *f.*

C. II. 2. Conus Ammiralis.

C. II. 2. Die Admiraltute.

Linn. S. *N.* *Sp.* 298.

Belg. Opper-Admiral. *Angl.* Burg's-ſtamper. *Petiv.* *Gall.* Le grand Admiral. *Argenv.*

Teſta

Teſta fulua, maculis diſperſis albis, faſciisque transuerſis reticulatis.

Die rothbraune Schale iſt mit zerſtreuten Flecken beſezet, und mit nezförmigen Querbändern umgeben.

α faſciis transuerſis tribus, ſecunda cingulo articulato bifariam diuiſa.

α mit drey Querbändern, davon das zweyte durch einen gegliederten Gürtel abgetheilet iſt.

Rumph. amb. t. 34. *f.* B.

Petiv. amb. t. 14. *f.* 18.

Argenv. Conch *Pl.* 12. *f.* N.

Adans. Seneg. Pl. 6. *f.* 4.

Seb. Thes. III. *t.* 48. *f.* 5, 6.

Knor. Vergn. I. 8. *t.* 2. *f.*

—— *Delic. nat.* I. *t. B. V. f.* 6.

β faſciis quatuor, ſecunda obſoleta tenui, tertia cingulo articulato bifariam diuiſa.

β mit vier Bändern, davon das zweyte unvollkommen und ſchmal, das dritte durch einen gegliederten Gürtel abgetheilet wird.

γ faſciis quatuor, ſecunda obſoleta tenui, tertia lata, cingulis articulatis duobus trifariam partita.

γ mit vier Bändern, davon das zweyte unvollkommen und ſchmal iſt, das dritte breite aber durch zwey gegliederte Gürteln dreymal abgetheilet wird.

Petiv. amb. t. 15. *f.* 11.

Argenv. Suppl. *Pl.* 1. *f.* P.

Seb. Thes. *III. t.* 48. *f.* 4. 6.

Mus. Caes. Vindobon.

C. II. 3. Conus Senator.

C. II. 3. Die Schildkrötentute.

Linn. S. N. Sp. 300?

Belg. Schildpad-Toot. *Gall.* Ecaile de tortue.

Teſta ouata nebuloſa laeui, transuerſim articulato ſtriata.

Die eyförmige nebelichte glatte Schale iſt mit unterbrochenen Querſtreifen umgeben.

Seb. Thes. *III.* t. 43. f. 29, 36.
Knor. Vergn. *VI.* 1. t. 5. f.
Mart. Konch. Kab. *II.* 55. t. 609 — 611. f.

C. II. 4. Conus genuanus.

C. II. 4. Die guineiſche Tute.

Linn. S. N. Sp. 302.

Belg. Geneeſche Toot. *Gall.* Aile de papillon. *Argenv.*

Teſta pallido rubra, cingulis albo fuſcoque articulatis.

Die blaßrothe Schale iſt mit weiß und braun unterbrochenen Bändern umgeben.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 337.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 16.
Rumph. amb. t. 34. f. G.

Argenv. Conch. *Pl.* 12. *f. V.*

Seb. *Thes.* *III.* *t.* 48. *f.* 1 — 3.

Knor. *Vergn.* *III.* 1. *t.* 1. *f.*

Mart. Konch. Kab. *II.* 56. *t.* 623 — 625.

C. II. 5. Conus Monachus.

C. II. 5. Der Mönch.

Linn. S. *N.* *Sp.* 304.

Belg. Graeuve Munniker. *Rumph.* *Angl.* Gray Monk. *Petiv.*

Teſta laeui fuſca, albo & coeruleſcente nebulata, baſi transuerſe ſulcata.

Die glatte braune, weiß und hellblau wolkigte Schale hat eine in die Quere gefurchte Grundſpize.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 126.

Rumph. amb. *t.* 33. *f.* CC.

Petiv. amb. *t.* 15. *f.* 7.

Valent. Abh. 9. *t.* 74. *f.*

Seb. Thes. *III.* *t.* 48. *f.* 45.

Regenſ. Samml. I. 12. *t.* 68. *f.*

Knor. *Vergn.* *III.* 16. *t.* 2. *f.*

—— —— *V.* 18. *t.* 4. *f.*

Mart. Konch. Kab. *II.* 55. *t.* 614. *f.*

C. II. 6. Conus minimus.

C. II. 6. Der graue Mönch.

Linn. S. N. Sp. 305.

Gall. La minime, *Dav.*

Teſta ouato oblonga, glauco albidoque nebuloſa, lineis fuſcis interruptis cincta.

Die eyförmige längliche blaulicht graue Schale hat weiſe Wolken und braune unterbrochene Querſtreiſe.

Variat etiam ſpira coronata.

Es giebt auch eine Abänderung mit gekröntem Wirbel.

Valent. Abh. 3. t. 24. f.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. A.

Knor. Vergn. III. 27. t. 2. f.

C. II. 7. Conus Mercator.

C. II. 7. Die bandirte Neztute.

Linn. S. N. Sp. 307.

Belg. Net - Tootje.

Teſta ouata alba, faſciis latis reticulatis fuluis.

Die eyförmige weiße Schale hat breite eyförmige rothgelbe Bänder.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 41.

Valent. Abh. 7. t. 65. B. f.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. P.

Adans. Seneg. t. 6. f. 3.

Knor. Vergn. II. 1. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 620. f.

C. II. 8. Conus reticulatus.

C. II. 8. Das Fiſchernez.

Gall. Drap à reſeau.

Teſta ouato oblonga niuea, undique fuluo reticulata.

Die eyförmige längliche weiße Schale iſt allenthalben mit einem rothbraunen Neze überzogen.

Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 621. f.

Teſta ouata, pyriformis, glaberrima niuea, filis reticulatis fuluis intertexta, areolis lanceolatis, transuerſis Baſis attenuata transuerſim ſulcata. Spira pyramidata laeuis, anfractibns contiguis. Vertex centralis acuminatus.

Die eylange birnförmige Schale iſt glatt, ſchneeweiß, mit rothbraunen nezförmigen Fäden bemalet, deren Zwiſchenflächen länglich, und in die Quere geſtellet ſind. Der Schnirkel iſt pyramidenförmig und glatt, die Gewinde aneinander verwachſen. Der Wirbel raget aus der Mitte ſpizig hervor.

An prioris Varietas?

Etwan eine Abänderung der vorigen Art?

C. II. 9. Conus betulinus.

C. II. 9. Die gelbe Butterwecke.

Linn.

Linn. S. N. Sp. 308.

Belg. Boterweg. *Rumph. Angl.* Great yellow Leopard Stamper. *Pet. Gall.* Pelote de beurre. *Dav.*

Teſta turbinata laeui, maculis fuſcis per ſeries cincta, baſi rugoſa.

Die ſpizwirblige glatte Schale iſt mit braunen Flecken reiheweiſe umgeben, und an der Grundſpize runzelicht.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *s.* 10. *p.* 2. *f.* 11.
Rumph. amb. t. 31. *f.* C.
Petiv. amb. t. 15. *f.* 2.
Gualt. Teſt. t. 21. *f.* B.
Seb. Thes. III. t. 44. *f.* 1 — 4.
Knor. Vergn. II. 11. *t.* 3. *f.*
Da Coſt. Elem. Pl. 5. *f.* 3.
Mart. Konch. Kab. *II.* 60 *t.* 665. *f.*

C. II. 10. Conus figulinus.

C. II. 10. Die Eichenholztute.

Linn. S. N. Sp. 309.

Belg. Eckenhouts-Toot. *Rumph. Angl.* The Oacken-wood ſtamper. *Gall.* Le bois de Chene.

Teſta turbinata laeui, lineis transuerſis fuſceſcentibus.

Die ſpizwirblige glatte Schale iſt mit braunlichen Querſtrichen umgeben.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 4. ſ. 10. p. 2. f. 28.
Rumph. amb. t. 31. f. V.
Gualt. Teſt. t. 20. f. E.
Argenv. Conch. Pl. 12. f. A.
Regenſ. Samml. I. 10. t. 47. f.
Knor. Vergn. III. 1. t. 23. f.
—— —— *V. 25. t. 2. f.*
Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 656, 657. f.

C. II. 11. Conus ermineus.

Belg. Hermelin Staart. *Gall.* Queue d'Hermine. *Dav.*

Teſta pyriformi fulua baſi ſtriis punctatis ſcabra, faſciis transuerſis niueis.

C. II. 11. Der Hermelinſchwanz.

Die birnförmige rothgelbe Schale hat am Grunde erhabene punktirte Streife, und ſchneeweiße Querbänder.

Valent. Abh. 5. t. 47. f.
Gualt. Teſt. t. 20. f. Q.
Seb. Thes. III. t. 42. f. 31 — 40.
Mart. Kouch. Kab. II. 57. t. 631. f.

Teſta pyriformis glabra, baſi transuerſim ſtriata, ſtriis eleuatis punctatoſcabris. Spira conica. Anfractus glabri planiuſculi. Color fuluus; ſpira albo maculata; ventris

Die Schale iſt birnförmig, und glatt, am Grunde in die Quere geſtreifet, und auf den erhabenen Streifen mit Körnern beſezet. Der Schnirkel iſt kegelförmig. Die

cin-

cingula duo interrupta alba. Puncta eleuata alba.

Gewinde glatt und etwas flach. Die Farbe rothgelb an dem Schnirkel weißgefleckt, und um den Leib mit zweyen unterbrochenen Querbändern umgeben. Die erhabenen Punkte, oder Körner ſind weiß.

C. II. 12. Conus Hebraeus.

C. II. 12. Die Bauernmuſik.

Linn. S. N. Sp. 310.

Belg. Böeren-myſyk, *Rumph. Pet.* L'Hebraique. *Dav. Angl.* Black Diamond Stamper

Teſta ouata, maculis oblongis per ſeries transuerſim cincta.

Die eyförmige Schale iſt mit länglichen Flecken der Quere nach reihenweiſe umgeben.

α maculis fuſcis

α mit braunen Flecken.

β maculis rufis.

β mit rothgelben Flecken.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 122.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 25.

Rumph. amb. t. 33. f. BB.

Petiv. amb. t. 9. f. 12.

—— Gaz. t. 99. f. 12.

Gualt. Teſt. t. 2. f. T.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. G.

Adans. Seneg. t. 6. f. 5.

Seb.

Seb. Thes. III. t. 47. f. 28 — 29.

Knor. Vergn. III. 6. t. 2. f.

Mart. Konch. *Kab. II. 56. t. 617. f.*

C. II. 13. Conus Stercus muſcarum.

C. II. 13. Die Sandtute.

Linn. S. N. Sp. 311.

Belg. Vliegge - Schettje. *Rumph.* *Angl.* Sand - Stamper. *Pet.* *Gall.* Piquure de mouche.

Teſta oblonga punctis pictis adſperſa; anfractibus canaliculatis.

Die längliche Schale iſt mit gefärbten Punkten beſtreuet, und an den Gewinden ausgekehlet.

α elongata, ſpirae anfractibus aequalibus.

α länglich, mit glatten Wirbelgewinden.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *s.* 10. *p.* 2. *f.* 9.

Petiv. Gaz. *t.* 75. *f.* 1.

—— *amb. t.* 15. *f.* 21.

Rumph. amb. t. 33. *f.* Z.

Gualt. Teſt. *t.* 25. *f. N.* O.

Argenv. Conch. *Pl.* 13. *f.* E.

Seb. Thes. *III. t.* 55. *f.* 1.

Regenſ. Samml. I. 7. *t.* 2. *f.*

Knor. Vergn. I. 7. *t.* 5. *f.*

—— *Del. nat. I. t. B.* 5. *f.* 7.

Mart. Konch. *Kab. II.* 64. *t.* 711 — 713. *f.*

β ventri-

β ventricoſa, ſpirae anfractibus coronatis.

β bauchig, mit gekrönten Wirbelgewinden.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 10. p. 2. f. 10.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. S.

Mus. Caes. Vindobon.

C. II. 14. Conus varius.

C. II. 14. Die Löwenture.

Linn. S. N. Sp. 312.

Belg. Weſtindiſche Landcharten. *Gall.* Peau de chagrin. *Argenv.*

Teſta elongata, punctis eleuatis cincta, ſpirae anfractibus coronatis.

Die längliche Schale iſt mit erhabenen Punkten umgeben, und an den Gewinden gekrönet.

α fuſca, maculis confluentibus ramoſis.

α braun, mit weißen zuſamfließenden Flecken.

β lutea, maculis albis diſperſis ſolitariis.

β gelb, mit weißen zerſtreuten einzelnen Flecken.

Gualt. Teſt. t. 20. f. T.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. R.

Seb. Thes. III. t. 44. f. 20 — 22.

Knor. Vergn. I. 24. t. 5. f.

—— —— *II. 1. t. 5. f.*

—— —— *VI. 1. t. 2. f.*

Mart. Konch. Kab. II. 6. 1. t. 678. 679. f.

C. III

C. III. Elongati. C. III. Lange Tuten.

C. III. 1. Conus Nuſſatella. C. III. 1. Der punktirte Bohrer.

Linn. S. N. Sp. 314.

Belg. Gegranuleerde Kuipers-Boor. *Rumph. Angl.* Grain girdled Stamper. *Petiv, Gall.* Tarriere chagrinee.

Teſta ſubcylindrica, ſtriis transuerſis eleuatis punctato maculatis.

Die faſt walzenförmige Schale iſt der Quere nach mit erhabenen Streifen umgeben, und mit gefleckten Punkten beſezet.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 10. *p.* 1. *f.* 35.
Rumph. amb. t. 33. *f.* EE.
Petiv. amb. t. 15. *f.* 13.
Gualt. Teſt. t. 25. *f.* L.
Argenv. Conch. Pl. 13. *f* P.
Knor. Vergn. II. 4. *t.* 7. *f.*
—— —— *III.* 19. *t.* 4. *f.*
Mart. Konch. *Kab. II.* 51. *t.* 567. *f.*

C. III. 2. Conus Terebra. C. III. 2. Der Zirkelbohrer.

Belg. Witte gevoornde Kuypers-Boor. *Gall.* Tarriere blanche & cerclée.

Teſta oblonga albida, ſtriis eleuatis transuerſis parallelis.

Die längliche weiße Schale iſt mit erhabenen parallelen Querſtreifen umgeben.

Mart. Konch. Kab. *II.* 52. *t.* 577. *f.*

Teſta oblonga craſſa, transuerſim ſtriata; ſtriis eleuatis parallelis. Spira conica; anfractus decliues, ſtriati, contigui. Color rubellus, faſciis duabus transuerſis obſoletis albis. Vertex, & baſis ſpoliata, amethyſtina.

Die Schale iſt länglich, und dicht, in die Quere geſtreifet. Die Streiſen erhaben, und gleichweit von einander entfernet. Der Wirbel kegelſörmig, die Gewinde abhängig, geſtreifet, und aneinander gewachſen. Die Farbe blaßroth mit zweyen matten weißen Querbändern; der Wirbel, und die Grundſpize haben, wenn ſie abgezogen ſind, eine Amethyſtfarbe.

C. III. 3. Conus granulatus.

C. III. 3. Der gefurchte Bohrer.

Linn. *Syſt. Nat. Gen.* 315.

Belg. Baſtert Orangie Admiraal. *Gall.* Faux Amiral orangé.

Angl. Small chain Stamper. *Petiv.*

Teſta oblonga transuerſim ſulcata, faſciis albis fuſco maculatis.

Die längliche in die Quere gefurchte Schale iſt mit weiſſen braungefleckten Querbändern umgeben.

Rumph. *amb.* *t.* 32. *f.* T.

Petiv. *amb.* *t.* 15. *f.* 1.

Gualt.

Gualt. Teſt. t. 25. f. H.

Seb. Thes. III. t. 48. f. 26.

Knor. Vergn. III. 6. t. 5. f.

—— —— V. 24. t. 2. f.

C. III. 4. Conus circumciſus.

C. III. 4. Der Oranienbohrer.

Teſta ſubcylindrica fuſcoque maculata, ſtriis inciſis transuerſis.

Die faſt walzenförmige Schale iſt braungefleckt, und mit eingeſchnittenen Querſtrichen umgeben.

Valent. Abh. t. 2. f. 11.

Mart. Konch. Kab. II. 52. t. 571. f.

Teſta ſubcylindrica laeuis ſtriis transuerſis inciſis parallelis. Spira planiuſcula. Vertex prominens, acutus centralis. Color ex flaveſcenti rubeſcens, faſciis transuerſis obſoletis albis, punctis diſperſis rubris.

Die walzenförmige Schale iſt in die Quere mit eingeſchnittenen, parallelen Strichen umgeben. Der Schnirkel iſt flach. Der ſpizige Wirbel ragt aus der Mitte hervor. Die Farbe iſt gelblicht roth, mit matten weißen Querbändern, und zerſtreuten rothen Punkten.

C. III. 5. Conus planorbis.

C. III. 5. Der Plattwirbel.

Teſta conico ventricoſa fulua, baſi transuerſim ſtriato punctata; ſpira plana canaliculata.

Die kegelförmige rothgelbe Schale iſt am Grunde mit punktirten Streifen umgeben, und auf dem flachen Schnirkel ausgekehlet.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta conica ventricoſiuſcula, prope baſin transuerſim ſtriata, ſtriis eleuatis, punctato ſcabris. Spira plana. Anfractus canaliculati, margine extimo acuto. Color ventris fuluus, ſpirae albo fuluoque maculatus. Baſis intus amethyſtina.

Die kegelförmige etwas bauchige Schale iſt am Grunde in die Quere geſtreifet, die Streifen erhaben, und mit Körnern beſezet. Der Schnirkel flach. Die Gewinde ausgekehlet, am äuſſerſten Rande ſcharf. Die Schale iſt rothgelb, der Schnirkel weiß geſtreift. Der Grund inwändig amethyſtfärbig.

C.III. 6. Conus Magus.

C. III. 6. Das gefleckte Käzchen.

Linn. S. N. Sp. 317.

Belg. Geplekte Katje. *Rumph.* *Angl.* Tabby Stamper. *Petiv.* *Gall.* la Picotée. *Argenv.*

Teſta ſubcylindrica, faſciis longitudinalibus albo punctatis.

Die faſt walzenförmige Schale hat nach der Länge laufende punktirte Bänder.

Rumph. amb. t. 32. f. Q.

Petiv. amb. t. 5. f. 10.

Argenv. Suppl. Pl. 2. f. G?

Gualt.

Gualt. *Teſt.* *t.* 20. *f.* F.
Seb. *Thes.* *III.* *t.* 44. *f.* 27.
Knor. *Vergn.* *VI.* 16. *t.* 5. *f.*
Mart. Konch. *Kab.* II. 58. *t.* 641. *f.*

C. III. 7. Conus ſtriatus.

C. II. 7. Die Wolkenrolle.

Linn. S. N. Sp. 318.

Belg. De Wolkhoorn. *Rumph.* *Angl.* Tyger Stamper. *Petiv.* *Gall.* l'Ecorchée. *Argenv.*

Teſta ouato oblonga nebuloſa, lineis parallelis transuerſim picta.

Die eyförmig längliche wolkichte Schale iſt mit gleichweit entfernten Linien bemalet.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. s. 10. p. 2. *f.* 6.
Valent. Abh. 7. *t.* 60. 61. *f.*
Rumph. amb. *t.* 31. *f.* F.
Petiv. amb. *t.* 15. *f.* 4.
—— Gaz. *t.* 98. *f.* 9.
Gualt. *Teſt.* *t.* 26. *f.* D.
Argenv. Conch. Pl. 13. *f.* C.
Seb. *Thes.* III. *t.* 42. *f.* 5, 10.
Regenſ. *Samml.* I. 8. *t.* 13. *f.*

Knor. Vergn. I. 18. *t.* 1. *f.*

—— —— III. 12. *t.* 5. *f.*; 21. *t.* 1. *f.*

Mart. Konch. Kab. II. 64. *t.* 714 — 716. *f.*

C. III. 8. Conus Textile. — C. III. 8. Die Spizenrolle.

Linn. S. N. Sp. 319.

Belg. Gouldlaken. *Rumph. Angl.* Goldbrocade Schell. *Hill. Gall.* Le Drap d'or. *Dav.*

Teſta ovato oblonga, venis reticulatis fuſcis, maculis luteis fuſcisque.

Die eyförmige, längliche gelb, und braun gefleckte Schale iſt mit nezförmigen braunen Adern bemalet.

Bonan. Recr. cl. 3. *f.* 135.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 10. p. 2. f. 43.

Rumph. amb. *t.* 32. *f.* O. P.

Petiv. amb. *t.* 15. *f.* 9.

Gualt. Teſt. *t.* 25. *f.* X.

Argenv. Conch. Pl. 13. *f.* F. I.

Adans. Seneg. Pl. 6. *f.* 7.

Seb. Thes. III. *t.* 43. *f.* 6 — 12. *t.* 47. *f.* 13 — 17.

Regenſ. Samml. I. 6. *t.* 62. *f.*

Knor. Vergn. I. 18. *t.* 6. *f.*

—— —— II. 8. *t.* 3. *f.*

Mart.

Mart. Konch. Kab. *II.* 54. *t.* 598 — 600.

C. III. 9. Conus aulicus.

C. III. 9. Die Brunette.

Linn. S. N. Sp. 320.

Belg. Bruinet - Toot *Rumph. Angl.* The Porphyry Shell. *Hill. Gall.* La Brunette. *Dav.*

Teſta ſubcylindrica, maculis diſperſis inaequalibus trigonis.

Die beinahe walzenförmige Schale iſt mit zerſtreuten ungleichen dreyeckigen Flecken bezeichnet.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 133.
Rumph. amb. *t.* 33. *f.* 3.
Argenv. Conch. *Pl.* 13. *f.* G.
Seb. Thes. *t.* 43. *f.* 1, 2, 4, 5; *t.* 47 *f.* 13 — 15.
Regenſ. *Samml.* *I.* 8. *t.* 25. *f.*
Hill. *Hiſt.* of. *Anim.* *Pl.* 8.
Knor. *Vergn.* *II.* 5. *t.* 3. *f.*
—— —— *III.* 19. *t.* 1. *f.*
Mart. Koncb. Kab. *II.* 53. *t.* 592. *f.*

C. III. 10. Conus pennaceus.

C. III. 10. Die Federtute.

Belg. De Zilver Lakén *Rumph. Gall.* Volute pannacchée.

Teſta conica cinnamomea, lineis punctatis transuerſis, & maculis pennatis diſperſis pallidis picta.

Die kegelförmige zimmetfarbige Schale iſt mit punktirten Querlinien, und zerſtreuten weißlichen federförmigen Flecken bemalet.

Mart. Konch. *Kab. II.* 54. *t.* 596. *f.*

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta conica craſſa glaberrima. Spira obtuſa anfractibus infimis planis, ſupremis eleuatis in verticem centralem pyramidatum obtuſum. Color cinnamomeus. Lineae pictae transuerſae ex ſeriebus punctorum ruforum. Maculae diſperſae, albidae, aut pallide violaceae, pennatae.

Die Schale iſt kegelförmig, dicht und glatt, der Schnirkel ſtumpf, die unteren Gewinde flach, die oberen in der Mitte pyramidenförmig erhaben, und zugeſpizt, zinnoberfärbig mit rothbraunen aus Punkten zuſammengeſezten Querlinien. Die zerſtreuten weißen, oder weißblauen Flecken, ſind federförmig.

C. IV. Laxi, ventricoſi.

C. IV. Weitbäuchige Tuten.

C. IV. 1. Cónus Spectrum.

C. IV. 1. Das Geſpenſt.

Linn. S *N. Sp.* 321.

Belg. Spookje. *Rumph. Angl.* Fairy-Stamper *Petiv. Gall.* Le Spectre.

Teſta oblonga gibba, faſciis longitudinalibus undulatis.

Die längliche höckerige Schale hat nach ihrer Länge wellenförmige Bänder.

Rumph.

Rumph. amb. t. 32. f. S.

Petiv. amb. t. 15. f. 5.

Valent. Abh. 5. t. 39. f.

Gualt. Teſt. t. 25. f. S.

Seb. Thes. III. t. 47. f. 24.

Knor. Vergn. II. 8. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. II. 53. t. 581. 583.

C. IV. 2. Conus bullatus.

C. IV. 2. Die Wolkenbacke.

Linn. S. N. Sp. 322.

Belg. Wolkbakje.

Teſta oblonga, nebuloſa columella flexuoſa, emarginata.

Die länglichte neblichte Schale hat eine gedrehte eingeſäumte Spindel.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. s. 10. p. 1. f. 43.

Gualt. Teſt. t. 26. f. C.

Adans. Seneg. Pl. 5. f. 1.

Knor. Vergn. V. 8. t. 2. 3. f.

Mart. Konch. Kab. II. 65. t. 726. 727. f.

C. IV. 3. Conus Tulipa.

C. IV. 3. Die Tulpe.

Linn. S. N. Sp. 323.

Belg. Achaat toot. *Angl.* The Tulip-Shell *Hill. Gall.* La Tulipe. *Argenv.*

Teſta oblonga laeui, apertura patente, anfractibus ſupremis coronatis.

Die längliche glatte Schale hat eine weite Mündung, und die oberſten Gewinde gekrönet.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 10. *p.* 2. *f.* 7.
Rumph. amb. t. 34. *f.* K.
Petiv. amb. t. 4. *f.* 14.
Argenv. Conch. Pl. 16. *f.* B.
Seb. Thes. III. t. 42. *f.* 16, 20. *t.* 43. *f.* 20-22.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.
Regenſ. Samml. I. 2. *t.* 20. *f.*
Knor. Vergn. V. 20. *t.* 1, 2. *f.*
Mart. Konch. Kab. II. 64. *t.* 718, 719.

C. IV. 4. Conus Geographus.

C. IV. 4. Die Kronenbacke.

Linn. S. N. Sp. 324.

Belg. Wolkje. *Rumph. Angl.* Cloudy-Stamper *Petiv. Gall.* Brocard de Soie. *Argenv.*

Teſta oblonga, ſpira coronata, apertura patente.

Die längliche Schale hat gekrönte Gewinde, und eine weite Mündung.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 319.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 10. *p.* 1. *f.* 41.

Petiv. Gaz. *t.* 98. *f.* 8.

—— *amb.* t. 15. *f.* 3. *A.*

Rumph. *amb. t.* 31. *f.* G.

Gualt. Teſt. *t.* 26. *f.* E.

Argenv. Conch. *Pl.* 13. *f. A.*

Adans. Seneg. *t.* 6. *f.* 8.

Seb. Thes. *III. t.* 42. *f.* 1—4.

Knor. *Vergn. III.* 21. *t.* 2. *f.*

—— —— *VI.* 17. *t.* 3. *f.*

Mart. Konch. Kab. II. 64. *t.* 717. *f.*

D. Cypraea.

D. Die Porzellanſchnecke.

Linn. S. N. Gen. 320.

Teſta conuoluta, ſubouata, apertura longitudinali, utrinque denticulata, extremitatibus effuſis.

Die Schale iſt zuſammengerollet, einigermaßen eyförmig, ihre Mündung, welche der Länge nach herabläuft, iſt beiderſeits gezähnelt, und an den Enden ausgeſchnitten.

D. I. 1. Cypraea Exanthema. D. I. 1. Der Baſtard Argus.

Linn. S. N. Sp. 325.

Belg. Baſtert Argus. *Angl.* Great hebrew Gowry. *Petiv. Gall.* Le faux Argus. *Dav.*

Teſta turbinata, pallide maculata, characteribus inſcripta, linea longitudinali ſubramoſa.

Die ſpizwirblige Schale iſt weißgefleckt, mit buchſtabenähnlichen Strichen bemalet, und nach der Länge des Rückens mit einer geſchlängelten Linie verſehen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 9. *f.* 45, 46.
Petiv. Gaz. t. 96. *f.* 6.
Seb. Thes. III. t. 76. *f.* 16, 18.
Regenſ. Samml. I. 10. *t.* 38. *f.*
Knor. Vergn. I. 5. *t.* 3, 4. *f.*
—— —— II. 24. *t.* 2. *f.*
Mart. Konch. Kab. I. 28. *t.* 289. *f.* 29. *t.* 298. *f.*

D. I. 2. Cypraea Mappa. D. I. 2. Die Landcharte.

Linn. S. N. Sp. 326.

Belg. Kaaphoorn. *Angl.* The Map-Shell. *Hill. Gall.* La Carte geographique. *Dav.*

Teſta

Teſta turbinata, characteribus inſcripta, linea longitudinali ramoſa.

Die ſpizwirblige Schale iſt mit buchſtabenähnlichen Zügen bemalet, und mit einer äſtigen Linie nach der Länge des Rückens durchzogen.

Rumph. amb. t. 38. f. B.

Petiv. amb. t. 16. f. 2.

Argenv. Conch. Pl. 18. f. B.

Seb. Thes. III. t. 76. f. 3, 13, 17.

Knor. Vergn. I. 26. t. 3. f.

—— Delic nat. I. t. B. IV. 5. f.

Mart. Konch. Kab. I. 25. t. 245. f.

D. I. 3. Cypraea arabica.

D. I. 3. Die arabiſche Buchſtaben-Porzellane.

Linn. S. N. Sp. 327.

Belg. Arabiſche Letters Hoorn. *Gall.* La fauſſe Arlequine. *Dav.*

Teſta turbinata, pallide maculata, characteribus inſcripta, linea longitudinali ſimplici.

Die ſpizwirblige Schale iſt blaßgefleckt mit arabiſchen Buchſtaben ähnlichen Zügen und einer einfachen Linie nach der Länge des Rückens bemalet.

α maculis inter characteres irregularibus.

α mit unregelmäßigen Flecken zwiſchen den Zügen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 9. f. 3.
Rumph. amb. t. 38. f. M.
Gualt. Teſt. t. 16. f. V.
Knor. Vergn. III. 12. t. 2. f.
——— ——— VI. 20. t. 2. f.
Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 328. f.
Da Coſt. Elem. Pl. 3. f. 1.

β maculis rotundis inter characteres obſoletos.

β mit rundlichen matten Flecken zwiſchen den Zügen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 9. f. 51.
Argenv. Conch. Suppl. t. 2. f. J.
Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 331. f.

D. I. 4. Cypraea Argus.

D. I. 4. Der doppelte Argus.

Linn. S. N. Sp. 328.

Belg. De dubbelde Argus. *Angl.* The Argus Shell. *Hill.* *Gall.* Le grand Argus. *Dav.*

Teſta turbinata, ſubcylindrica, ſupra adſperſa ocellis, ſubtus maculis quatuor fuſcis.

Die ſpiewirblige Schale iſt walzenförmig, oben mit augenähnlichen Ringen, und unten mit vier braunen Flecken bezeichnet.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 9. f. 54.
Bonan. Recr. cl. 3. f. 263.

Petiv.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 6.

Rumph. amb. t. 38. f. D.

Gualt. Teſt. t. 16. f. F.

Argenv. Conch. Pl. 18. f. D.

Hill. Hiſt. of. *Anim. Pl.* 8.

Regenſ. Samml. I. 5. t. 57. f.

Knor. Vergn. III. 11. t. 5. f.

Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 285. 286. f.

D. I. 5. Cypraea teſtudinaria.

D. I. 5. Die Schildkrötenporzellane.

Linn. Syſt. N. Sp. 329.

Belg. Schilpad-hoorn. *Angl.* Great tourtle Gowry. *Petiv* *Gall.* Le Liévre. *Dav.*

Teſta ſubcylindrica, pallida fuſcomaculata, extremitatibus depreſſis.

Die einigermaßen walzenförmige Schale iſt weißlich, und braungefleckt, an den Enden plattgedrückt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 9. f. 36.

Rumph. amb. t. 38. f. C.

Petiv. amb. t. 8. f. 7.

Knor. Vergn. IV. 27. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. I. 27. t. 271. 272. f.

D. I.

D. I. 6. Cypraea ſtercoraria.

D. I. 6. Das Weitaug.

Linn. S. N. Sp. 320.

Belg. Wyd - Oog.

Teſta ſubturbinata, liuido teſtaceoque maculata, utrinque marginata, ſubtus plana.

Die einigermaßen ſpizwirblige Schale iſt blaulich grau, mit ziegelfarbigen Flecken beiderſeits eingeſäumt, und unten flach.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 9. *f.* 34.
Gualt. Teſt. t. 15. *f.* S. T.
Adans. Seneg. *Pl.* 5. *f.* 1. *A.*
Mus. Caes. Vindobon.

α pallida griſeoque maculata, tuberculo laterali mammillari.

α blaß und grau geſleckt, mit einer warzenförmigen Erhöhung an einer Seite.

β glauco griſeoque maculata;

β fahl und grau geſleckt.

γ cerea unicolor, tuberculo laterali mammillari.

γ wachsgelb, einfarbig, mit einer warzenförmigen Erhöhung an einer Seite.

D. I. 7. Cypraea Carneola.

D. I. 7. Der Fuchs.

Linn. S. N. Sp. 331.

Belg.

Belg. De roode Mol. *Angl.* Buff Gowry. *Petiv. Gall.* Taupe rouſſe.

Teſta ſubturbinata pallida, faſciis incarnatis.

Die blaße Schale hat eine etwas hervortretende Wirbelſpize, und fleiſchfarbige Querbänder.

α ore violaceo.

α mit violeter Mündung.

β ore albido, labio externo vix dentato.

β mit weiſſer Mündung, und undeutlich gezähnter Lefze.

Rumph. amb. t. 38. f. K.
Petiv. Gaz. t. 80. f. 8.
Knor. Vergn. VI. 17. t. 4. f.
Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 287. 288. f.
Mus. Caes. Vindobon.

D. I. 8. Cypraea Zebra.

D. I. 8. Der graue Maulwurf.

Linn. S. N. Sp. 332.

Belg. De grave Mol.

Teſta turbinata cinerea, faſciis latis griſeis, aperturae denticulis fuſcis.

Die bleyfarbige Schale hat eine hervorragende Spize, breite graue Querbänder, und an der Mündung braune Zähne.

Bonan. Recr. cl. 3. *f.* 266.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 9. *f.* 15.

Seb. Thes. III. t. 76. *f.* 5, 15.

Argenv. Conch. Pl. 18. *f.* G.

Knor. Vergn. II. 24. *t.* 3. *f.*

Mart. Konch. Kab. I. 26. *t.* 256 *f.*

Mus. Caes. Vindobon.

D. I. 9. Cypraea Talpa. D. I. 9. Der Maulwurf.

Linn. S. N. Sp. 333.

Belg. Mol. *Angl.* The yellow zoned Porcellane *Hill. Gall.* La Taupe. *Dav.*

Teſta turbinata ſubcylindrica teſtacea, faſciis albidis, baſi incraſſata atro fuſca.

Die braunlichgelbe walzenförmige Schale hat eine hervorſtehende Wirbelſpize, blaße Querbänder, und einen aufgeſchwollenen ſchwarzbraunen Boden.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 9. *f.* 14.

Rumph. amb. t. 38. *f.* J.

Petiv. amb. t. 16. *f.* 1.

Gualt. Teſt. t. 16. *f.* N.

Argenv. Conch. Pl. 18. *f.* H.

Regenſ. Samml. I. 10. *t.* 37. *f.*

Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.

Knor.

Knor. Verg. I. 27. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. *I.* 27. t. 273, 274. *f.*

D. I. 10. Cypraea lurida.

D. I. 10. Die Maus.

Linn. S. *N.* Sp. 335.

Belg. De Muis. *Gall.* La Souris. *Dav.*

Teſta turbinata, obſolete faſciata, extremitatibus nigro bimaculatis, baſi alba.

Die ſpitzwirblige Schale hat matte Querbänder, an den Enden zwo ſchwarze Flecken und einen weißen Boden.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 4. ſ. 9. f. 17.

Gualt. Teſt. t. 13. f. E. I.

Argenv. Conch. Pl. 18. f. C.

Adans. Seneg. t. 5. f. D.

Mart. Konch. Kab. *I.* 30. *t.* 315. *f.*

D. I. 11. Cypraea lota.

D. I. 11. Die Milchporzellane.

Linn. S. *N.* Sp. 337.

Teſta ſubturbinata, utrinque marginata, denticulis aperturae acutis.

Die einigermaſſen ſpitzwirblige Schale iſt beiderſeits eingeſäumet, und an der Mündung mit ſpizen Zähnen verſehen.

Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 322. f.

Mus. Caeſ. Vindobon.

D. I. 12. Cypraea fragilis.

D. I. 12. Die Dünſchale.

Linn. S. N. Sp. 338.

Belg. Turkſe Papier Porcelein-Hoorn. *Gall.* Porcellaine marbrée.

Teſta turbinata, ouata, glauca, picta maculis angulatis pallidis.

Die ſpizwirblige eyförmige fahle Schale iſt mit blaßen eckigen Flecken bezeichnet.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 9. f. 6.

Gualt. Teſt. t. 16. f. Q.

Mus. Caeſ. Vindobon.

D. II. Obtuſae, ſeu absque Spira manifeſta.

D. II. Stumpfwirblige, oder mit undeutlicher Wirbelſpize.

D. II. 1. Cypraea Caput ſerpentis.

D. II. 1. Der Mohrenbauch.

Linn. S. N. Sp. 339.

Belg. Klene Slange Kop. *Angl.* Smal Snake Gowry. *Pet. Gall.* La petite tete de Serpent.

Teſta obtuſa, triquetro gibba, dorſo albo maculato, labris albis.

Die ſtumpfwirblige dreyſeitig höckerige Schale iſt auf dem Rücken weißgefleckt, an den Lippen ganz weiß.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 9. *f.* 50.

Rumph. amb. t. 38. *f.* F.

Petiv. amb. t. 16. *f.* 7.

—— *Gaz. t.* 96. *f.* 9.

Gualt. Teſt. t. 15. *f.* O.

Adans. Seneg. Pl. 5. *f.* G.

Knor. Vergn. IV. 9. *t.* 3. *f.*

Mart. Konch. Kab. I. 30. *t.* 316. *f.*

D. II. 2. Cypraea mauritiana.

D. II. 2. Der groſze Schlangenkopf.

Linn. S. N. Sp. 340.

Belg. Slange Kop *Rumph.* *Angl.* Great turtle Leopard. *Pet.* *Gall.* Tete de Serpent. *Dav.*

Teſta obtuſa plano conuexa, dorſo gibbo pallide maculato, baſi nigricante.

Die ſtumpfwirblige, unten flache, oben erhabene Schale hat einen höckerigen blaß gefleckten Rücken, und ſchwärzlichen Boden.

α dorſo fuſco pallide maculato; lateribus fuſcis.

α mit braunen blaßgefleckten Rücken, und braunen Seiten.

β dorſo griſeo albido maculato, lateribus liuidis.

β mit lichtgrauen weißgefleckten Rücken, und blaulich grauen Seiten.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 9. *f.* 52.
Petiv. Gaz. I. *t.* 96. *f.* 8.
Rumph. amb. *t.* 38. *f.* E.
Knor. Vergn. I. 13. *t.* 1, 2. *f.*
—— —— II. 27. *t.* 5. *f.*
Mart. Kouch. Kab. I. 30. *t.* 317. *f.*

D. II. 3. Cypraea Vitellus. D. II. 3. Die Salzkorn Porzellane.

Linn. S. N. Sp. 341.

Belg. Zout-Koreltje; *Angl.* Salt-ſpeckled Gowry *Petiv.* *Gall.* La Grelée.

Teſta obtuſa, liuida, albido maculata.

Die ſtumpfwirblige Schale iſt blaulichgrau, mit weißen Flecken.

Bonan. Recr. cl. 3. *f.* 254.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 9. *f.* 23.
Petiv. Gaz. I. *t.* 80. *f.* 2.
Rumph. amb. *t.* 38. *f.* L.
Knor. Vergn. VI. 20. *t.* 3. *f.*
Mart. Konch. Kab. I. 23. *t.* 238. *f.*

D. II. 4. Cypraea Mus. D. II. 4. Die Kröte.

Linn. S. N. Sp. 342.

Belg. Cartageenſe Wit-rugge. *Angl.* Carthagena Cowry *Petiv.* *Gall.* Le Crapaud *Dav.*

Teſta obtuſa, gibba, cinerea, faſcia longitudinali nigro maculata.

Die ſtumpfwirblige höckerige Schale iſt von aſchengrauer Farbe, mit einem nach der Länge laufenden ſchwarzgefleckten Bande.

Liſt. Hiſt. Conch. *t.* 4. *ſ.* 9. *f.* 2.

Rumph. amb. t. 39. *f.* S.

Petiv. amb. t. 16. *f.* 4.

Argenv. Conch. *Pl.* 18. *f.* E.

Seb. Thes. *III. t.* 76. *f.* 33, 34.

Knor. Vergn. III. 12. *t.* 3. *f.*

Mart. Konch. Kab. I. 23. *t.* 222. 223. *f.*

D. II. 5. Cypraea Tigris.

D. II. 5. Die Tigerporzellane.

Linn. S. N. *Sp.* 343.

Belg. Getygerde Kliphoorn. *Angl.* The gread Leopard *Pet. Gall.* La Peau de Tigre. *Dav.*

Teſta obtuſa, antice rotundata, dorſo maculato, baſi niuea.

Die ſtumpfwirblige vorne rundliche Schale iſt auf dem Rücken geflecket, am Boden ſchneeweiß.

α linea longitudinali nulla.

α ohne Linie über die Länge des Rückens.

β li-

β linea longitudinali dorſali flauo rubente.	β mit einer nach der Länge des Rückens laufenden gelbrothen Linie.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 9. *f.* 29.
Rumph. amb. t. 38. *f. A.*
Petiv. Gaz. t. 96. *f* 7.
Gualt. Teſt. t. 14. *f.* G, *H*, *I*, *L*
Knor. Vergn. VI. 21. *t.* 4, *f. f.*
Mart. Konch. *Kab. I.* 24. *t.* 232. 236. *f.*

D. II. 6. Cypraea Lynx. — D. II. 6. Die Masern-Porzellane.

Linn. S. *N.* Sp. 344.

Belg. Mazelen. *Rumph. Angl.* Thick Saffron - tooth' dGowry. *Pet. Gall.* La Truitée. *Dav.*

Teſta obtuſa maculis fuſcis, linea longitudinali fulua, ore ruſo.	Die ſtumpfwirblige braungeſteckte Schale hat nach der Länge des Rückens einen rothgelben Strich, und eine braunrothe Mündung.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 9. *f.* 24.
Rumph. amb. t. 38. *f.* O, P.
Petiv. Gaz. t. 97. *f.* 17.
Gualt. Teſt. t. 14. *f.* C, D.
Knor. Vergn. VI. 23. *t.* 6, 7. *f.*
Mart. Konch. *Kab.* 29. *t.* 303, 304. *f.*
Mus. Caes. Vindobon.

D. II. 7. Cypraea Iſabella.

D. II. 7. Die Iſabelle.

Linn. S. *N. Sp.* 293.

Belg. Iſabelle, *Rumph. Angl.* Iſabella Gowry *Pet. Gall.* L'Iſabelle. *Dav.*

Teſta obtuſa ſubcylindrica, extremitatibus croceis.

Die ſtumpfwirblige einigermaßen walzenförmige Schale hat ſafranrothe Endſpizen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 9. *f.* 4.
Rumph. amb. t. 39. *f.* G.
Petiv. Gaz. t. 97. *f.* 16.
—— *amb. t.* 16. *f.* 16.
Argenv. Conch. Pl. 18. *f.* P.
Knor. Vergn. IV. 9. *t.* 5. *f.*
Mart. Konch. Kab. *I.* 27. *t.* 275. *f.*

D. II. 8. Cypraea cylindrica.

D. II. 8. Die Walzenporzellane.

Teſta obtuſa cylindrica, vertice complanato, extremitatibus fuſco bimaculatis.

Die ſtumpfwirblige walzenförmige Schale iſt an dem Wirbel plattgedrückt, an den Endeſpizen mit zween braunen Flecken gezeichnet.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta cylindrica, ſpira complanata. Dorſum pallide amethyſtinum; Latera maculis raris fuluis. Extremitates utrinque marginatae bimaculatae. Rima inaequalis. Dentes labii extimi remotiores. Baſis niuea.

Die Schale iſt walzenförmig. Die Wirbelſpitze plattgedrückt. Der Rücken von blaßer Amethyſtfarbe. Die Seiten ſind beiderſeits eingeſäumt, und mit braunlichen zerſtreuten Flecken, die Endſpitzen aber mit zween braunen Flecken gezeichnet. Die Spalte der Mündung iſt ungleich. Die Zähne der äußeren Lefze ſtehen etwas mehr von einander entfernet. Der Grund iſt ſchneeweiß.

D. III. Umbilicatae.

D. III. Mit nabelförmig eingedrücktem Wirbel.

D. III. 1. Cypraea Hirundo.

D. III. 1. Die Schwalbe.

Linn. S. N. Sp. 350.

Belg. Het blaeuve Katje.

Teſta umbilicata ſubcylindrica, extremitatibus fuſco bimaculatis.

Die nabelförmig eingedrückte walzenförmige Schale hat an den Enden zween braune Flecken.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 4. *ſ.* 9. *f.* 20.
Petiv. Gaz. t. 30. *f.* 3.
Mus. Caes. Vindobon.

D. III. 2. Cypraea Aſellus.

D. III. 2. Das Eſelchen.

Linn. S. N. Sp. 351.

Belg. Ezeltje. *Rumph. Angl.* Aſs Gowry. *Pet. Gall.* Le petit Ane. *Argenv.*

Teſta umbilicata albida, faſciis dorſalibus tribus fuſcis.

Die nabelförmig eingedrückte weißliche Schale hat drey braune Querbänder.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 9. *f.* 21.
Rumph. amb. t. 39. *f. M.*
Petiv. Gaz. t. 97. *f.* 11.
—— *amb. t.* 16. *f.* 18.
Argenv. Conch. Pl. 18. *f. T.*
Adans. Seneg. Pl. 5. *f. H.*
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.
Knor. Vergn. IV. 25. *t.* 3. *f.*
Mart. Konch. *Kab. I.* 27. *t.* 280 *f.*

D. III. 3. Cypraea Errones.

D. III. 3. Das Baſtarddrachenköpfchen.

Linn. S. N. Sp. 352.

Belg. Poolſche Muts. *Angl.* Freckled Olive Gowry *Petiv. Gall.* Le Bonnet polonois.

Teſta umbilicata oblonga, fauce violacea, macula dorſali teſtacea.

Die nabelförmig eingedrückte längliche nebelichte Schale hat einen violeten Mund, und einen braun grauen Fleck auf dem Rücken.

Petiv.

Peſiv. Gaz. t. 97. f. 21.

Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 294. 295. f.

D. IV. Marginatae. D. IV. Eingeſäumte.

D. IV. 1. Cypraea cribraria. D. IV. 1. Das Argus Weibchen.

Linn. S. N. Sp. 353.

Belg. Het Klene Wyfje van den Argus. *Angl.* The little Wife of the Argus. *Gall.* Le petit Argus *Argenv.*

Teſta umbilicata oblonga lutea, maculis rotundatis albis, baſi emarginata alba.

Die nabelförmig eingedrückte, längliche, gelbliche Schale, iſt mit rundlichen Flecken beſezet, und mit einem eingeſäumten Boden verſehen.

Liſt. *Hiſt.* Conch. l. 4. ſ. 9. f. 42.

Petiv. Gaz. t. 8. f. 3.

Rumph. amb. t. 39. f. R.

Argenv. *Teſt.* t. 18. f. X.

Regenſ. Samml. I. 12. t. 74. f.

Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 336. f.

D. IV. 2. Cypraea Moneta. D. IV. 2. Die guineiſche Münze.

Linn.

Linn. S. *N.* *Sp.* 354.

Belg. Gemeene geele Kauris. *Angl.* Black moors Thooth. *Petiv. Gall.* Monnoye de Guinée.

Teſta marginata albida, lateribus nodoſis.

Die eingeſäumte weißliche Schale hat knotige Seitenränder.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 233.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 9. *f.* 59.

R*umph* *amb.* *t.* 39. *f.* C.

Petiv. *amb.* *t.* 16. *f.* 14.

—— *Gaz.* *t.* 97. *f.* 8.

Gualt. *Teſt.* *t.* 14. *f.* 4, 5.

Argenv. *Conch.* *Pl.* 18. *f.* K.

Knor. *Vergn.* *IV.* 24. *t.* 4. *f.*

Mart. Konch. *Kab.* I. 31. *t.* 337. 338. *f.*

D. IV. 3. Cypraea Annulus.

D. IV. 3. Der Ring.

Linn. S. *N.* *Sp.* 355.

Belg. Blauwe Kauris. *Gall.* La Coliqve. *Dav.*

Teſta marginata, annulo flauo diſcum dorſi ambiente.

Der Mittelrücken der eingeſäumten Schale iſt mit einem gelben Ringe eingefaßt.

Petiv.

Rumph. amb. t. 39. f. D.

Petiv. Gaz. t. 6. f. 8.

Knor. Vergn. II. 9. t. 4. f.; 16. t. 4. f.

Murr. Fund. Teſt. t. 1. f. 11.

Mart. Konch. Konch I, 24. t. 239. 240. f.

D. IV. 4. Cypraea cau-rica. | D. IV. 4. Die gefleckte Cauris.

Linn. S. N. Sp. 356.

Belg. Pockjes. *Rumph.* *Angl.* Long Maſsle Gowry. *Petiv.* *Gall.* La peau d'Ane. *Dav.*

Teſta dorſo luteo alboque nebuloſo, margine inaequali albido, fuſco punctato.

Der Rucken iſt gelb und weiß nebelicht, der Rand ungleich, weißlich mit braunen Punkten.

Rumph. amb. 38t. f. P.

Petiv. amb. t. 16. f. 8.

Gualt. Teſt. t. 15. f. X.

Murr. Fund. Teſt. t. 1. f. 13.

Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 301. 302. f.

C. IV. 5. Cypraea Dra-caena. | D. IV. 5. Das Drachenhaupt.

Belg. Draackje. *Angl.* Dragon Gowry. *Pet. Gall.* Tete de Dragon.

Teſta deroſo marginata, lateribus albis fuſco maculatis, dorſo luteo nebuloſo, macula media teſtacea.

Die Schale hat einen gleichſam zernagten Saum, die weißen Seiten ſind braun gefleckt, der Rücken gelb, neblicht, mit einem braunen grauen Flecke in der Mitte.

Petiv. amb. t. 16. *f.* 10.

Mart. Konch. Kab. I. 28. *t.* 292. 293. *f.* ?

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta oblongo ouata. Vertex umbilicatus retuſus. Dorſum carinis duabus transuerſis obſoletis. Latera emarginata, margine incraſſato eroſo. Dentes latitudinem labii extimi occupantes. Color dorſi luteo nebuloſus; Latera alba punctis fuſcis diſperſis maculata. Baſis alba.

Die Schale iſt länglicht eyförmig. Der Wirbel iſt mit einem ſtumpfen nabelförmigen Eindruck, der Rucken mit zwoen ſtumpfen Schneiden der Quere nach beſezt. Die Seiten ſind eingeſäumt, der Saum aufgeworfen, und gleichſam zernagt. Die Zähne erſtrecken ſich über die ganze Breite der äußeren Lefze. Der Rücken iſt von gelber neblichter Farbe. Die Seiten ſind weiß, mit zerſtreuten braunen Punkten. Der Boden ganz weiß.

D. IV. 6. Cypraea eroſa.

D. IV. 6. Das Weißaug.

Linn. S. *N.* Sp. 357.

Belg. Witoogje. *Rumph. Angl.* White-eyed Gowry *Petiv. Gall.* Pointillage blanc.

Teſta

Teſta crenato marginata, albo punctata, lateribus macula fuſcente.	Die weiß punktirte Schale hat einen gekerbten Saum, und an jeder Seite einen bräunlichen Flecken.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 9. *f.* 39.
Petiv. Gaz. I. *t.* 97. *f.* 19.
—— *amb. t.* 16. *f.* 12.
Rumph. amb. t. 39. *f. A.*
Gualt. Teſt. t. 15. *f. H.*
Knor. Vergn. VI. 20. *t.* 4. *f.*
Mart. Konch. Kab. I. 30. *t.* 320, 321. *f.*
Mus. Caes. Vindobon.

D. IV. 7. Cypraea flaueola.	D. IV. 7. Der Brandfleck.

Linn. S. N. Sp. 358.

Belg. Brand-vlakje.

Teſta deroſa, lutea alboque nebuloſa, lateribus fuluis.	Die gelb und weiß neblichte Schale hat einen zernagten Rand, und braunrothe Seiten.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 9. *f.* 12.
Gualt. Teſt. t. 14. *f.* E.
Mart. Konch. Kab. I. 26. *t.* 267, 268. *f.*

D. IV. 8. Cypraea ſpurca.

D. IV. 8. Der Gelbſchmuz.

Linn. S. N. Sp. 359.

Belg. Geelsmetje.

Teſta ſubemarginata, ſpira plana orbiculari, labio externo vix dentato.

Die etwas eingeſäumte Schale hat einen flachen runden Wirbel, und an dem äußeren Rande kaum deutliche Zähnchen.

Mus. Caes. Vindobon.

D. IV. 9. Cypraea ſtolida.

D. IV. 9. Das Roſtfleckchen.

Linn. S. N. Sp. 360.

Belg. Het Sooſtolakje. *Angl.* The Beetle Porcellane. *Hill.*

Teſta marginata pallida, maculis quadrangularibus teſtaceis.

Die eingeſäumte weißliche Schale iſt mit roſtfarbigen viereckigen Flecken bemalet.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 18.
Argenv. Conch. Pl. 18. f. Y.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.
Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 305. f.
Mus. Caes. Vindobon.

D. IV. 10. Cypraea heluola.

D. IV. 10. Die Sternporzellane.

Linn. S. N. Sp. 361.

Belg. Sterretje. *Angl.* Star Gowry *Petiv. Gall.* Porcellaine e toilée. *Dav.*

Teſta crenato marginata, gibba, albo punctata, ſubtus ruffa.

Die höckerige weißpunktirte und unten rothbraune Schale, hat einen zernagten Saum.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 9. *f.* 38.
Rumph. amb. t. 39. f. B.
Petiv. amb. *t.* 16. *f.* 17.
Mart. Konch. Kab. I. 30. *t.* 326. 327. *f.*

D. IV. 11. Cypraea ocellata.

D. IV. 11. Das Schwarzaug.

Linn. S. N. Sp. 362.

Teſta ſubemarginata, ocellis nigris inter annulos pallidos.

Die einigermaſſen eingeſäumte Schale hat ſchwarze mit blaßgelben Ringen eingefaßte Augen.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 9. *f.* 43.
Petiv. Gaz. *t.* 9. *f.* 7.
Mart. Konch. Kab. I. 31. *t.* 333. 334. *f.*
Mus. Caes. Vindobon.

D. IV. 12. Cypraea poraria.

D. IV. 12. Die Frieſelporzellane.

Linn. S. N. Sp. 363.

Teſta marginata, ocellis albis, annulo fuſco cinctis; baſi amethyſtina.

Die eingeſäumte Schale hat weiße mit Ringen eingefaßte Augen, und einen amethyſtfarbigen Boden.

Mart. Konch. Kab. I. 30. *t.* 324. 325.

Mus. Caes. Vindobon.

D. IV. 13. Cypraea Pediculus.

D. IV. 13. Die Laus.

Linn. S. N. Sp. 364.

Belg. Zee Vloog *Rumph. Angl.* Louſe Gowry *Petiv. Gall.* Pou de Mer. *Argenv.*

Teſta marginata ſubgloboſa, ſtriis eleuatis transuerſis, in rimam uſque protenſis.

Die eingeſäumte faſt kugelförmige Schale iſt mit erhabenen Querſtreifen beſezt, die ſich bis zur Spalte erſtrecken.

α ſulco dorſi longitudinali.

α mit einer Furche nach der Länge des Rückens.

β ſulco dorſi longitudinali nullo.

β ohne Furche nach der Länge des Rückens.

Liſt. angl. t. 3. *f.* 17.

—— *Hiſt. Conch. l.* 4. *ſ.* 9. *f.* 56, 57.

Rumph. amb. t. 39. f. P.

Petiv. amb. t. 16. f. 22.

Gualt. Teſt. t. 14. f. P. t. 15. f. P, R.

Argenv. Conch. Pl. 18. f L.

Adans. Seneg. Pl. 5. f. 3.

Knor. Vergn. VI. 17. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 310, 311. f.

D. IV. 14. Cypraea Nucleus.

D. IV. 14. Die Reiskornporzellane.

Linn. S. N. Sp. 365.

Belg. De Rys Korrel. *Angl.* The Rice Gowry *Petiv.* *Gall.* La petite Verole. *Dav.*

Teſta utrinque marginata, ſulcis tuberculisque exaſperata.

Die beiderſeits eingeſäumte Schale iſt mit Furchen, und Körnchen beſezet.

α alba (major) ſubroſtrata.

α weiß (und größer) mit ſchnauzenförmigen Endſpizen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 9. f. 58.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 12.

—— amb. t. 16. f. 11.

Rumph. amb. t. 39. f. J.

Gualt. Teſt. t. 14. f. S.

Argenv.

Argenv. Conch. *Pl.* 18. *f.* V.
Seb. *Thes.* III. *t.* 55. *f.* 22.
Knor. *Vergn.* IV. 17. *t.* 7. *f.*
Mart. Konch. *Kab.* I. 29. t. 312. *f.*

β utrinque obtuſa, punctis eleuatis annulo ferrugineo cinctis (minor).

β an beiden Enden ſtumpf (und kleiner) die erhabenen Körner ſind mit roſtfarbigen Ringen eingefaſt.

Mus. Caes. Vindobon.

D. IV. 15. Cypraea ſtaphylaea.

D. IV. 15. Die Aſſel.

Linn. S. N. Sp. 366.

Belg. Piſſeped. *Gall* La Cloporte. *Argenv.*

Teſta punctis eleuatis, ſine ſtriis, extremitatibus luteis.

Die Schale iſt mit erhabenen Körnern beſezt, ohne Streifen, und an den Endſpizen gelb.

Gualt. *Teſt.* *t.* 14. *f.* T.
Argenv. Conch. *Pl.* 18. *f.* S.
Knor. *Vergn.* IV. 16. *t.* 2. *f.*
Mart. Konch. Kab. I. *t.* 29. *f.* 313. 314. *f.*
Mus. Caes. Vindobon.

D. IV. 16. Cypraea Cicercula.

D. IV. 16. Das Kornknöpfchen.

Linn. S. N. Sp. 367.

Belg. Korelye Knoopje. *Rumph. Angl.* Wart Gowry. *Petiv.*

Teſta utrinque roſtrata, adſperſa punctis eleuatis.

Die an beiden Enden ſchnauzenförmige Schale iſt mit erhabenen Punkten beſezet.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 9. *f.* 62.
Rumph. amb. t. 39. *f.* K.
Petiv. amb. t. 16. *f.* 21.
Mart. Konch. Kab. I. 24. *t.* 243. 244. *f.*

D. IV. 17. Cypraea Globulus.

D. IV. 17. Das glatte Knöpfchen.

Linn. S. N. Sp. 368.

Belg. Paerltje. *Rumph. Angl.* Pearl Gowry. *Petiv.*

Teſta laeui, utrinque roſtrata.

Die Schale iſt glatt und an beiden Enden ſchnauzenförmig.

Petiv. Gaz. t. 97. *f.* 4.
—— *amb. t.* 16. *f.* 19.

Rumph.

Rumph. amb. t. 39. f. L, N.

Gualt. Teſt. t. 14. f. M.

Knor. Vergn. VI. 21. t. 7. f.

Mart. Konch. Kab. I. 24. t. 242. f.

Murray. Fund. Teſt. t. 1. f. 12.

E. Bulla.

E. Die Blaſenſchnecke.

Linn. S. N. Gen. 322.

Teſta conuoluta laeuis; Apertura ſubcoarctata oblonga; Columella obliqua edulenta.

Die Schale iſt zuſammengerollet und glatt; ihre Mündung, welche der Länge nach herabläuft, meiſtens nur an einem Ende ausgeſchnitten; die Spindel ſchief und ohne Zähne.

E. 1. Bulla Ouum.

E. 1. Das Ey.

Linn. S. N. Sp. 369.

Belg. Porſelein-hoorn. *Rumph.* *Angl.* White Egg-Gowry. *Petiv.* *Gall.* L'oeuf. *Dav.*

Teſta ouata, obtuſe biroſtri, labro exteriore dentato.

Die eyförmige Schale iſt an beiden Enden mit einer ſtumpfen Schnauze verſehen, an der äußeren Lefze gezähnelt.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 252.
Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 9. *f.* 65.
Rumph. amb. *t.* 38. *f.* Q.
Petiv. amb. *t.* 8. *f.* 6.
—— *Gaz.* t. 97. *f.* 7.
Gualt. Teſt. *t.* 15. *f.* *A.*
Argenv. Conch. Pl. 18. *f.* *A.*
Seb. Thes. III. *t.* 76. *f.* 6, 10.
Knor. *Vergn.* VI. 33. *t.* 1. *f.*
Mart. Konch. Kab. I. 22. *t.* 205. 206. *f.*

E. 2. Bulla biroſtris. E. 2. Der kleine Weberſpuhl.

Linn. Syſt. N. Sp. 371.

Belg. Baſtert Wewers-Spoeltje. *Gall.* Petite Navette.

Teſta oblonga, margine incraſſato, angulato, roſtris elongatis laeuibus.

Die längliche Schale hat einen aufgeſchwollen eckigen Rand, und glatte ſchnabelförmige Endeſpizen.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 9. *f.* 66.
Knor. *Vergn.* VI. 20. *t.* 5. *f.*
Mart. Konch. Kab. I. 23. *t.* 217. *f.*

E. 3. Bulla Spelta. E. 3. Das Joch.

Linn. S. N. Sp. 372.

Belg. Jockje. *Angl.* Smal Leghorn Gowrikin. *Pet.*

Teſta oblonga utrinque obtuſiuſcula, labro arcuato incraſſato.

Die längliche Schale hat etwas ſtumpfe Endeſpizen, und eine gebogene verdickte Lefze.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 9. *f.* 68.
Petiv. Gaz. t. 66. *f.* 2, 3.
Gualt. Teſt. t. 15. *f.* 4.
Ginan. adr. II. t 13. *f.* 95.
Mart. Konch. *Kab. I.* 23. *t.* 215. 216. *f.*

E. 4. Bulla verrucoſa. E. 4. Der Hochrücken.

Linn. S. N. Sp. 373.

Belg. Witte Jamboeze; *Rumph. Angl.* White Nipple Gowry-Kin. *Petiv. Gall.* La Boſſue. *Dav.*

Teſta gibboſa tranſuerſim carinata, extremitatibus grano rotundo adnato.

Die höckerige Schale hat einen eckigen Querwulſt, und an jedem Ende ein rundes angewachſenes Knöpfchen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 9. *f.* 67.
Petiv. Gaz. t. 97. *f.* 22.
—— *amb. t.* 16. *f.* 23.
Rumph. amb. t. 38. *f.* H.
Gualt. Teſt. t. 16. *f.* F.

Argenv. Conch. *Pl.* 18. *f. M.*
Seb. Thes. *III. t.* 55. *f.* 17.
Knor. Vergn. IV. 26. *t.* 7. *f.*
Mart. Konch. Kab. *I.* 23. *t.* 220, 221.

E. 5. Bulla gibboſa. E. 5. Der Wulſt.

Linn. S. N. Sp. 374.

Belg. Hoogruggetje. *Gall.* La petite bouche.

Teſta ſubcylindrica, angulo dorſali eleuato transuerſo.

Die einigermaßen walzenförmige Schale führt auf den Rücken einen in die Quere liegenden erhabenen Gürtel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 249. 339.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 9. *f.* 64.
Petiv. Gaz. *t.* 15. *f.* 5.
Gualt. Teſt. *t.* 15. *f.* 3.
Argenv. Conch. Pl. 18. *f.* Q.
Seb. Thes. *III. t.* 55. *f.* 18.
Knor. Vergn. I. 14. *t.* 3, 4. *f.*
—— —— *VI.* 32. *t.* 4. *f.*
Mart. Koncb. Kab. *I.* 22. *t.* 211. 212. *f.*

E. 6. Bulla Naucum. E. 6. Das Taubeney.

Linn. S. N. Sp. 375.

Belg.

Belg. Witte Kievits - Ey. *Valent. Gall.* La Bulle d'eau. *Dav.*

Teſta rotundata ſubpellucida, transuerſim ſtriata, utrinque umbilicata.

Die rundliche halbdurchſichtige Schale iſt in die Quere geſtreifet, und an beiden Enden mit einem Nabelloche verſehen.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 4.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 9. *f.* 73.

Rumph. amb. *t.* 27. *f.* H.

Gualt. Teſt. *t.* 13. *f.* G. G.

Argenv. Conch. Pl. 17. *f.* Q.

Seb. Thes. III. *t.* 38. *f.* 45.

Knor. *Vergn.* VI. 38. *t.* 2, 3. *f.*

Mart. Konch. Kab. I. 22. *t.* 200. *f.*

E. 7. Bulla aperta.

E. 7. Die offene Blaſe.

Linn. S. N. Sp. 376.

Teſta ſubrotunda pellucida, apertura patentiſſima.

Die rundliche durchſichtige Schale hat eine ganz erweiterte offene Mündung.

Gualt. Teſt. *t.* 13. *f.* EE.

Mus. Caes. Vindobon.

E. 8. Bulla Ampulla.

E. 8. Das Kiebizey.

Linn. S. N. Sp. 378.

Belg.

Belg. Kievits-Ey. *Angl.* The Indian Dipper. *Pet. Gall.* La Muſcade *Dav.*

Teſta rotundata opaca, vertice umbilicato.

Die rundliche undurchſichtige Schale hat einen nabelförmig eingedrückten Wirbel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 3.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 9. *f.* 12.

Petiv. *Gaz.* t. 50. *f.* 13. *t.* 99. *f.* 14.

Rumph. amb. t. 27. *f.* G.

Gualt. *Teſt.* t. 12. *f.* E—J.

Adans. Seneg. Pl. 1. *f.* 2.

Seb. Thes. *III.* t. 38. *f.* 34—44.

Regenſ. Samml. I. 5. *t.* 58. *f.* 8. *t.* 21. *f.*

Knor. *Vergn.* *II.* 8. *t.* 1. *f.*

—— —— *V.* 17. *t.* 6. *f.*

Mart. Konch. Kab. *I.* 21. *t.* 188. *f.* 22. *t.* 202-204 *f.*

Da Coſt. *Elem.* Pl. 3. *f.* 4, 5.

E. 9. Bulla lignaria.

E. 9. Die Papierrolle.

Linn. S. *N.* *Sp.* 379.

Belg. Opgerollde Papier. *Gall.* l' Oublie. *Dav.*

Teſta obouato oblonga transuerſim ſtriata, vertice umbilicato.

Die verkehrt eyförmige längliche Schale iſt in die Quere geſtreifet, und mit einem genabelten Wirbel verſehen.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 9. f. 71.

Knor. Vergn. VI. 37. t. 4, 5. f.

Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 194 195. f.

E. 10. Bulla Phyſis. E. 10. Die Staatenfahne.

Linn. S. N. Sp. 380.

Belg. Staate Vlaggetje. *Valent. Gall.* Gondole rayée. *Argenv,*

Teſta ouato oblonga, picta lineis transuerſis undulatis, ſpira horizontali.

Die eyförmige längliche Schale iſt in die Quere mit wellenförmigen Linien bemalet, und mit einem wagrechten Schnirkel verſehen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 9. f. 75.

Bonan. Mus. Kirch. cl. 3. f. 403.

Valent. Abh. t. 2. f. 19.

Gualt. Teſt. t. 13. f. F. F.

Argenv. Conch. Pl. 17. f. J.

Seb. Thes. III. t. 38. f. 46 — 50.

Murray. Fund. Teſt. t. 1. f. 9.

Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 196. 197. f.

E. 11. Bulla Ampluſtre. E. 11. Das rothe Band.

Linn.

Linn. S. *N.* *Sp.* 381.

Belg. Rood-bandje.

Teſta ſubgloboſa albida, cingulis tranſuerſis fuſcis, ſpira obtuſa.

Die einigermaßen kugelförmige weißliche Schale hat braune Quergürteln, und einen ſtumpfen Schnirkel.

Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 198. f.
Mus. Caes. *Vindobon.*

E. 12. Bulla Ficus.

E. 12. Die Feige.

Linn. S. *N.* *Sp.* 382.

Belg. Spaanſche Vyg. *Rumph.* *Angl.* Fig-whelk. *Pet.* *Gall.* La Figue.

Teſta obouato clauata, reticulato ſtriata, roſtro exſerto, ſpira obliterata.

Die verkehrt kegelförmige, kaulähnliche und nezförmig geſtreifte Schale hat einen verlängerten Schnabel, und undeutlichen Schnirkel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 15.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 10. f. 46.
Rumph. amb. t. 27. f. K.
Petiv. amb. t. 6. f. 9.
Gualt. Teſt. t. 26. f. J. M.

Argenv.

Argenv. Concb. Pl. 17. f. O.

Klein. Meth.. Oſtr. t. 5. f. 93.

Seb. Thes. III. t. 68. f. 1.

Knor. Vergn. I. 19. t. 4. f.

—— —— III. 23. t. 1. f.

—— Delic. nat. I. t. B. II. f. 7.

Mart. Konch. Kab. III. 66. t. 734. f.

E. 13. Bulla Rapa. E. 13. Die Rübe.

Linn. S. N. Sp. 383.

Belg. Knollhoorn. *Rumph.* *Angl.* Round Partridge. *Petiv* *Gall.* Le Radix. *Dav.* *Ital.* Il Radiccio.

Teſta rotundato turbinata, ſpira exſerta, roſtro incuruato.

Die runde birnförmige Schale hat einen hervorragenden Schnirkel, und umgedrehten Schnabel.

Rumph. amb. t. 27. f. F.

Petiv amb. t. 9. f. 8.

Valent. Abh. 9. t. 82. f.

Gualt. Teſt. t. 26. f. H.

Argenv. Concb Pl. 17. f. K.

Klein. Meth. Oſtrac. t. 4. f. 80.

Seb. Thes. t. 38. f. 13-16. 18-20, 22, 23.

—— t. 68. f. 7. 8.

Knor. Vergn. I. 19. t. 5. f.
—— *Del. nat.* I. t. B. II f. 8.
Mart. Konch. Kab. III. 68. t. 747-749. f.

E. 14. Bulla Terebellum. | E. 14. Der glatte Böttchenbohrer.

Linn. S. N. Sp. 388.

Belg. Kuipers-Boor. *Rumph. Angl.* The ſpeckled Augur-Peg. *Petiv. Gall.* La Tarriere. *Dav.*

Teſta cylindrica, ſpira ſubulata, baſi truncata. | Die walzenförmige Schale hat einen zugeſpizten Schnirkel, und eine abgeſtumpfte Grundſpize.

α alba, punctis diſperſis minutiſſimis. | α weiß, mit ſehr kleinen zerſtreuten Punkten.

β pallida, punctis maculiſque nebuloſis. | β blaß, mit nebelichten Punkten und Flecken.

γ pallida, lineis punctatis. | γ blaß, mit punktirten Linien.

δ pallida, lineis obliquis angulatis. | δ blaß, mit ſchiefen Winkelzügen.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 57.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 10. ſ. 1.
Rumph. amb. t. 30. f. S.

Petiv.

Petiv. amb. t. 13. *f.* 24.
Argenv. Conch. *Pl.* 11. *f.* G.
Hill. Hiſt. of. *Anim. Pl.* 9.
Knor. Vergn. II. 4. *t.* 4. 5. *f.*
Mart. Konch. Kab. *II.* 51. *t.* 568. 569. *f.*

E. 15. Bulla Cypraea. — E. 15. Die Porzellanblaſe.

Linn. S. *N.* Sp. 389.

Belg. Bruin gebandeerd Bakje; *Gall.* Baquet bandé.

Teſta ouato oblonga, ſpirae apice prominulo, columella torta.

Die eyförmige längliche Schale hat eine hervorragende Wirbelſpize, und eine gewundene Spindel.

Knor. Vergn. VI. 4. *t.* 5. *f.*
Mus. Caes. Vindobon.

E. 16. Bulla virginea. — E. 16. Die Prinzenfahne.

Linn. S. *N.* Sp. 390.

Belg. Prince Vlag. *Gall.* Le Ruban. *Dav.*

Teſta ſubturrita erecta, columellae baſi truncata, cingulis coloratis transuerſis.

Die einigermaſſen gethürmte und aufrechte Schale iſt an dem Grunde der Spindel abgeſtumpfet, und mit gefärbten Querbändern bemalet.

α faſciis miniatis flauisque, lineis roſeis & purpuraſcentibus.	α mit meningrothen und gelben Bändern; wie auch roſenrothen und purpurfarbigen Linien.
β faſciis flauis & viridibus, lineis purpureis & violaceis.	β mit gelben und grünen Bändern; wie auch purpurrothen und violeten Linien.
γ lineis fuluis, cum faſciis interruptis, ſolum in anfractibus ſupremis alternantibus.	γ mit rothgelben Linien, die mit unterbrochenen Bändern auf den oberen Gewinden allein abwechſeln.
δ tota alba, lineis miniatis prope ſuturas.	δ ganz weiß, mit meningfarbigen Linien an den Näthen.
ε fuſca, anfractuum faſcia media & utrinque ſaturali alba.	ε braun, deren jedes Gewind in ſeiner Mitte, wie auch beiderſeits an der Nath eine weiße Binde trägt.
η alba, faſciis parallelis fuſcis.	η weiß, mit gleichweit abſtehenden braunen Bändern.

Bonan. Recr. cl. 3. *f.* 66.

Petiv. Gaz. *t.* 22. *f.* 11. *t.* 151. *f.* 1.

Gualt. Teſt. *t.* 6. *f.* A. C.

Argenv. Conch. Pl. 11. *f.* N. M.

Klein. Meth. Oſtr. *t.* 7. *f.* 116.

Seb. Thes. III. *t.* 39. *f.* 62-74. *t.* 40. *f.* 38. 39.

Regenſ. Samml. I. 10. *t.* 46. *f.*

Knor. Vergn. I. 30. *t.* 7. *f.*

—— —— *V.* 25. *t.* 4. *f.*

—— *Del. nat. I. t. B. II. f.* 6.

E. 17. Bulla achatina.

E. 17. Die franzöſiche Schellenſchnecke.

Linn. S. *N.* *Sp.* 391.

Belg. Franſche Belhoorn.

Teſta ouato oblonga, columellae baſi truncata.

Die eyförmige längliche Schale hat eine am Grunde abgeſtumpſte Spindel.

α faſciis longitudinalibus undulatis latis, columella rubra,

α mit nach der Länge laufenden breiten Wellen, und rother Spindel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 192.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 3. *f.* 34.

Petiv. Gaz. *t.* 44. *f.* 7.

Gualt. *Teſt.* *t.* 45. *f.* *B.*

Klein. Meth. Oſtr. *t.* 3. *f.* 60.

Seb. Thes. *III.* *t.* 71. *f.* 1 — 3.

Knor. *Vergn.* *IV.* 24. *t.* 1. *f.*

—— *Del.* *nat.* I. *t.* *B.* *V.* *f.* 1.

β faſciis longitudinalibus undulatis tenuibus, columella alba.

β mit nach der Länge laufenden ſchmalen Wellen, und weißer Spindel.

Seb. Thes. *III.* *t.* 71. *f.* 4, 5.

Knor. *Verg.* *V.* 12. *t.* 2. *f.*

Mus. *Caes.* *Vindobon.*

γ ponderoſa, alba unicolor.

γ ſchwer, weiß, einfärbig.

Mus. *Caes.* *Vindobon.*

F. Voluta.

F. Die Faltenſchnecke.

Linn. *Syſt.* *Nat.* *Gen.* 322.

Teſta conuoluta, columella transuerſe plicata.

Die zuſammen gerollte Schale iſt an ihrer Spindel mit Querfalten verſehen.

F. I. Apertura coarctata.

F. I. Mit eingefaßter Mündung.

F. I. 1. Voluta Auris Midae.

F. I. 1. Das Midasohr.

Linn. S. N. Sp. 392.

Belg. Midas - Oor. *Rumph.* *Angl.* Midas - Ear. *Petiv.* *Gall.* Oreille de Midas. *Argenv.*

Teſta ouali oblonga, ſpira, baſique rugulosa, columella bidentata.

Die eyförmige längliche Schale, iſt an dem Wirbel und Grunde gerunzelt, an der Spindel mit zwo Falten verſehen.

α niuea (major.)

α ſchneeweiß (größer.)

β fuſca (minor.)

β braun (kleiner.)

Bonan. Mus. Kirch. cl. 3. f. 412.

Rumph. amb. t. 33. f. H.H.

Petiv. amb. t. 8. f. 2.

Gualt. Teſt. t. 55. f. G.

Argenv. Conch. Pl. 10. f. G.

Klein. Meth. Oſtr. t. 7. f. 122.

Seb. Thes. III. t. 71. f. 21. 22.

Knor. Vergn. VI. 25. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. II. 43. t. 436 — 438. f.

Teſta

F. I. 2. Voluta Auris Sileni.

Teſta ouali gibba umbilicata, columellae plica unica craſſa flexuoſa.

Mus. Caeſ. Vindobon.

Teſta ouata gibba, laeuis, longitudinaliter obſolete ſtriata. Spira obtuſa, ex anfractibus quatuor conuexis, ſubito decreſcentibus, in verticem obtuſum terminata. Apertura ouata coarctata. Labium exterius marginatum, interius tenue replicatum, & ſuper columellam expanſum, dente ſubtus oblique flexuoſo, craſſo. Baſis perforata. Color badius, faſciis undulatis longitudinalibus rufis.

F. II. Cylindroideae effuſae.

F. II. 1. Voluta porphyria.

Linn. S. N. Sp. 398.

Belg. Porphyr Daadel. Oud. *Angl.* The Camp. *Da Coſt.* Porphyre *Argenv.*

Teſta ſubcylindrica laeui, ſpirae anfractibus acute marginatis, infimis planiuſculis, columella incraſſata oblique plicata.

Picta lineis angulatis.

F. I. 2. Das Langohr.

Die eyförmige höckerige Schale hat an der Spindel eine dicke gedrehte Falte.

Die Schale iſt eyförmig, und glatt, nach der Länge herab matt geſtreifet. Der Schnirkel beſtebet aus vier gewölbten geſchwinde abnehmenden Windungen, die ſich in eine ſtumpfe Spize endigen. Die Mündung iſt eyförmig, ganz eingefaßt. Die äußere Lefze iſt eingeſäumt, die innere dünne über die Spindel ausgebreitet, an welcher unten eine dichte ſchief gedrehte Falte liegt. Der Grund iſt durchbohret. Die Farbe ſchwarzbraun, mit rothbraunen nach der Länge herablaufenden Wellen.

F. II. Einigermaſſen walzenförmige, mit ausgeſchnittener Mündung.

F. II. 1. Die Lagerwalze.

Die walzenförmige glatte Schale hat ſcharfrandige Windungen, deren unterſte etwas flach ſind, mit einer dichten ſchief gefaltenen Spindel.

Mit eckigen Winkelzügen bemalet.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 142.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 10. f. 11.

Petiv. Gaz. t. 102. f. 19.

Gualt. Teſt. t. 24. f. P.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. K.

Regenſ. Samml. I. 2. t. 15. f.

Knor. Vergn. I. 15. t. 1. f.

—— Del. nat. I. t. B. IV f. 4.

Da Coſt. Elem. Pl. 5. f. 4.

Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 498. f.

F. II. 2. Voluta Oliua.

Linn. S. N. Sp. 399.

F. II. 2. Die Olivenwalze.

Belg. Daadel. *Angl.* The Olive Shell. *Hill.* *Gall.* l'Olive. *Dav.*

Teſta ſubcylindrica laeui, ſpirae anfractibus planiuſculis, extimo tumido reflexo ; columella incraſſata, oblique plicata.

Die einigermaßen walzenförmige glatte Schale hat etwas flache Schnirkelgewinde, deren äußerſtes aufgeworfen, und umgebogen iſt ; mit einer dichten ſchiefgefaltenen Spindel.

α albida lineis undulatis, faſciisque reticulatis rufis.

α weiß mit rothbraunen wellenförmigen Linien, und netzartigen rothbraunen Querbändern.

Mart.

Mart. Konch. Kab. *II.* 51. *t.* 561. *f.*

β ex viridescenti reticulata, fasciis duabus transuerſis nigris, columella crocea.

β mit grünlichen Nezen, zwey ſchwarzen Querbändern, und einer ſafranfarbigen Spindel.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 10. *c.* 6. *f.* 28.

Rumph amb. *t.* 39. *f.* 3.

Seb. *Thes.* *III.* *t.* 53. *f.* *M.*

Mart. *Konch.* *Kab.* *II.* 48. *t.* 512. 513. *f.*

γ ex coeruleſcente luteoque maculata, faſciis transuerſis viridibus.

γ bläulicht, und gelb gefleckt, mit grünen Querbändern.

Liſt. *Hiſt.* *Conch.* *l.* 4. *ſ.* 10. *f.* 26.

Seb. *Thes.* *III.* *t.* 53. *f.* *H.* *G.*

Knor. *Vergn.* *III.* 2. *t.* 4. *f.*

Mart. Konch. Kab. II. 48. *t.* 511. *f.*

δ olivacea, faſciis transuerſis interruptis nigris.

δ olivengrün, mit unterbrochenen ſchwarzen Querbändern.

Belg. Prince-Begraafenis. *Rumph.* *Angl.* Prinſe Stamper. *Petiv.* *Gall.* Drap mortuaire. *Dav.*

Liſt. *Hiſt.* *Conch.* *l.* 4. *ſ.* 10. *f.* 25.

Rumph. *amb.* *t.* 39. *f.* 4.

Petiv. *amb.* *t.* 11. *f.* 1.

Valent. *Abb.* 8. *t.* 68. *f.*

Argenv. Conch. Pl. 13. *f.* S.

Seb. Thes. III. t. 53. *f.* F. *ε*.

Knor. Vergn. V. 19. *t.* 1. *f.*

Mart. Konch. Kab. *II.* 45. *t.* 480. *f.*

ε luteſcens, faſciis longitudinalibus undulatis rufis. | *ε* gelblich, mit rothbraunen nach der Länge laufenden wellenförmigen Bändern.

Mart. Konch. Kab. *II.* 47. *t.* 505. *f.*

ζ alba, luteo fuſcoque nebuloſa, faſciis duabus transverſis fuſcis. | *ζ* weiß, mit gelben und braunen Wolken, und zwey braunen Querbändern.

Belg. Porphyrſteene Daadel. *Rumph. Angl.* The pourple Marble Date *Gall.* Olive ſatinée a bandes. Oud.

Fauce roſea. | Mit roſenrothem Schlunde.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 10. *f.* 14.

Rumph. amb. t. 39. *f.* 1.

Gualt. Teſt. t. 24. *f.* O.

Seb. Thes. III. t. 53. *f. A.* — D.

Regenſ. Samml. I. 2. *t.* 15. *f.*

Mart. Konch. Kab. *II.* 45. *t.* 476, 477. *f.*

η aurantia; faſciis obſoletis transverſis violaceis. | *η* orangenroth, mit violeten matten Querbändern.

Belg. Achaatje. *Rumph. Gall.* La Cornaline.

Mart.

Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 495. f.

ϑ aurantia, faſcia media transuerſa niuea. | ϑ orangenroth mit einem ſchneeweißen Querbande um die Mitte.

Mus. Caes. Vindobon.

ι pallide lutea, maculis adſperſa coeruleſcentibus, fauce violacea. | ι blaßgelb, mit blaulichen Flecken beſezet, und einem violeten Schlunde.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 10. *f.* 6.
Rumph. *amb.* *t.* 39. *f.* 6.
Petiv. *amb.* *t.* 22. *f.* 5.
Gualt. Teſt. *t.* 23. *f.* H, J, E.
Seb. Thes. III. *t.* 53. *f.* W.
Mart. Konch. *Kab.* II. 46. t. 493, 494. *f.*

κ brunna unicolor. | κ braun einfärbig.

Belg. Grauvve Munnik. *Valent.* Olive de Satin. *Pet.*

Seb. Thes. III. *t.* 53. *f.* K.
Knor. *Vergn.* *V.* 27. *t.* 5. *f.*
Mart. Konch. Konch *II*, 47. t. 501. *f.*
Da Coſt. *Elem.* Pl. 5. F. 7.

λ ex fuſco nigra, unicolor. | λ ſchwarzbraun.

Belg. Svvarte Daadel. *Rumph.* *Gall.* La Moresque *Dav.*

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 10. *f.* 27.

Rumph. amb. t. 39. *f.* 2.

Gualt. Teſt. t. 23. *f. B.*

Seb. Thes. III. t. 53. *f. L.*

Knor. Vergn. V. 28. *t.* 6. *f.*

Mart. Konch. Kab. II. 45. *t.* 472, 473. *f.*

F. II. 3. Voluta gibboſa. F. II. 3. Die dicke Schlauchdattel.

Belg. Sluik-Daadel *Mus. Oud.* *Angl.* The clouded Oliue. *Hill.* *Gall.* Agate boſſue. *Mus. Oud.*

Teſta ouali ventricoſa, columella calloſa, & ſpirae acuminatae anfractibus infimis incraſſatis.

Die eyförmige dickbäuchige Schale, hat eine ſchwüllige Lefze, und aufgetriebene Untergewinde am zugeſpizten Schnirkel.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 10. *f.* 2.

Petiv. Gaz. t. 19. *f.* 9.

Gualt. Teſt. t. 24. *f. G.*

Argenv. Conch. Pl. 13. *f. M.*

Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.

Knor. Vergn. II. 12. *t.* 4, 5. *f.*

—— —— *V.* 4. *t.* 4. *f.*

Mart. Konch. Kab. *II.* 51. *t.* 565. 566. *f.*

Teſta ouata, oblonga, ponderoſa, glabra. Spira acuminata. Anfractus ſulco ſuturali diſtincti, infimi tumidi gibbi. Labium exterius integerrimum, acutum; interius reflexum, tumidum, calloſum, ſupra incraſſatum, ſubtus oblique, ſulcatum, emarginatum. Venter extus brunnus, maculis oblongis, & faſcia tranſuerſa albida. Faux alba.

Die Schale iſt länglich eyförmig, ſchwer und glatt. Der Schnirkel zugeſpizt. Die Windungen ſind durch eine gefurchte Nathe von einander abgeſondert, deren untere aufgeſchwollen und ungleich. Die äußere Lefze hat einen ganzen ſcharfen Rand die innere iſt übergeſchlagen, ſchwüllig, und oben dick aufgeworfen, unten ſchief gefurchet, und eingeſäumet. Der Leib iſt außen braun, mit weißen länglichen Flecken und einem Querbande. Der Schlund weiß.

F. II. 4. Voluta Iſpidula.

F. II. 4. Die Spizdattel.

Linn. S. N. Sp. 400.

Teſta ſubcylindrica laeui, ſpira conica, ſuturis acutis, columella incraſſata oblique plicata.

Die einigermaßen walzenförmige glatte Schale hat einen glatten kegelförmigen ſcharfrandigen Schnirkel, und eine dichte ſchief geſpaltene Spindel,

α albida, brunno maculata.

α weißlich, mit braunen Flecken.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 10. *f.* 12.

Argenv. Conch. Pl. 13. *f. Q.*

Mart. Kouch. Kab. *II.* 49. *t.* 526. *f.*

β alba, maculis undatis fuſcis.

β weiß, mit wellenförmigen braunen Flecken.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 10. f. 21.
Gualt. Teſt. t. 23. f. M. OO.
Seb. Thes. III. t. 53. f. V.
Adans. Seneg. Pl. 4. f. 6. t.
Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 487. 488. f.

γ albida, maculis venisque fuſcis. | γ lang, mit braunen Flecken, und Adern.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 10. f. 9.
Rumph. amb. t. 39. f. 9.
Petiv. Gaz. t. 102. f. 18.
Knor. Vergn. III. 17. t. 2. f.
Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 553. f.

δ niuea unicolor. | δ ſchneeweiß, einfärbig.

Knor. Vergn. VI. 34. t. 45. f.

ε alba, maculis raris, & faſcia prope ſpiram transuerſa ruſa. | ε weiß, mit ſeltenen Flecken, und einem Querbande an dem Schnirkel von rothbrauner Farbe.

Seb. Thes. III. t. 53. f. X.
Mart. Konch. Kab. II. 49. t. 524. 525. f.

ζ alba parua, undis fuſcis tenuiſſimis. | ζ weiß, mit ſehr feinen braunen Wellen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 10. f. 22.
Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 543. 544. f.

η griſea

η griſea, parua, lineis angulatis violaceis. | η lichtgrau klein mit violeten Winkelzügen.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 4. ſ. 10. f. 13.
Petiv. Gaz. t. 152. f. 6.
Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 545. 547. f.

ϑ caſtanea. | ϑ kaſtanienbraun.

ι fuſca alboque maculata. | ι braun, und weiß gefleckt.

Mart. Konch. Kab. II. 49. t. 537, 538. f.

κ alba punctis luteis, maculisque undatis fuſcis, fauce violacea. | κ weiß, mit gelben Punkten, braunen Wellen, und einem violeter Schlunde.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 4. ſ. 10. f. 3.
Petiv. Gaz. t. 156. f. 18.
Rumph. amb. t. 38. f. 5.
Gualt. Teſt. t. 23. f. T.
Mart. Konch. Kab. II. 48. t. 518. 521. f.

F. III. Ouatae, efuſae. | F. III. Eyförmige, mit ausgeſchnittener Mündung.

F. III. 1. Voluta bullata. | F. III. 1. Die Blaſenwalze.

Teſta

Teſta emarginata, ouata, laeui, ſpira obliterata, complanata, columella quadriplicata.

Die eingeſäumte eyförmige glatte Schale hat einen ſtumpfen plattgedrückten Wirbel, und drey Falten an der Spindel.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 11. f. 11.

Knor. Vergn. IV. 23. t. 1. f. 27. t. 1. f.

Teſta ouata laeuis. Spira obliterata, complanata. Apertura lanceolata, extremitatibus ſubeſuſis. Columella conuexa glabra, ſubtus plicata, plicis craſſis, obliquis, quatuor. Labrum obtuſum extrorſum reflexum, incraſſatum. Baſis infra plicas oblique marginata. Color pallide rubeſcens, faſciis transuerſis obſoletis albis.

Die Schale iſt eyförmig, und glatt. Der Schnirkel ſtumpf, und plattgedrückt. Die Mündung lanzetförmig. Die Ende mit unvollkommenen Ausſchnitten. Die erhabene glatte Spindel hat unten vier ſchief ſtehende dichte Falten. Die äußere Lefze iſt ſtumpf, auswärts überſchlagen, und aufgeworfen. Der Grund hat unter den Falten einen ſchiefen Saum. Die Farbe iſt blaßroth mit matten weißen Querbändern.

F. III. 2. Voluta Perſicula.

F. III. 2. Die Kornelkirſche.

Linn. S. N. Sp. 404.

Teſta emarginata laeui, ſpira retuſo umbilicata, columella ſeptem plicata, labro marginato crenato.

Die eingeſäumte glatte Schale iſt mit einem ſtumpfen genabelten Schnirkel, und an der Spindel mit ſieben Falten verſehen; an der äußern Lefze eingeſäumt und gekerbet.

α lineis transuerſis fuluis cincta.

α mit rothgelben Querſtrichen.

Belg. Gebandeerde Kornoeltje. *Gall.* La Cornouille faſciée.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 11. ſ. 9.
Petiv. Gaz. t. 8. f. 10.
Gualt. Teſt. t. 28. f. B.
Adans. Seneg. *Pl. 4. f. 4.*
Knor. Vergn. VI. 21. t. 6. f.
Mart. Konch. Kab. *II. 42. t. 419. 420. f.*

β punctis adſperſa incarnatis.

β mit fleiſchrothen Punkten geflecket.

Belg. Geſtippelte Kornoelkersje. *Gall.* La Cornouille ponctuée.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 11. f. 10.
Petiv. Gaz. t. 8. f. 2.
Gualt. Teſt. t. 28. f. C, D, E.
Mart. Konch. Kab. *II. 42. t. 421. f.*

F. III. 3. Voluta marginata.

Teſta ouata, ſpira obſoleta, lateribus incraſſato marginatis, columella quadriplicata.

F. III. 3. Die eingeſäumte Kornelkirſche.

Die eyförmige Schale hat einen unvollkommenen Schnirkel, aufgeworfene eingeſäumte Seiten, und vier Falten an der Spindel.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta

Teſta ouata, laeuis; Spira turbinata, adnata labro incraſſato; Latera cincta margine lato, tumido. Columella plicata, plicis craſſis obliquis quatuor. Apertura lanceolata, extremitatibus effuſis. Color niueus.

Die Schale iſt eyförmig, und glatt. Der Schnirkel zugeſpizt, und mit der Vorderleſze verwachſen. Die Seiten ſind mit einem breiten aufgeworfenen Rande eingefaßt. Die Spindel hat vier dicke Querfalten. Die Mündung iſt lanzetförmig, an beiden Enden ausgeſchnitten. Die Farbe ſchneeweiß.

F. III. 4. Voluta Faba. — F. III. 4. Die Bohne.

Linn. S. N. Sp. 406.

Belg. Bonje. *Angl.* Black Speckled Zilver Cowrykin. *Petiv. Gall.* Cocombre pointée.

Teſta ouata, laeui, ſpirae mucronatae anfractibus plicatis, columella quadriplicata.

Die Schale iſt eyförmig, und glatt, ihr Schnirkel zugeſpizt, und gefalten.

Color glaucus, punctis oblongis fuſcis, per ſeries longitudinales pictis.

Die Farbe iſt fahl, mit nach der Länge ſtehenden Reihen länglicher brauner Punkten bemalet.

Petiv. Gaz. t. 10. *f.* 5.
Gualt. Teſt. t. 28. *f. Q.*
Adans. Seneg. *Pl.* 4. *f.* 2.
Knor. Vergn. IV. 17. *t.* 6. *f.*
Mart. Konch. Kab. *II.* 42. *t.* 432. 433. *f.*

F. III. 5. Voluta glabella. — F. III. 5. Die glatte Gurke.

Linn. S. N. Sp. 407.

Belg. Pruim. *Gall.* La Prune.

Teſta ouata laeui, mucronata, columella quatriplicata, labro incraſſato, reflexo.

Die eyförmige, glatte, ſpizwirblige Schale, hat an der Spindel vier Falten, und eine verdickte, übergeſchlagene Schalenlefze.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 326.

Gualt. *Teſt.* *t.* 28. *f.* L.

Adans. Seneg. *Pl.* 4. *f.* 3.

Knor. *Vergn.* *IV.* 21. *t.* 3, 4. *f.*

Mart. Konch. Kab. *II.* 42. *t.* 422. 423. *f.*

F. III. 6. Voluta mercatoria.

F. III. 6. Das brütende Täubchen.

Linn. S. *N.* Sp. 409.

Belg. Broedende Duifje. *Gall.* Le Pigeon couvant.

Teſta ouata, transuerſim ſtriata; columella retuſa, laboque denticulatis.

Die eyförmige Schale iſt in die Quere geſtreifet, an der ſtumpfen Spindel, wie auch an der äußern Lefze gezähnelt.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 11. *f.* 42.

Petiv. *Gaz.* *t.* 9. *f.* 4.

Gualt. *Teſt.* *t.* 43. *f.* J. L.

Adans. Seneg. *Pl.* 9. *f.* 29.
Knor. *Vergn.* *IV.* 12. *t.* 5. *f.*
—— —— *VI.* 16. *t.* 6. 7. *f.* 18. *t.* 3. *f.*
Mart. Konch. Kab. *II.* 44. *t.* 452.—458. *f.*

F. III. 7. Voluta ruſtica. F. III. 7. Der Olivenkern.

Linn. S. *N.* *Sp.* 410.

Belg. Boetje.

Teſta ouata, laeui, ſpira mucronata; columella, labroque denticulatis.

Die eyförmige, glatte, ſpizwirblige Schale iſt an der Spindel, und äußeren Lefze gezähnelt.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 11. *f.* 48, 49.
Petiv. *Gaz.* *t.* 30. *f.* 6.
Gualt. *Teſt.* *t.* 43. *f.* E. G. H.
Adans. *Seneg.* *Pl.* 9. *f.* 28.
Knor. *Vergn.* *VI.* 18. *t.* 4. *f.*
Mart. Konch. Kab. *II.* 44. *t.* 469. *f.*

F. III. 8. Voluta paupercula. F. III. 8. Das arme Weibchen.

Linn. S. *N.* *Sp.* 411.

Gall. La Mignature.

Teſta

Teſta ouata oblonga, laeui, columella quatriplicata, labro obtuſo.	Die eyförmige längliche Schale, hat vier Falten an der Spindel, und eine ſtumpfe Schalenlefze.
Color fuſcus, aut ferrugineus, faſciis longitudinalibus albidis.	Braun, oder eiſenroſtig, mit weiß-lichen nach der Länge laufenden Bändern.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 11. *f.* 35.

Gualt. Teſt. t. 54. *f.* L.

Knor. Vergn. IV. 26. *t.* 5. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 149. *t.* 1386. *f.*

F. III. 9. Voluta mendicaria.	F. III. 9. **Das traurende Täubchen.**

Linn. S. N. Sp. 412.

Teſta ouata, transuerſim tenuiſſime ſtriata, ſpira coronata; columella complanata, labroque denticulatis.	Die eyförmige, in die Quere fein geſtreifte Schale, iſt an dem Schnirkel mit Körnern, an der platt gedrückten Spindel, und der Schalenlefze mit Zähnchen beſezet
Atra, faſciis transuerſis tribus albis.	Schwarz mit drey weißen Querbändern.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 11. *f.* 47.

Petiv. Gaz. t. 11. f. 5.
Gualt. Teſt. t. 52. f. E.
Knor. Vergn. IV. 16. t. 3. f.
Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 460. 461. f.

F. III. 10. Voluta cancellata.

F. III. 10. Die nezförmige Faltenſchuecke.

Linn. S. N. Sp. 413.

Teſta ouata, ſtriis eleuatis transuerſis, plicisque obliquis reticulatim intertexta, columella umbillicata, biplicata, contorta.

Die eyförmige Schale iſt mit erhabenen Streifen, und ſchiefen Falten nezförmig überzogen, und mit einer durchbohrten, zweymal gefaltenen, verdrehten Spindel verſehen

Gualt. Teſt. t. 48. f. B. C.
Seb. Thes. III. t. 49. f. 45. 46. 48.
Adans. Seneg. Pl. 8. f. 16.
Knor. Vergn. IV. 5. t. 5. f. ?
Mus. Caes. Vindobon.

F. IV. Fuſiformes, marginatae, effuſae.

F. IV. Spindelförmige, eingeſäumte, mit ausgeſchnittener Mündung.

F. IV. 1. Voluta filoſa.

F. IV. 1. Die Schnurwalze.

Teſta

Teſta fuſiformi tenuiſſime reticulato ſtriata, cingulis eleuatis transuerſis columella quatriplicata, labro crenato.

Die ſpindelförmige Schale iſt mit ſehr feinen Strichen nezförmig gezeichnet, mit erhabenen Querſchnüren umgürtet, an der Spindel mit vier Falten verſehen, an der Schalenleſze gekerbet.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta fuſiformis, ſtriis minutiſſimis inciſis reticulata, cingulis fili formibus eleuatis, remotis, ventris duodecim, anfractuum quatuor. Columella umbilicata, replicata, plicis eleuatis obliquis quatuor. Labrum acutum, ſub cingulis ſulcatum. Baſis effuſa, extus marginata. Color albus, cingulorum rufus.

Die Schale iſt ſpindelförmig, mit ſehr feinen Strichen beſezet, und ſchnurförmigen erhabenen, Quergürteln umgeben, deren zwölf den Leib, vier die Gewinde umgeben. An der genabelten, und übergeſchlagenen Spindel ſind vier erhabene ſchiefe Falten. Die äußere Lefze iſt ſcharfrandig, unter den Schnüren gefurchet. Der Grund ausgeſchnitten und außen eingeſäumt. Die Farbe weiß, mit rothbraunen Schnüren.

F. IV. 2. Voluta Scabricula.

F. IV. 2. Die rauhe Nadelwalze.

Linn. S. *N.* *Sp.* 417.

Belg. Rauwe Pen-hoorn.

Teſta fuſiformi, ſtriis eleuatis transuerſis, longitudinalibus inciſis, columella quatriplicata, labro crenato.

Die ſpindelförmige Schale hat erhabene Querſtreife, und nach der Länge laufende eingeſchnittene Striche, eine gekerbte Schalenleſze und vier Querfalten.

Gualt. Teſt. t. 53. f. D.

Knor. Vergn. III. 27. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 149. t. 1389. f.

F. IV. 3. Voluta Sanguiſuga.

F. IV. 3. Die Fahnennadel.

Linn. S. N. Sp. 419.

Teſta fuſiformi, longitudinaliter ſulcata, ſtriis inciſis transuerſis, columella quatriplicata, labro laeui.

Die ſpindelförmige Schale iſt der Länge nach gefurchet, in die Quere mit eingeſchnittenen Strichen beſetzet, ihre Spindel vierfach gefalten, die Schalenleſze glatt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 11. f. 38.

Rumph. amb. t. 29. f. V.

Petiv. Gaz. t. 4. f. 5.

Gualt. Teſt. t. 53. f. F.

Argenv. Conch. Pl. 9. f. V.

Seb. Thes. III. t. 49. f. 11. 12.

Regenſ. Samml. I. 12. t. 5. f.

Knor. Vergn. IV. 11. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 148. t. 1367. f.

F. IV. 4. Voluta cafra.

F. IV. 4. Die braune Brandnadel.

Linn. S. N. Sp. 420.

Belg. Band-Pen.

Teſta

Teſta fuſiformi, laeui, ſpirae anfractibus longitudinaliter rugoſis, columella quatriplicata.

Die ſpindelförmige glatte Schale iſt an den Wirbelgewinden mit länglichen Runzeln, an der Spindel mit vier Falten verſehen.

Gualt. Teſt. t. 53. f. E.

Seb. Thes. III. t. 49. f. 21, 22.

Knor. Vergn. V. 19. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 148. t. 1369. f.

F. IV. 5. Voluta Vulpecula.

F. IV. 5. Der Fuchsthurm.

Linn. Syſt. N. Sp. 423.

Belg. Toornje *Rumph.*

Teſta fuſiformi longitudinabus angulata, ſtriis transuerſis inciſis, columella quatriplicata.

Die ſpindelförmige Schale hat nach der Länge herablaufende Ecken und eingeſchnittene Querſtriche, mit einer vierfach gefaltenen Spindel.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 11. f. 39.

Petiv. Gaz. t. 56. f. 1.

Rumph. amb. t. 29. f. R.

Valent. Abh. 2. t. 10. f.

Gualt. Teſt. t. 54. f. B.

Knor. Vergn. V. 16. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 148. t. 1366. f.

F. IV. 6. Voluta plicaria.

F. IV. 6. Die knotige Bandnadel.

Linn. S. N. Sp. 424.

Belg. Genobelde Band-Pen. *Gall.* Le Minaret. *Dav.*

Teſta fuſiformi, angulis antice ſubſpinoſis, columella quatriplicata, labro laeui.

Die ſpindelförmige Schale hat vorne zugeſpizte Ecken, vier Falten an der Spindel, und eine glatte Schalenlefze.

Bonan. Recr. *el.* 3. *f.* 64.
Gualt. *Teſt.* *t.* 54. *f.* F.
Argenv. *Conch.* *Pl.* 9. *f* Q.
Seb. *Thes.* *III.* *t.* 49. *f.* 23, 24.
Knor. *Vergn.* *I.* 15. *t.* 5, 6. *f.*
—— —— *III.* 27. *t.* 4. *f.*
Mart. Kouch. *Kab.* *IV.* 148. *t.* 1362. 1363. *f.*

F. IV. 7. Voluta pertuſa.

F. IV. 7. Die durchgeſtochene Nadel.

Linn. S. N. Sp. 424.

Belg. Monniks Kappe.

Teſta fuſiformi, ſtriis punctatis transuerſim pertuſa, columella quinqueplicata.

Die ſpindelförmige Schale hat aus durchſtochenen Punkten beſtehende Streifen, und fünf Falten an der Spindel.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 11. *f.* 65.

Gualt. Teſt. *t.* 54. *f.* H.

Seb. Thes. *III. t.* 50. *f.* 28. 47. 48.

Knor. Vergn. IV. 28. *t.* 3. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 147. *t.* 1358. 1359. *f.*

Mus. Caes. Vindobon.

F. IV. 8. Voluta Mitra episcopalis.

F. IV. 8. Die Biſchofsmüze.

Linn. S. *N.* Sp. 425.

Belg. Penne hoorn. *Rumph. Angl.* The Biſchops - Miter Shell. *Hill. Gall.* La tiare epiſcopale. *Argenv.*

Teſta fuſiformi, laeui, columella quatriplicata.

Die ſpindelförmige glatte Schale hat an der Spindel vier Falten.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 120.

Rumph. amb. t. 29. *f.* K.

Petiv. amb. t. 13. *f.* 11.

Gualt. Teſt. *t.* 53. *f.* G.

Argenv. Conch. *Pl.* 9. *f.* G.

Regenſ. Samml. I. 5. *t.* 33. *f.*

Hill. Hiſt. of. *Anim. Pl.* 7.

Knor. Vergn. I. 6. *t.* 2. *f.*

Mart. Konch. *Kab. IV.* 147. t. 1360. *f.*

F. IV. 9. Voluta Mitra papalis.

F. IV. 9. Die Pabſtkrone.

Linn. S. *N.* *Sp.* 426.

° *Belg.* De Paus-Krone. *Rumph.* *Angl.* The papal-Crown. *Da Coſt.* *Gall.* La tiare papale. *Dav.*

Teſta fuſiformi, anfractibus coronatis, labro denticulato, columella quatriplicata.

Die ſpindelförmige Schale hat gekrönte Windungen, eine gezähnelte Schalenleſze, und vier Falten an der Spindel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 119.
Liſt. *Hiſt.* *Conch.* *l.* 4. *ſ.* 11. *f.* 66-68.
Rumph. *amb.* *t.* 29. *f.* *J.*
Petiv. *amb.* *t.* 9. *f.* 15.
Gualt. *Teſt.* *t.* 53. *f.* *J.* *L.*
Argenv. *Concb.* *Pl.* 9. *f.* E.
Seb. *Thes.* III. *t.* 51. *f.* 1. — 5, 37.
Regenſ. *Samml.* I. 1. *t.* 1. *f.*
Knor. *Verg.* I. 6. *t.* 1. *f.*
Da Coſt. *Elem.* *Pl.* 4. *f.* 3.
Mart. Konch. Kab. *IV.* 147. *t.* 1353. 1354. *f.*

F. IV. 10. Voluta Muſica.

F. IV. 10. Die Notenſchnecke.

Linn. *S.* *N.* *Sp.* 427.

Belg. Muſiek-hoorn. *Angl.* The Muſik Shell. *Hill.* *Gall.* La Muſique *Dav.*

Teſta marginata, anfractibus obtuſe ſpinoſis, columella octoplicata.

Die eingeſäumte Schale iſt auf den Gewinden mit ſtumpfen Stacheln, und an der Spindel mit acht Falten beſezt.

Bonan.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 296. 297.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 11. f. 14.
Gualt. Teſt. t. 28. f. Z.
Argenv. Conch. Pl. 14. f. F.
Klein. Meth. Oſtr. t. 5. f. 88.
Seb. Thes. III. t. 57. f. 7 — 19. 20.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.
Knor. Vergn. I. 23. t. 1. f.
—— —— III. 12. t. 1. f.
Murray. Fund. Teſt. t. 1. f. 17.
Müll. Linn. *Nat. Syſt.* VI. 1. B. 14. t. 5. f.
Mart. Konch. Kab. III. 96. t. 926. 929. f.

F. IV. 11. Voluta Veſpertilio.

F. IV. 11. Die Fledermaus.

Linn. S. N. Sp. 428.

Belg. De Vleermuis. *Klein. Angl.* Long Batt Muſic Stamper. *Pet. Gall.* Chauve Souris. *Dav.*

Teſta marginata, anfractibus acute ſpinoſis, columella quatriplicata.

Die eingeſäumte Schale hat ſpizige Stacheln auf den Gewinden, und eine viermal gefaltene Spindel.

α ſpinis breuibus.

α mit kurzen Stacheln.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 11. f. 16.

Rumph. amb. t. 32. f. J.

Petiv. amb. t. 15. f. 12.

Valent. Abb. 1. t. 1. f.; 7. t. 62. f.

Gualt. Teſt. t. 29. f. F, G, H, V.

Seb. Thes. III. t. 57. f. 4, 5.

Knor. Vergn. II. 6. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. III. 98. t. 938, 939. f.

β ſpinis acutis rectis. β mit ſpizigen geraden Stacheln.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 11. f. 17.

Petiv. Gaz. t. 70. f. 10.

—— amb. t. 15. f. 8.

Gualt. Teſt. t. 28. f. J. M.

Klein. Meth. Oſtr. t. 5. f. 89.

Seb. Thes. III. t. 67. f. 1-5.

Knor. Vergn. I. 22. t. 3. f.

—— Delic. nat. I. t. B. VI. f. 5.

Mart. Konch. Kab. III. 98. t. 937. f.

γ maxima, ſpinis acutis incuruis. γ ſehr groß mit ſpizigen gekrümmten Stacheln.

Mart. Konch. Kab. III. 97. t. 934, 935. f.

F. IV. 12. Voluta hebraea.

F. IV. 12. Die wilde Muſik.

Linn. S. *N. Sp.* 429.

Belg. De wilde Muſyk-hoorn. *Angl.* The oriental Muſic. *Gall.* L'hebraique *Dav.*

Teſta ouata, anfractibus acute ſpinoſis, plicis quinque craſſioribus, tribusque obſoletis.

Die eyförmige Schale hat an den Gewinden ſpizige Stacheln, und an der Spindel fünf ſtarke, und fünf ſchwächere Falten.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 293.
Liſt. Hiſt. Concb. *l.* 4. *ſ.* 11. *f.* 18.
Rumph. amb. *t.* 32. *f.* L.
Petiv. amb. *t.* 15. *f.* 12.
Gualt. Teſt. *t.* 28. *f.* T.
Argenv. Concb. *Pl.* 14. *f.* D.
Seb. Tbes. *III. t.* 57. *f.* 1 - 3, 6.
Knor. Vergn. I. 24. *t.* 1, 2. *f.*
—— —— *VI.* 15. *t.* 1. *f.*
Mart. Konch. Kab. *III.* 96. *t.* 924. 925. *f.*

F. IV. 13. Voluta Capitellum.

F. IV. 13. Die Vaſe.

Belg. Witte Vaas, *Angl.* The white Muſic, *Gall.* L'Aigrette. *Dav.*

Teſta

Teſta ouata, nodoſa, rugoſa, columella triplicata, baſi umbilicata.

Die eyförmige, knotige, runzelichte Schale hat drey Falten an der Spindel, und am Grunde eine nabelförmige Vertiefung.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 11. f. 19.

Gualt. Teſt. t. 37. f. A.

Argenv. Conch Pl. 15. f. K.

Seb. Thes. III. t. 49. f. 76.

Knor. Vergn. VI. 35. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. III. 99. t. 947. 948. f.

F. IV. 14. Voluta muricata.

F. IV. 14. Die rothmündige Vaſe.

Belg. Capitaale Schwitzersbroek.

Teſta plicata, ſpiniſque muricata, columella quinque plicata, perforata.

Die gefaltene und ſtachelichte Schale hat fünf Falten an der durchbohrten Spindel.

Mart. Konch. Kab. III. 99. t. 949. 950. f.

Teſta ponderoſa, transuerſim ſulcata, ſulcis acutis alternatim aequalibus. Spira conica, nodoſa. Anfractus, ventriſque baſis ſpinoſa; ſpinis conicis, fornicatis, obtuſis.

Die Schale iſt ſchwer, in die Quere gefurchet, mit ſcharfen wechſelweiſe ungleichen Furchen beſezet. Der Schnirkel kegelförmig und knotig. Die Gewinde, und der

Aper-

Apertura oblonga. Labrum exterius denticulatum, ſubtus plicatum. Columella laevis, rugis transuerſis tribus majoribus, duabus alternis minoribus. Baſis perforata; Color albus, aperturae roſeus.

Grund des Leibes ſind ſtachelicht; die Stachel kegelförmig, hohl und ſtumpf. Die Mündung länglich. Die Schalenleſze iſt gezähnelt, unten gefalten Die Spindel glatt, mit fünf grösseren, und zwo kleineren Falten. Der Grund iſt durchbohret. Die Farbe weiß, die Mündung roſenroth.

F. IV. 15. Voluta ceramica.

F. IV. 15. Die gezakte Vaſe.

Linn. S. N. Sp. 432.

Belg. Getakte Swizers-broeck. *Rumph. Angl.* Ceram Spuc Shell. *Petiv. Gall.* Chauſſe-Trape.

Teſta utrinque acuminata, ſpinis diuergentibus, columella quinque plicata.

Die an beiden Enden zugeſpizte Schale iſt mit ausgebreiteten Stacheln beſezet, und an der Spindel mit fünf Falten verſehen.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 368.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 11. *f.* 51.

Rumph. *amb.* *t.* 24. *f.* *A.* *t.* 49. *f.* L.

Petiv. *amb.* *t.* 11. *f.* 13.

Gualt. *Teſt.* *t.* 55. *f.* D.

Argenv. Conch. *Pl.* 15. *f.* E.

Knor. *Vergn.* *II.* 2. *t.* 2. *f.*

—— —— *VI.* 35. *t.* 2. *f.*

Mart. Konch. Kab. *III.* 99. *t.* 943. . *f.*

F. V.

F. IV. 16. Voluta Pyrum.

F. IV. 16. Die Birnwalze.

Belg. Witte oſſerhoorn. *Angl. Gall.* La rave. *Dan.*

Teſta pyriformi, roſtrata, ponderoſa, columella tri-quatriplicata.

Die birnförmige ſchwere Schale iſt mit einem Schnabel, und drey bis vier Falten an der Spindel beſezet.

α major, alba, columella triplicata.

α gröſſer, weiſſer, mit dreymal gefaltener Spindel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 194.
Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 11. *f.* 25.
Rumph. *amb.* *t.* 36. *f.* 7.
Gualt. Teſt. t. 46. *f.* C.
Knor. *Vergn.* *VI.* 39. *t.* 1. *f.*
Mart. Konch. Kab. *III.* 95. *t.* 916. *f.*

β minor, fuſcopunctata, columella quatriplicata.

β kleiner, braunpunktirt, mit viermal gefaltener Spindel.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 11. *f.* 26.
Klein. Meth. Oſtr. *t.* 4. *f.* 49.
Knor. *Vergn.* *VI.* 22. *t.* 2. *f.*
Mart. Konch. Kab. *III.* 95. *t.* 917. 918. *f.*

F. V. 1. Voluta aethiopica.

Linn. S. N. Sp. 435.

Belg. Gekroande Bak. *Rumph. Angl.* Ceram Coronnet. *Petiv. Gall*. Couronne d' Ethiopie. *Dav.*

Teſta ouata ventricoſa, ſpira coronata ſpinis fornicatis, apice papillari, columella quatriplicata.

α ſpinis fornicatis erectis.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 1.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 11. f. 4.

Rumph. amb. t. 31. f. B.

Petiv. amb. t. 7. f. 5.

Gualt. Teſt. t. 29. f. H.

Seb. Thes. III. t. 64. f. 4.

Knor. Vergn. II. 4. t. 1. f.

—— Del. nat. I. t. B. 6. f. 2.

Mart. Konch. Kab. III. 73. t. 778. 779. f.

β ſpinis fornicatis decumbentibus.

Rumph. amb. t. 31. f. A.

Petiv. amb. t. 3. f. 13.

F. V. 1. Die Mohrenkron.

Die eyförmige bäuchige Schale iſt an dem Schnirkel mit hohlen Stacheln, und einer warzenförmigen Spize verſehen, mit vier Falten an der Spindel.

α mit hohlen aufgerichteten Stacheln.

β mit darniederliegenden hohlen Stacheln.

Gualt. Teſt. t. 29. *f.* *J.*

Seb. Thes. *III.* t. 64. *f.* 2.

Müll. *Linn.* *Nat.* *Syſt.* *VI.* 1. *B.* 15. *t.* 1. *f.*

Mart. Konch. Kab. *III.* 75. *t.* 785. *f.*

ſpinis obſoletis. γ mit unvollkommenen Stacheln.

Knor. *Vergn.* *V.* 8. *t.* 1. *f.*

Mart. Konch. Kab. *III.* 72. *t.* 772. 773. *f.*

F. V. 2. Voluta Cymbium. F. V. 2. Die Gondel.

Linn. S. N. *Sp.* 436.

Belg. Jacobs-Kruck. *Angl.* Clouded Melon. *Gall.* Cuiller de Neptune. *Dan.*

Teſta ventricoſa, anfractibus canaliculatis, acute marginatis, apice papillari, columella quadriplicata.

Die bäuchige Schale hat rinnenartige ſcharfrandige Gewinde mit einer warzenartigen Spize, und vier Falten an der Spindel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 6.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 11. *f.* 6.

Gualt. Teſt. *t.* 29. *f.* B.

Adans. Seneg. Pl. 3. *f.* 2.

Seb.

Seb. Thes. III. t. 65. f. 5, 6; t. 66. f. 5.

Knor. Vergn. II. 30. t. 1. f.

—— —— V. 28. t. 1. f.

—— Delic nat. I. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. III. 70. t. 762. - 765. f.

F. V. 3. Voluta Olla. F. V. 3. Der Topf.

Linn. S. N. Sp. 437.

Belg. Teepel bak. *Valent*. *Angl*. The Melon Tun. *Da*. *Coſt*. *Gall*. Taſſe de Neptune, *Dav*.

Teſta ouata ventricoſa, ſpirae anfractibus canaliculato conuexis, columella bi-triplicata.

Die eyförmige bäuchige Schale hat gewölbte ausgekehlte Windungen, und zwo bis drey Falten an der Spindel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 2.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 11. f. 1.

Gualt. Teſt. t. 29. f. A.

Argenv. Conch. Pl. 17. f. G.

Adans. Seneg. Pl. 3. f. 1.

Klein. Meth. Oſtr. t. 5. f. 97.

Seb. Thes. III. t. 66. f. 18.

Knor. Vergn. V. 28. t. 7. f.

—— —— *VI. 22. t. 2. f.*

Mart. Konch. Konch *III. 71. t. 766. f.*

Da Coſt. Elem. Pl. 4. f. 9.

G. Buccinum. — G. Das Kinkhorn.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 323.

Teſta ſpiralis; apertura effuſa deſinens in canalem retuſum; labium explanatum.

Die ſchnirkelförmig gewundene Schale hat eine eingeſchnittene Mündung, die in eine kurze Rinne ausläuft; und eine ausgebreitete Schalenlefze.

G. I. Ampullaceæ, inflata. — G. I. Flaſchenartige, aufgeblaſene.

G. I. 1. Buccinum Galea — G. I. 1. Das Schellenhorn.

Linn. S. N. Sp. 439.

Belg. Geribde Belhoorn. *Gall.* Tonne cannelée *Dav.*

Teſta ſubrotunda inflata, ſulcis transuerſis, linea eleuata interſtinctis, labro edentulo.

Die rundliche aufgeblaſene Schale iſt mit Querfurchen beſezet, dazwiſchen mit einer erhabenen Linie umgürtet, und an der äußern Lippe ohne Zahn.

Gi-

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 183.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 13. *f.* 18.

Gualt. Teſt. t. 42. *f.* A.A.

Ginan. adr. II. t 12. *f.* 93.

Mart. Konch. Kab. III. 116. *t.* 1070. *f.*

G. I. 2. Buccinum Perdix.

G. I. 2. Das Rebhuhn.

Linn. S. N. Sp. 440.

Belg. Patrys-hoorn. *Angl.* Indian Partridge Shell. *Hill. Gall.* Le Perdix. *Argenv.*

Teſta ouata inflata, transuerſim ſulcata, albo maculata, labro edentulo.

Die eyförmige aufgeblaſene Schale iſt in die Quere gefurchet, mit weißlichen Flecken, und ungezähnter äußerer Lippe.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 191.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 15. *f.* 43.

Petiv. Gaz. t. 153. *f.* 13.

—— *amb.* t. 4. *f.* 11.

Rumph. amb. t. 27. *f.* C.

Gualt. Teſt. t. 51. *f.* F.

Argenv. Conch. *Pl.* 17. *f.* A.

Adans. Seneg. *Pl.* 7. *f.* 5.

Seb. Thes. III. t. 68. *f.* 12, 13, 16.

Hill. Hiſt. of. Anim. *Pl.* 8.

Knor. Vergn. III. 8. *t.* 1. *f.*

Mart. Konch. Kab. III. 117. *t.* 1078, 1079. *f.*

 G. I. 3.

G. I. 3. Buccinum Pomum.

Linn. S. N. Sp. 441.

G. I. 3. Die dicklippige Sturmhaube.

Belg. Diklipige Olyhoorn. *Rumph. Angl.* Thik lip'd Partridge. *Petiv. Gall.* Perdrix a groſſe levre. *Dav.*

Teſta ouata, inflata, transuerſe ſulcata, apertura dentata.

Die eyförmige aufgeblaſene Schale iſt in die Quere gefurchet, und an der Mündung ungezähnelt.

Albo fuluoque maculata, ſulcis concauis, ſpira breui.

Weiß- und rothbraun gefleckt, mit hohlen Furchen, und kurzem Schnirkel.

Rumph. amb. t. 27. f. B.
Petiv. amb. t. 12. f. 6.
Gualt. Teſt. t. 51. f. C.
Argenv. Conch. Pl. 17. f. L.
Seb. Thes. III. t. 70. f. 2 — 4.
Knor. Vergn. VI. 23. t. 2. f.
Mart. Konch. Kab. II. 36. t. 370. 371. f.

G. I. 4. Buccinum ſulcoſum.

G. I. 4. Die gefurchte Sturmhaube.

Teſta ouata, inflata, transuerſim ſulcata, labio explanato granuloſo.

Die eyförmige aufgeblaſene Schale iſt in die Quere gefurchet, und an der ausgebreiteten Spindelleſze mit Körnern beſezet.

Seb.

Seb. Thes. III. t. 68. f. 15. 17.

Ginan. adr. II. t. 5. f. 44.

Mart. Konch. Kab. III. 118. t. 1081. f.

Teſta ouata inflata ponderoſa, ſulcis numeroſis transuerſim cincta. Anfractus contingui Spira acuminata, reticulatim ſtriata. Labrum plicatum. Labium explanatum, punctis eleuatis ſcabrum. Baſis deſinens in canalem recuruum, aſcendentem. Color albidus, faſciis transuerſis rufis.

Die Schale iſt eyförmig, aufgeblaſen, und der Quere nach mit vielen Furchen umgürtet. Die Gewinde berühren einander. Der zugeſpizte Schnirkel iſt nezförmig geſtreiſet. Die Schalenlefze gefalten. Die Spindellefze ausgebreitet und mit erhabenen Körnern beſezet. Der Grund verliert ſich in eine krumme aufgerichtete Röhre. Von weißer Farbe, mit rothbraunen Querbändern.

G. I. 5. Buccinum Dolium.

G. I. 5. Das Faß.

Linn. S. N. Sp. 442.

Belg. Geplekte Belhoorn. *Angl.* Great ſpat rib'd Partridge. *Pet. Gall.* Tonne dentelée. *Dav.*

Teſta rotundata ventricoſa, cingulis eleuatis, ſulcisque remotis transuerſis, roſtro prominulo, labro dentato.

Die rundliche bäuchige Schale iſt mit erhabenen Gürteln, und breiten Furchen der Quere nach umgeben, mit einem hervorragenden Schnabel, und gezähnter Lefze verſehen.

Albida cingulis albo fuſcoque articulatis.

Weiß, mit weiß und braun unterbrochenen Gürteln.

 ſul-

α ſulcis obtuſis latis.	α mit ſtumpfen breiten Furchen.
β ſulcis linea eleuata interſtinctis.	β mit Furchen, die mit einer erhabenen Linie unterbrochen ſind.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 17, 25.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 13. *f.* 19.
Petiv. Gaz. *t.* 99. *f.* 11.
——— *amb. t.* 12. *f.* 5.
Rumph. amb. t. 27. *f. A.*
Gualt. Teſt. *t.* 39. *f.* E.
Argenv. Conch. *Pl.* 17. *f.* C.
Adans. Seneg. *Pl.* 7. *f.* 6.
Hill. Hiſt. of. *Anim. Pl.* 8.
Seb. Thes. III. t. 68. *f.* 9 *t.* 89. *f.* H, J, P.
Knor. Vergn. III. 8. *t.* 4. *f.*
Mart. Konch. Kab. *III.* 117. *t.* 1073. 1074. *f.*

G. II. Caſſidea, roſtro recuruo.	G. II. Sturmhauben, mit umgebogenen Schnabel.

G. II. 1. Buccinum echinophorum.	G. II. 1. Die Knotenſchelle.

Linn. S. N. Sp. 443.

Belg. Geknobbelte Belhoorn *Rumph. Angl.* Knot-liſted Kasket. *Petiv, Gall.* Casque tuberculé.

Teſta rotundata, cingulis tuberculatis, roſtro aſcendente.

Die rundliche Schale hat knotige Gürteln, und einen aufgerichteten Schnabel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 18. 19.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 15. f. 68.

Rumph. amb. t. 27. n. 1.

Petiv. amb. t. 7. f. 14.

Argenv. Conch. Pl. 17. f. P.

——— *Zoom.* Pl. 3. f. H.

Seb. Thes. III. t. 68. f. 18.

Ginan. adr. II. t. 5. f. 43.

Knor. Vergn. I. 17. t. 1. f.

Müll. Linn. Nat. Syſt. VI. 1. B. 16. t. 1. f.

Da Coſt. Elem. Pl. 4. f. 8.

Mart. Konch. Kab. II. 41. t. 407, 408. f.

G. II. 2. Buccinum cornutum.

G. II. 2. Die geſtrickte Sturmhaube.

Linn. S. N. Sp. 445.

Belg. Gebreide Stormhoed. *Rumph.* *Angl.* Knot liſted Kasket. *Petiv.* *Gall.* Casque tricoté. *Dav.*

Teſta turbinata reticulata, tuberculis ſpinoſis, apertura dentata.

Die verkehrt kegelförmige netzartig geſtrikte Schale hat knotige Stachelgürteln, und eine gezähnte Mündung.

 Bo-

Bonan. Recr. cl. 3. f. 155.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 15. f. 73.
Petiv. Gaz. t. 151. f. 9.
Rumph. amb. t. 23. f. A.
Gualt. Teſt. t. 40. f. D.
Seb. Thes. III. t. 73. f. 7, 8, 17, 18.
Knor. Vergn. III. 2. t. 1. f.
Mart. Konch. Kab. II. 33. t. 348. 349. f.

G. II. 3. Buccinum ruſum.

G. II. 3. Die rothe Sturmhaube.

Linn. S N. Sp. 446.

Belg. Roode Stormhoed. *Rumph.* *Angl.* Red Kasket-Skell. *Pet.* *Gall,* Le turban rouge. *Argenv.*

Teſta ouata ſtriata, cingulis nodoſis, ſtriis geminis interſtinctis; apertura dentata, cauda recurua.

Die eyförmige geſtreifte Schale hat knotige Gürteln, und dazwiſchen gepaarte Streifen, mit gezähnter Mündung, und gekrümten Schnabel.

Rumph. amb. t. 23. f. B.
Petiv. amb. t. 5. f. 5.
Gualt. Teſt. t. 40. f. F.
Seb. Thes. III. t. 73. f. 3, 6.

Regenſ. Samml. I. 12. *t.* 69. *f.*

Knor. Vergn. II. 9. *t.* 2. *f.*

Mart. Konch. Kab. III. 52. *t.* 341. *f.*

G. II. 4. Buccinum tuberoſum.

G. II. 4. Die Knotensturmhaube.

Linn. S. N. Sp. 447.

Belg. Volvvaſſe turkſche Papierkasket. *Angl.* The perſian Whelk. *Gall.* Caſque triangulaire. *Dav.*

Teſta ouata, albido fuſcoque varia, cingulis tribus tuberculatis, roſtro recuruo.

Die eyförmige, weiß- und braun gefleckte Schale hat drey knotige Reihen, und einen umgebogenen Schnabel.

Petiv. Gaz. *t.* 153. *f.* 1.

Gualt. Teſt.. *t.* 51.

Seb. Thes. III. *t.* 73. *f.* 11, 14.

Knor. Vergn. III. 10. *t.* 1, 2. *f.*

Mart. Konch. Kab. II. 34. *t.* 359, *f.* 38. *t.* 381. 382 *f.*

G. II. 5. Buccinum flammeum.

G. II. 5. Das attaliſche Kleid.

Linn. S. N. Sp. 448.

Belg. Geribd weſtindiſche Storrmhoedje. *Klein. Gall.* Drap d'argent *Ital.* Drappo d'argento. *Ron.*

Teſta ouata longitudinaliter plicata, cingulis aliquot tuberculatis, roſtro incuruato.

Die eyförmige nach der Länge gefaltene Schale hat einige Knotengürteln, und einen gekrümten Schnabel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *t.* 161.
Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 15. *f.* 72.
Rumph. amb. *t.* 23. *n.* 2.
Valent. Abh. *t.* 11. *f.* 99, 100.
Seb. Thes. *III.* *t.* 73. *f.* 19. 20.
Knor. *Vergn.* *IV.* 4. *t.* 1. *f.*
Mart. Konch. Kab. *II.* 34. *t.* 353, 354. *f.*

G. II. 6. Buccinum pullum.

G. II. 6. Die Papierhaube.

Belg. Turks - Papier zonder Lippen. *Angl.* Feather - Stamper. *Petiv.* *Gall.* Caſque plume. *Dav.*

Teſta ouata oblonga, cingulis transuerſim ſtriatis, labro edentulo, roſtro recuruo.

Die eyförmige längliche Schale hat geſtreifte Quergürteln, die äußere Lefze ohne Zahn, mit einem gekrümten Schnabel.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 15. *f.* 71.
Rumph amb. *t.* 23. *f.* C.

Petiv.

Petiv. amb. t. 10. *f.* 10.

Mart. Konch. Kab. *II.* 36. *t.* 373. 374. *f.*

Teſta ouata, laeuis glabra, longitudinaliter ſtriata. Cingula compoſita ſtriis latis profundis parallelis quinatis. Spira planiuſcula, transuerſe ſtriata, producta in mucronem centralem prominentem. Columella ſubtus umbilicata, & recuruata in roſtrum aſcendens. Labrum exterius nullum ſeu imperfectum. Color rufus, maculis diſperſis albis.

Die Schale iſt eyförmig, leicht und glatt, nach der Länge geſtreiſet. Die Quergürteln beſtehen aus fünf gleichweit laufenden vertieften Streifen. Der Schnirkel iſt etwas flach, in die Quere geſtreiſet, ihre Spize raget in der Mitte hervor. Die Spindel hat eine nabelförmige Vertiefung, mit einem gekrümten aufwärts gerichteten Rüſſel. Die äußere Lefze mangelt, oder iſt unvollkommen. Die Farbe iſt rothbraun mit zerſtreuten weißen Flecken.

G. II. 7. Buccinum Teſticulus.

G. II. 7. Die polniſche Müze.

Linn. S. N. Sp. 449.

Belg. Poolſche Muz. *Gall.* Bonnet de Pologne. *Dav.*

Teſta ouata, ſtriis eleuatis longitudinalibus, apertura dentata, roſtro recuruo.

Die eyförmige Schale iſt der Länge nach mit erhabenen Streifen, an der Mündung mit Zähnen beſezet, und mit einem gekrümten Schnabel verſehen.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 162.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 15. *f.* 66.

Pe-

Petiv. Gaz. t. 152. *f.* 17.

Rumph. amb. t. 23. *n.* 3.

Valent. Abh. t. 7. . 59.

Gualt. Teſt. t. 39. *f.* C.

Seb. Thes. III. *t.* 72. *f.* 17-20.

Knor. Vergn. III. 8. *n.* 2. *f.*

—— —— *IV.* 6. *t.* 1. *f.*

Mart. Konch. Kab. II. 37. *t.* 375, 376. *f.*

G. II. 8. Buccinum decuſſatum.

G. II. 8. Der Schuppen-Bezoar.

Linn. S. N. Sp. 450.

Belg. Geſchubde Bezoar. *Gall.* Caſque pavé. *Dav.*

Teſta ouata, decuſſatim ſtriata, teſſulis luteis maculata, apertura dentata, roſtro recuruo.

Die eyförmige kreuzweisgeſtreifte Schale iſt mit gelben Flecken bemalet, an der Mündung gezähnt, mit einem gekrümten Schnabel.

Bonan. Rear. cl. 3. *f.* 157.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 15. *f.* 65.

Gualt. Teſt. t. 40. *f. B.*

Knor. Vergn. II. 10. *t.* 3, 4. *f.*

Mart. Konch. Kab. II. 35. *t.* 360, 361. *f.*

G. II. 9. Buccinum Areola.

G. II. 9. Das Gartenbeetchen.

Linn. S. N. Sp. 451.

Belg. Gevlackte Bezoar. *Rumph.* *Angl.* Small Dice Kasket. *Petiv.* *Gall.* Caſque truité. *Argenv.*

Teſta ſubſtriata, teſſulis oblongis transuerſim maculata, apertura dentata, roſtro reeuruo.

Die einigermaßen geſtreifte, und mit länglichen Würfelflecken bemalte Schale iſt an der Mündung gezähnet, mit einem gekrümten Schnabel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 154.
Rumph. amb. t. 25. f. B.
Petiv. amb. t. 2. f. 11.
Gualt. Teſt. t. 39. f. H.
Argenv. Conch. Pl. 15. f. J.
Seb. Thes. III. t. 70. f. 7-9.
Knor. Vergn. III. 8. t. 5. f.
Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 355-356. f.
Da Coſt. Elem. Pl. 4. f. 10.

G. II. 10. Buccinum granulatum.

G. II. 10. Das gekörnte Beetchen.

Belg. Geſtreepte Beddetje. *Angl.* Gray Kasket. *Petiv.* *Gall.* Gros Caſque cannelé.

Teſta

Teſta ouata, transuerſim obſolete ſulcata, teſſulis luteis ſeriatim maculata, labio granulato, cauda recurua.

Die eyförmige einigermaßen in die Quere gefurchte Schale hat einige Reihen gelber Würfelflecken, die Schalenleſze iſt gezähnelt, die Spindelleſze gekörnet, der Schnabel gekrümmet.

Rumph. amb. t. 25. f. C.

Petiv. amb. t. 9. f. 6.

Gualt. Teſt. t. 39. f. B. t. 40. f. E.

Mart. Konch. Kab. II. 32. t. 344. 345. f.

Teſta ouata, transuerſim obſolete ſulcata, longitudinaliter tenuiter ſtriata. Spira conica, decuſſatim ſtriata. Apertura longa, utrinque dentata. Labrum exterius marginatum, extrorſum reflexum, intus dentatum, interius transuerſe plicatum, ſubtus expanſum, punctisque eleuatis ſeu granis adſperſum. Baſis deſinens in canalem roſtratum recuruum. Sutura lateralis prope columellam nulla. Color albus, maculis quadratis luteis ſecundum ſeries digeſtis.

Die Schale iſt eyförmig, der Länge nach mit matten Furchen, in die Quere mit zarten Streifen beſezet; Der kegelförmige Schnirkel iſt kreuzweiſe geſtreifet. Die Mündung länglicht, beiderſeits gezähnt. Die Schalenleſze geſäumt, und auswärts überſchlagen, von innen gezähnt. Die Spindelleſze in die Quere gefalten, unten ausgebreitet, und mit erhabenen Punkten, oder Körnern beſezet. Der Grund endet ſich in eine ſchnabelförmige, gekrümmte Rinne. An der Seite der inneren Leſze ſtehet der Länge nach keine Nath. Die Farbe iſt weiß mit gelben reihenweiſe geſezten Würfelflecken.

G. III. Caſſidea, labro muricato. G. III, Helmförmige, mit gezackter Schalenlefze.

G. III. 1. Buccinum Erinaceus.
Linn. S. N. Sp. 452.

G. III. 1. Das gefaltene Säumchen.

Belg. Geſtreepte Zoomtje *Rumph. Angl.* Small curld Casket. *Pet.*

Teſta ouata, longitudinaliter ſubplicata, papillis coronata, labro poſtice muricato.

Die eyförmige längliche einigermaſſen gefaltene Schale iſt mit Knoten gekrönet, und an der Schalenlefze gezakt.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 15. *f.* 73.
Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 152.
Rumph. amb. *t.* 25. *f.* D. 6, 7.
Petiv. amb. *t.* 9. *f.* 9.
Gualt. Teſt. *t.* 39. *f.* D, J.
Argenv. Conch. *Pl.* 14. *f.* G.
Seb. Thes. *III.* *t.* 53. *f.* 11, 16.
Knor. *Vergn.* *VI.* 11. *t.* 3. *f.*
Mart. Konch. Kab. *II.* 35. *t.* 363. *f.*

G. III. 2. Buccinum glaucum.
Linn. S. N. Sp. 453.

G. III. 2. Der graue Bezoar.

Belg. Graeuwe Kasket. *Rumph.* *Angl.* Smooth gray Casket. *Petiv.* *Gall.* Casque Bezoard. *Dav.*

Teſta ouata laeui, papillis coronata, labro poſtice muricato.

Die eyförmige glatte Schale iſt mit Knoten gekrönet, und hinten an der Schalenleſze gezackt.

Rumph. amb. t. 25. f. A.

Petiv. amb. t. 7. f. 4. t. 11. f. 18.

Gualt. Teſt. t. 40. f. A.

Seb. Thes. III. t. 71. f. 11 - 16.

Knor. Vergn. III. 8. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. II. 32. t. 342. 343. f.

G. III. 3. Buccinum Vibex.

G. III. 3. Der glatte Bezoar.

Linn. S. N. Sp. 454.

Belg. Gladde Zoomtje. *Rumph.* *Angl.* Smooth - lip'd Casket. *Pet.*

Teſta ouata, laeuiſſima, labro poſtice muricato.

Die eyförmige ganz glatte Schale iſt hinten an der Schalenleſze gezackt.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 151.

Rumph. amb. t. 25. f. E.

Petiv. amb. t. 4. f. 9.

Gualt. Teſt. t. 39. f. F. L.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. H.

Seb. Thes. III. t. 53. f. 5-7, 10, 17.

Regenſ. Samml. I. 10. t. 40. f.

Mart. Konch. Kab. II. 35. t. 364, 365. f.

G. III. 4. Buccinum papilloſum.

G. III. 4. Das körnige Kinkhorn.

Linn. S. N. Sp. 455.

Belg. Ryſtenbry Hoorentje.

Teſta ouata oblonga, undique tuberculata, labro poſtice muricato.

Die eyförmige längliche Schale iſt allenthalben mit erhöhten Körnern, und hinten an der Schalenlefze mit Zacken beſezet.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 15. f. 23.

Rumph. amb. t. 29. f. M.

Gualt. Teſt. t. 44. f. G.

Argenv. Conch. Pl. 9. f. J.

Seb. Thes. III. t. 49. f. 57, 58, 59.

Knor. Vergn. II. 27. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 125. t. 1204. 1205. f.

G. III. 5. Buccinum Glans.

G. III. 5. Das linirte Kinkhorn.

Linn. S. N. Sp. 456.

Belg. Modervlakje.

Teſta ouata oblonga laeui, ſpirae apice longitudinaliter ſulcato, labro poſtice muricato.

Die eyförmige längliche Schale iſt glatt, an der Spize, der Länge nach gefurchet, und hinten an der Schalenleſze mit Zacken beſezet.

Rumph. amb. t. 29. *f.* P.
Seb. Thes. III. t. 39. *f.* 60.
Knor. Vergn. III. 5. *t.* 5. *f.*
Mart. Konch. *Kab. IV.* 125. *t.* 1196 - 1198. *f.*

G. IV. Calloſa ad columellam reflexam.

G. IV. Mit umgeſchlagener ſchwieliger Spindel.

G. IV. 1. Buccinum Arcularia.

G. IV. 1. Das weiße Koferhörnchen.

Linn. S. N. Sp. 457.

Belg. Koffer Hoorntje. *Gall.* Arculaire blanc. *Angl.* Small koffer Shell.

Teſta ouata, tranſuerſim ſtriata, plicis longitudinalibus, papillisque coronata, labio explanato, calloſo.

Die eyförmige, in die Quere geſtreifte Schale, iſt der Länge nach mit Falten und Knoten beſezet, mit einer ausgebreiteten ſchwieligen Spindel.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 15. ſ. 24.
Rumph. amb. t. 27. f. M.
Petiv amb. t. 12. f. 9.
Gualt. Teſt. t. 44. f. R. O.
Argenv. Conch. Pl. 14. f. C.
Seb. Thes. III. t. 53. f. 32. 33.
Knor. Vergn. VI. 22. t. 3. f.
Mart. Konch. Kab. IV. 125. t. 1174. 1175. f.

G. IV. 2. Buccinum mutabile.

G. IV. 2. Die Afterſturmhaube.

Linn. S. N. Sp. 460.

Teſta ouata oblonga, ſpira acuminata, labio explanato.

Die eyförmige längliche Schale hat einen zugeſpizten Schnirkel, und eine ausgebreitete Spindel.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 15. f. 30.
Gualt. Teſt. t. 44. f. B.
Mus. Caes. Vindobon.

G. IV. 3. Buccinum neritoideum.

G. IV. 3. Die Doſenſchnecke.

Teſta

Teſta orbiculata laeui, ſubtus planiuſcula, labio explanato gibbo.

Die Schale iſt ſcheibenrund und glatt, unten einigermaßen flach, und an der Lippe ausgebreitet, und erhaben.

Gualt. Teſt. t. 65. f. J.

Mus. Caes. Vindobon.

G. V. Columella, quaſi abraſa, plana.

G. V. Mit gleichſam abgeſchabener flacher Spindel.

G. V. 1. Buccinum Harpa.

Linn. S. N. Sp. 462.

G. V. 1. Die Harfe.

Belg. Davids Harp. *Angl.* The Harp Shell. *Hill. Gall.* La Harpe. *Argenv.*

Teſta coſtis longitudinalibus carinatis antice mucronatis, columella plana laeui.

Die Schale iſt nach der Länge mit ſcharfen, vorne ſpizigen Ribben beſezet, und an der Lippe flach.

α coſtis complanatis, latis.

α mit plattgedrükten breiten Ribben.

Bonan. Recr. cl. 3. *f.* 185.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 15. *f.* 55.

Rumph. amb. t. 32. *f.* K. L.

Petiv. amb. t. 2. *f.* 2. *t.* 7. *f.* 8.

Gualt. Teſt. t. 29. *f.* C, E, G.

Argenv. Conch. Pl. 14. *f.* D.

Seb.

Seb. Thes. III. t. 70. f. 10.

Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.

Regenſ. Samml. I. 2. t. 14. f.

Murr. Fund. Teſt. t. 1. f. 14.

Knor. Vergn. I. 9. t. 3. f.

——— ——— II. 8. t. 2. f; 19. t. 1, 2. f.

Mart. Konch. Kab. III. 119. t. 1090. 1091. 109'. f.

β coſtis carinatis anguſtioribus.

β mit ſcharfen ſchmälern Ribben.

Mus. Caes. Vindobon.

G. V. 2. Buccinum perſicum.

G. V. 2. Die Rudolphsſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 464.

Belg. Wydmonder. *Angl.* The Perſian-Shell. *Hill. Gall.* Conque perſique.

Teſta ouata laeui, anfractibus tuberculatis, labro crenato, columella complanata.

Die eyförmige glatte Schale iſt an den Gewinden knotig, an der Lefze geferbet, mit einer plattgedrückten Spindel.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 15. f. 46. 47.

Rumph. amb. t. 27. f. E.

Petiv.

Gualt. Teſt. t. 51. f. H. L.

Argenv. Conch. Pl. 17. f. E.

Seb. Thes. III. t. 72. f. 12 — 16.

Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.

Knor. Vergn. III. 2. t. 5. f.

Mart. Konch. Kab. III. 69. t. 760. f.

G. V. 3. Buccinum Haemaſtoma.

G. V. 3. Der Rothmund.

Linn. S. N. Sp. 566.

Teſta ouata nodoſa, labro intus ſtriato, fauce fulua.

Die eyförmige knotige Schale iſt an der Schalenlefze inwendig geſtreifet, und im Schlunde rothgelb.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 15. f. 48.

Gualt. Teſt. t. 51. f. A.

Knor. Vergn. IV. 5. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. III. 101. t. 965. f.

G. V. 4. Buccinum Lapillus.

G. V. 4. Das Steinchen.

Linn.

Linn. S. N. Sp. 467.

Teſta ouata transuerſim ſtriata, ſpira tuberculata, columella plana.

Die eyförmige Schale iſt der Quere nach geſtreifet, an den Gewinden knotig, mit einer flachen Spindel.

Reaumur Mem. de Paris 1711. *Pl.* 6. *f.* 45.
Liſt. angl. t. 3. *f.* 5. 6.
Adans. Seneg. Pl. 7. *f.* 4.
Müll. Linn. Nat. Syſt. VI. 1. *B.* 16. *t.* 2. *f.*
Mart. Konch. Kab. *III.* 121. *t.* 1111. 1112. *f.*

G. V. 5. Buccinum Smaragdulus.

G. V. 5. Die Smaragdſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 468.

Gall. l'Emeraude. *Argenv.*

Teſta ouata, glaberrima, columella complanata, plicata.

Die eyförmige ganz glatte Schale hat eine plattgedrückte gefaltene Spindel.

Alba, lineis transuerſis parallelis fuſcis.

Weiß, mit gleichweitſtehenden braunen Querſtrichen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 15. *f.* 45.
Argenv. Conch. Pl. 6. *f. P.*

 Seb.

Seb. Thes. III. *t.* 54. *f.* 14 — 16.

Knor. Vergn. III. 14. *t.* 5. *f.*

Mart. Konch. Kab. III. 120. *t.* 1104. 1105. *f.*

G. VI. Glabra. G. VI. Glatte Kinkhörner.

G. VI. 1. Buccinum ſpiratum. G. VI. 1. Die Treppe.

Linn. S. N. Sp. 469.

Belg. Gevoord Bultje. *Angl.* Cloudy Dice-Shell. *Pet. Gall.* La tour de Coppenhague.

Teſta ouata oblonga laeui, anfractibus canali plano diſtincetis, columella abrupta, perforata.

Die eyförmige längliche glatte Schale hat flach ausgekehlte Näthe, und eine abgeſtuzte durchbohrte Spindel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 70. 370.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 15. *f.* 41.

Rumph. amb. 49. *f.* C. D.

Petiv. amb. *t.* 9. *f.* 21.

Gualt. Teſt. *t.* 51. *f.* B.

Argenv. Conch. *Pl.* 17. *f.* N.

Seb. Thes. III. *t.* 73. *f.* 23 — 26.

Regenſ. Samml. I. 10. *t.* 41. *f.*

Knor.

Knor. Vergn. II. 6. t. 5. f.
—— —— III. 3. t. 4. f.
Mart. Konch. Kab. *IV.* 122. t. 1118—1121. f.
Da Coſt. Elem. Pl. 4. f. 6.

G. VI. 2. Buccinum glabratum.

G. VI. 2. Der Kanarienvogel.

Linn. S. N. Sp. 470.

Belg. Gladde Knipers - boor.

Teſta ouato oblonga glaberrima, ſuturis obſoletis, baſi ventricoſa transuerſim ſulcata.

Die eyförmige längliche ganz glatte Schale hat undeutliche Näthe, und einen bäuchigen nach der Quere gefurchten Boden.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 149.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 15. f. 29.
Gualt. Teſt. t. 43. f. T.
Argenv. Conch. Pl. 9. f. G. prior.
Klein. Meth. Oſtrac. t. 2. f. 47.
Knor. Vergn. II. 16. t. 4, 5. f.
Mart. Konch. Kab. *IV.* 122. t. 1117. f.

G. VI. 3. Buccinum ſulcatum.

G. VI. 3. Das gefurchte Kinkhorn.

Teſta

Teſta ouata transuerſim ſulcata, anfractibus contiguis, labro crenulato, intus ſtriato.

Die eyförmige, in die Quere gefurchte Schale, hat aneinander verwachſene Gewinde, und eine gekerbte inwendig geſtreiſte Schalenlefze.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 15. f. 31.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ouata. Anfractus ſex, transuerſim ſulcati, ſuturis contiguis. Apertura congenerum. Labrum crenulatum. Faux ſtriata. Labium replicatum, complanatum. Baſis eſuſa abreuiata. Color fuſcus, maculis diſperſis, niueis.

Die eyförmige Schale, hat ſechs in die Quere gefurchte Windungen, deren Näthe an einander verwachſen ſind. Die Mündung iſt wie bei den Nebenarten. Die Schalenlefze fein gekerbet. Der Schlund geſtreiſet. Die Spindellefze iſt übergeſchlagen, und ausgebreitet. Der Grund ausgeſchnitten, und verkürzet. Von brauner Farbe, mit zerſtreuten ſchneeweißen Flecken.

G. VII. Angulata.

G. VII, Eckige Kinkhörner.

G. VII. 1. Buccinum undoſum.

C. VII. 1. Das Eckhorn.

Linn. S *N.* *Sp.* 472.

Belg. Boerenjonge. *Angl.* Small rough Whelke. *Petiv.*

Teſta ouato oblonga transuerſim ſulcata, obtuſe quinquangulari, labro intus ſtriato.

Die eyförmige längliche, in die Quere gefurchte Schale hat fünf ſtumpfe Ecken, und eine inwendig geſtreiſte Schalenlefze.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 14. *f.* 33. 36.

Rumph. amb. t. 29. *f.* O.

Petiv. amb. t. 13. *f.* 4.

Argenv. Conch. *Pl.* 9. *f.* N.

Klein. Meth. Oſtr. *t.* 3. *f.* 61.

Seb. Thes. *III, t.* 52. *f.* 26.

Knor. Vergn. II. 14. *t.* 4, 5. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 122. *t.* 1126. 1127. *f.*

G. VII. 2. Buccinum Bezoar.

G. VII. 2. Die Muskatennuß.

Linn. S. N. Sp. 473.

Belg. Getackte Noote - Moskaat. *Gall.* Moskat.

Teſta ouata, decuſſatim rugoſa, ſpinis transuerſis concauis, anfractibus infimis lamellatis, columella perforata.

Die eyförmige Schale iſt kreuzweiſe gerunzelt, mit hohlen Stacheln der Quere nach, und mit Blättern an den unterſten Gewinden beſezet, ſammt einer durchbohrten Spindel.

Argenv. Conch. *Pl.* 15. *f.* G.

Knor. Vergn. VI. 24. *t.* 2. *f.*

Mart. Konch. Kab. *II.* 40. *t.* 398. 399. *f.*

G. VII. 3. Buccinum undatum.

G. VII. 3. Das Wellenhorn.

Linn. S. N. Sp. 475.

Belg. Wulk. *Angl.* The Whelke.

Teſta ouata, transuerſim ſtriata, anfractibus curuato multangulis.

Die eyförmige in die Quere geſtreiſte Schale hat runzelichte vieleckige Gewinde.

α dextrorſa.

α rechtsgewunden.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 189.
Liſt. angl. t. 3. f. 2.
—— Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 14. f. 14.
Seb. Thes. III. t. 39. f. 78—80.
Knor. Vergn. IV. 19. t. 1. f.
Müll. Linn. N. S. VI. 1. B. 16. t. 3. 4. f.

β ſiniſtrorſa.

β linksgewunden.

Mus. Caes. Vindobon.

G. VII. 4. Buccinum reticulatum.

G. VII. 4. Das Gitterhorn.

Linn. S. N. Sp. 476.

Angl. Small latticed Whelk. *Pet.*

Teſta

Teſta ouato oblonga, transverſim ſtriata, longitudinaliter rugoſa, apertura dentata.

Die eyförmige längliche in die Quere geſtreifte Schale iſt der Länge nach mit Runzeln, und an der Mündung mit Zähnen verſehen.

Reaumur Mem. de Paris. 1711. *Pl.* 6. *f.* 9.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 14. *f.* 21.

Petiv. Gaz. *t.* 64. *f.* 8; *t.* 75. *f.* 4.

Mus. Caes. Vindobon.

G. VII. 5. Buccinum clathratum.

G. VII. 5. Das Nezhorn.

Teſta ouata, longitudinaliter plicata, ſtriis eleuatis transuerſis decuſſata; roſtro recuruo.

Die eyförmige Schale iſt mit nach der Länge laufenden Falten, und erhabenen Querſtreifen durchkreuzet, mit einem gekrümmten Schnabel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 62.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ouata ventricoſa, reticulata rugis longitudinalibus ſtrias eleuatas transuerſas decuſſantibus. Puncta decuſſationum nodoſa. Spira acuminata porrecta. Labrum crenatum, intus ſulcatum. Labium

Die Schale iſt eyförmig bäuchig, und nezartig, mit nach der Länge laufenden Runzeln, welche durch erhabene Querfalten durchkreuzet werden. Die Durchkreuzungspunkte ſind knotig. Der zugeſpizte Schnir

replicatum tenue. Baſis deſinens in canalem, breuem recuruum. Color glaucus.

kel raget hervor. Die Schalenlefze iſt gekerbet, und inwendig gefurchet. Die innere Lefze iſt übergeſchlagen, und dünn. Der Grund endiget ſich in einen kurzen gekrümmten Schnabel. Von lichtgrauer Farbe.

G. VIII. Turrita, laeuia, ſubulata.

G. VIII. Gethürmte, glatte, ahlförmige Kinkhörner.

G. VIII. 1. Buccinum maculatum.

G. VIII. 1. Die Striknadel.

Belg. Malpriem. *Angl.* Tygers-tooth. *Petiv.* *Gall.* Le Cloud. *Argenv.*

Teſta turrita ſubfuſiformi, anfractibus laeuibus indiuiſis integerrimis.

Die gethürmte einigermaßen ſpindelartige Schale hat glatte ungetheilte, und ganzrandige Gewinde.

Pallida, maculis latis purpuraſcentibus.

Blaß, mit breiten purpurrothen breiten Flecken.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 317.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 11. *f.* 74.

Rumph. *amb.* *t.* 30. *f.* *A.* D.

Petiv. *amb.* *t.* 5. *f.* 4.

Gualt. *Teſt.* *t.* 56. *f.* *J.*

Argenv. Conch. *Pl.* 11. *f.* *A.*

Seb. *Thes.* *III.* *t.* 56. *f.* 6.

Knor. *Vergn.* *III.* 23. *t.* 2. *f.*

—— —— *VI.* 19. *t.* 6. *f.*

Mart. Konch. *Kab.* *IV.* 153. *t.* 1440. *f.*

G. VIII.

G. VIII. 2. Buccinum ſubulatum.

Linn. S. N. Sp. 480.

G. VIII. 2. Die Tigernadel.

Belg. Dunne Tygerpen. *Angl.* Brown Tygers horn. *Petiv. Gall.* Vis tigrée. *Dav.*

Teſta turrita ſubulata, anfractibus laeuibus, indiuiſis, ſerie duplici macularum ferruginearum pictis.

Die gethürmte ſpindelförmige Schale hat glatte ungetheilte Gewinde, die mit einer dreyfachen Reihe roſtfarbiger Flecken bemalet ſind.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 118.
Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 11. *f.* 70.
Rumph. *amb.* 30. *t.* *B.*
Petiv. *amb.* *t.* 4. *f.* 2.
Gualt. *Teſt.* *t.* 56. *f.* *B.*
Argenv. Conch. *Pl.* 11. *f.* X.
Seb. *Thes.* *III.* *t.* 56. *f.* 28.

G. VIII. 3. Buccinum candidum.

G. VIII. 3. Die weiße Nadel.

Teſta turrita ſubulata laeui; anfractibus integerrimis, prope ſuturam incraſſatis.

Die gethürmte ahlförmige glatte Schale hat ungetheilte ganzrandige Gewinde, die bei der Nath ſich verdicken.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſubulata laeuis. Anfractus circiter viginti, indiuiſi, integerrimi; ſupra prope ſuturam incraſſati; ſupremi linea transuerſa bifariam partiti, & juxta ſuturam crenulati. Apertura, & baſis congenerum. Color niueus.

Die ahlförmige Schale iſt glatt. Die Gewinde, deren beiläufig zwanzig ſind, nahe an der Nath. Die oberſten ſind durch eine neue Querlinie in zwey Theile getheilet, und an der Nath gekerbet. Die Mündung und der Grund ſind wie an den Nebenarten beſchaſen. Die Farbe ſchneeweiß.

G. VIII. 4. Buccinum ferrugineum.

G. VIII. 4. Die roſtfarbige Nadel.

Teſta turrita ſubulata ferruginea, anfractibus laeuibus, bipartitis, integerrimis.

Die gethürmte ahlförmige roſtfarbige Schale iſt glatt, zweytheilig und ganzrandig.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 11. *f.* 71.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſubulata, laeuis. Anfractus circiter ſexdecim integerrimi, linea exarata transuerſa bifariam diuiſi. Apertura & baſis congenerum. Color ferrugineus, maculis obſoletis albis.

Die Schale iſt ahlförmig, und glatt. Die Gewinde bäuchig, ganzrandig, und zweytheilig; ſechszehn an der Zahl. Die Mündung und der Grund nach Art der Anverwandten. Von eiſenroſtiger Farbe, mit matten weißen Flecken.

G. VIII. 5. Buccinum crenulatum.

Linn S. N. Sp. 481.

G. VIII. 5. Die gekrönte Nadel.

Belg. Gekartelde Pen. *Rumph. Angl.* Tooth'd Bodkin. *Pet.*

Teſta

Teſta turrita, anfractibus bipartitis, margine ſuperiore crenatis.

Die gethürmte Schale hat zweytheilige am Oberrande gekerbte Windungen.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 11. *f.* 75.

Rumph. amb. *t.* 30. *f.* E.

Petiv. amb. *t.* 8. *f.* 13.

Gualt. Teſt. *t.* 57. *f.* L.

Argenv. Conch. *Pl.* 11. *f.* Y.

Seb. Thes. III. *t.* 56. *f.* 9. 35.

Knor. *Vergn.* I. 8. *t.* 7. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 153. *t.* 1442. *f.*

G. VIII. 6. Buccinum vittatum.

G. VIII. 6. Die gekerbte Nadel.

Linn. *S. N. Sp.* 483.

Teſta ventricoſo turrita, transuerſim ſtriata, ſutura anfractuum duplicato crenulata.

Die bäuchig gethürmte Schale iſt in die Quere geſtreifet, und an der Nath zweyfach gekerbet.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 15. *f.* 34.

Klein. Meth. Oſtr. *t.* 7. *f.* 121.

Mart. Konch. Konch *IV.* 155. *t.* 1461. *f.*

G. VIII. 7. Buccinum ſtrigilatum.

G. VIII. 7. Die geſtriegelte Nadel.

Linn. S. N. Sp. 484.

Belg. Naalde - Pen. *Gall.* Le Foret. *Dav.*

Teſta ſubulata longitudinaliter ſtriata, anfractibus indiuiſis, cingulo ſuturali niueo rufo maculato.

Die ahlförmige Schale hat ungetheilte nach der Länge geſtreifte Gewinde, die an der Nath mit einem ſchneeweißen rothbraun geſleckten Bande umgeben ſind.

Rumph. amb. t. 30. *f. H.*

Gualt. Teſt. t. 57. *f.* O.

Argenv. Conch. *Pl.* 11. *f.* R.

Mus. Caes. Vindobon.

G. VIII. 8. Buccinum duplicatum.

G. VIII. 8. Die Nähenadel.

Linn. S. *N. Sp.* 485.

Gall. La Vis de preſſoir. *Dav.*

Teſta ſubulata anfractibus bipartitis, ſtriatis.

Die ahlförmige Schale hat zweytheilige, geſtreifte Windungen.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 110.

Gualt. Teſt.. t. 57. *f. N.*

Knor.

Knor. Vergn. VI. 18. *t.* 6. *f.* 24. *t.* 5. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 155. *t.* 1455. *f.*

G. VIII. 9. Buccinum lanceolatum.

G. VIII. 9. Die Lanzennadel.

Linn. S. *N.* Sp. 486.

Belg. Piekenier. *Angl.* Furrow - Pen. *Pet. Gall.* L'alène. *Dav.*

Teſta ſubulata laeui, anfractibus integris, lineis longitudinalibus fuluis.

Die ahlförmige glatte Schale hat ungetheilte Gewinde, die mit rothgelben Streifen nach der Länge herab bezeichnet ſind.

Rumph. amb. *t.* 30. *f.* G.

Petiv. Gaz. *t.* 13. *f.* 20.

Argenv. Conch. *Pl.* 11.. *f.* Z.

Knor. Vergn. VI. 24. *t.* 4. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 154. *t.* 1450. *f.*

G. VIII. 10. Buccinum dimidiatum.

G. VIII. 10. Die umwundene Nadel.

Linn. S. N. Sp. 487.

Belg. Omwonden P n.

Teſta ſubulata laeui, anfractibus bipartitis integerrimis.

Die ahlförmige glatte Schale hat zweytheilige ganzrandige Gewinde.

α macularum croceárum ſerie transuerſa triplici picta.

α mit dreyfacher Reihe ſafranfarbigen Flecken in die Quere bemalet.

Seb. Thes. III. t. 56. *f.* 16, 23, 24, 27.

Knor. Verg. I. 23. *t.* 4. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 154. *t.* 1443. *f.*;

β luteſcens, maculis longitudinalibus niueis, anfractuum margine ſuperiore compreſſo attenuato.

β gelblich, mit länglichen ſchneeweißen Flecken, und plattgedrückten verdünntem Oberrande an den Gewinden.

Rumph. amb. t. 30. *f.* C.

Gualt. Teſt. t. 51. *f.* M.

Seb. Thes. III. t. 56. *f.* 15. 19.

Knor. Vergn. I. 23. *t.* 5. *f.*

—— —— *VI.* 18. *t.* 5. *f.*

G. VIII. 11. Buccinum cinereum.

G. VIII. 11. Die aſchengraue Nadel.

Teſta ſubulata; anfractibus indiuiſis; prope ſuturam longitudinaliter ſtriatis.

Die ahlförmige Schale hat ungetheilte, und an der Nath nach der Länge geſtreifte Gewinde.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta

Teſta ſubulata glabra. Anfractus quatuordecim indiuiſi, integerrimi, margine ſuperiore longitudinaliter ſtriati. Columella complanata. Apertura, & baſis congenerum. Color cinereus; faſcia tranſuerſa prope ſuturam nigricante obſoleta.

Die Schale iſt ahlförmig und glatt. Die vierzehn Gewinde ſind eingetheilt, ganz glatt, und nur an der Nath der Länge nach geſtreifet. Die Spindel flach gedrückt. Die Mündung und der Grund wie an den Nebenarten dieſes Geſchlechtes. Von aſchengrauer Farbe, mit einer undeutlichen ſchwärzlichen Querbinde unweit der Nath.

G. VIII. 12. Buccinum pertuſum.

G. VIII. 12. Die durchſtochene Nadel.

Teſta ſubulata; anfractibus bipartitis, ſtriis longitudinalibus eleuatis, & transuerſis excauato punctatis.

Die ahlförmige Schale hat zweytheilige Gewinde, die nach der Länge herab erhabene Streifen, und in die Quere vertiefte Punkten haben.

Mart. Konch. Kab. *IV*. 155. *t*. 1457. *f*.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſubulata. Anfractus circiter viginti ſtriati, ſtriis longitudinalibus eleuatis, punctiſque excauatis per ſeriem tranſuerſam digeſtis. Apertura & baſis congenerum. Color croceus aut albus, maculis diſperſis fuluis.

Die Schale iſt ahlförmig. Die Gewinde, derer ungefehr zwanzig ſind, haben der Länge nach erhabene Streifen, und in die Quere eine dreyfache Reihe ausgehöhlter Punkten. Die Mündung, und der Grund iſt wie an den andern Nadeln dieſes Geſchlechtes. Von ſafrangelber, oder weißer Farbe mit zerſtreuten rothgelben Flecken.

G. VIII. 13. Buccinum ſinuatum.

Teſta turrita anfractibus longitudinaliter plicatis, prope ſuturam attenuatis, labro poſtice ſinuato.

G. VIII. 13. Die Faltennadel.

Die gethürmte nach der Länge gefaltene Nadel hat an der Nath zuſammengedrückte Gewinde, und eine hinten ausgeſchnittene Schalenlefze.

Mart. Konch. Kab. IV. 155 t. 1464. 1465. f.

Teſta turrita. Anfractus circiter nouem, londitudinaliter plicati, prope ſuturam complanati. Labrum replicatum, poſtice ſinu breui exciſum. Columella replicata. Apertura, & baſis congenerum. Color luteſcens, epidermide decidua nigra.

Die Schale iſt gethürmt. Die Gewinde, deren ungefehr neun ſind, der Länge nach gefalten, nächſt der Nath platt gedrückt. Die Schalenlefze iſt erweitert, und hinten mit einem kurzen Einſchnitte verſehen. Die Spindel iſt übergeſchlagen. Die Mündung, und der Grund, wie an andern Spindeln dieſes Geſchlechtes. Von gelblicher Farbe mit ſchwarzer abfallender Oberhaut.

H. Strombus.

Teſta ſpiralis; apertura dilatata, labro ampliato.

H. Die Flügelſchnecke.

Die ſchnirkelförmige Schale hat eine erweiterte Mündung, und ausgebreitete Schalenlefze.

H. I.

H. I. Digitati, labro in lacinias tenues exeunte.

H. I. Gezackte, deren Schalenleſze mit ſchmalen Zacken verſehen ſind.

H. I. 1. Strombus Fuſus.

H. I. 1. Die Sternnadel.

Linn. S. N. Sp. 489.

Belg. Dikke Starre-Pen. *Gall.* Fuſeau etoilé.

Teſta turrita laeui, roſtro ſubulato, labro dentato.

Die gethürmte glatte Schale hat einen ahlförmigen Schnabel mit einer gezackten Schalenleſze.

α teſta craſſa luteſcens; apice longitudinaliter ſtriato, labio incraſſato.

α dickſchalig gelblich braun, an der Spize nach der Länge geſtreift, mit verdickter Spindelleſze.

Bonan. Recr. cl. 3. t. 121.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 12. *f.* 11, 18.

Argenv. Conch. *Pl.* 10. *f.* *D.*

Klein. *Hiſt.* Conch. *t.* 4. *f.* 87.

Seb. Thes. *III.* t. 56. *f.* 1. 2.

Knor. *Vergn.* *V.* 6. *t.* 1. *f.* 7. *t.* 2. *f.*

Chemniz *Naturforſcher* *IX.* 6. *t.* 1, 2. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 158. *t.* 1495. 1496. *f.*

β attenuata alba, apice reticulatim ſtriato, roſtro elongato.

β Schmal, weiß, an der Spize gitterförmig geſtreifet, mit einem verlängerten Schnabel.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 14. *f.* 9.

Argenv. Conch. Pl. 10. *f. A.*

Seb. Theſ. III. t. 56. *f.* 3.

Mart. Konch. Kab. IV. 159. *t.* 1500. 1502. *f.*

An prioris varietas pulla? Etwan eine unvollkommene Abänderung der vorigen?

H. I. 2. Strombus Pes pelicani.

H. I. 2. Der Vogelfuß.

Linn. S. N. Sp. 490.

Belg. Pelikaans-Poot. *Angl.* Blobber-lipt. *Petiv. Gall.* Patte d'oie. *Dav. Ital.* Turbine pendatilo. *Gin.*

Teſta labro tetradactylo, ſpirarum marginibus nodoſis; fauce laevi.

Die Schale hat eine vierzackige Schalenlefze, mit knotigen Randen an den Gewinden, und glattem Schlunde.

Bonan. Recr. cl. 3. *f.* 85. 87.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 12. *f.* 20.

Petiv. Gaz. t. 79. *f.* 6; *t.* 127. *f.* 11.

Gualt. Teſt. t. 53. *f. A, B, C.*

Argenv. Conch. Pl. 14. *f. M.*

Klein. Meth. Oſtr. t. 2. *f.* 41. 42.

Ginan.

Ginan. adr. t 7. f. 58. 60.
Seb. *Thes.* *III.* t. 62. f. 17.
Knor. *Vergn.* *III.* 7. t. 4. f.
Murr. Fund. *Teſt.* t. 1. f. 21.
Mart. Konch. Kab. *III.* 83. t. 848 - 850. f.

H. I. 3. Strombus Chiragra.

H. I. 3. Die Bootshacke.

Linn. S. *N.* *Sp.* 491.

Belg. Wufje - Bootſchaak. *Angl.* Female Devil's Claw. *Petiv.* *Gall.* Araignée femelle *Dav.*

Teſta labro hexadactylo, digitis curuis, roſtro recuruato, labio ſtriato.

Die Schale hat an der Schalefze ſechs krumme Zacken, einen gekrümmten Rüſſel, mit einer geſtreiften Spindelleſze.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 314.
Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 12. *f.* 24.
Rumph. *amb.* t. 35. f. *A.* *B.*
Petiv. *amb.* t. 14. f. 3.
Gualt. *Teſt.* t. 35. f. *A.*
Seb. *Thes.* *III.* t. 82. f. 1, 6, 7, 9, 10.
Knor. *Vergn.* *I.* 27. t. 1. f.
—— *Delic.* *nat.* *I.* t. B. *II.* f. 1.

Mart.

Mart. Konch. Kab. *III.* 85. *t.* 851. 852. *f.*

——— ——— ——— 87. *t.* 856. 857. *f.*

H. I. 4. Strombus Scorpio.

H. I. 4. Die Podagraſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 492.

Belg. Podagra kreeft. *Valent.* *Angl.* Knob-Fingers. *Petiv.* *Gall.* Le Scorpion. *Argenv.*

Teſta labro heptadactylo, digitis nodoſis, poſtico longiſſimo.

Die Schale hat ſieben knotige Zacken, deren hinterſter ſehr lang iſt.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *t.* 4. *ſ.* 12 *f.* 22.

Rumph. *amb.* *t.* 36. *f.* K.

Valent. Abh. t. 3. *f.* 28.

Argenv. Conch. *Pl.* 14. *f.* *B.*

Seb. Thes. *III.* *t.* 82. *f.* 11. 15.

Knor. *Vergn.* *II.* *t.* 3. *f.* 1.

Murray. *Fund.* *Teſt.* *t.* 1. *f.* 29.

Mart. Konch. Kab. *III.* 88. *t.* 860. *f.*

H. I. 5. Strombus Lambis.

H. I. 5. Die Krabbenſchnecke.

Linn. S. *N.* Sp. 493.

Belg. Geele krabbe. *Angl.* The Spider Shell. *Hill. Gall.* Araignée male. *Dav.*

Teſta labro heptadactylo, digitis rectiſuculis, fauce laeui.

Die Schale hat an der Schalenlefze ſieben einigermaßen gerade Zacken, und einen glatten Schlund.

α digitis perfectis elongatis.

α mit vollkommenen verlängerten Zacken.

Rumph amb. t. 35. f. F.
Petiv. amb. t. 14. f. 5.
Gualt. Teſt. t. 35. f. C.
Argenv. Conch. t. 14. f. E.
Seb. Thes. III. t. 82. f. 8.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.
Knor. Vergn. I. 28. t. 1. f.
Mart. Konch. Kab. III. 86. t. 855. f.

β digitis imperfectis, haud productis.

β mit unvollkommenen verkürzten Zacken.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 12. f. 21.
Rumph. amb. t. 36. f. G.

Petiv.

Petiv. amb. t. 14. f. 8.
Seb. Thes. III. t. 82. f. 16. 17.
Knor. Vergn. III. 7. t. 1. f.

H. I. 6. Strombus Millepeda.

H. I. 6. Die Vielfußſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 494.

Belg. Duizend-Been. *Rumph.* *Angl.* The dwelve Fingers. *Petiv.* *Gall.* Millepied *Dav.*

Teſta labro decadactylo, digitis inflexis, dorſo gibboſo compreſſo.

Die Schale hat zehen umgebogene Zacken, und einen hockerigen plattgedrückten Rücken.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 311.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 12. f. 23.
Rumph. amb. t. 36. f. 1.
Petiv. amb. t. 14. f. 7.
Argenv. Conch. Pl. 15. f. B.
Mart. Konch. Kab. III. 88. t. 861. 862. f.

H. II. Labro lobato.

H. II. Mit lappenförmiger Schalenlefze.

H. II. 1. Strombus lentiginoſus.

Linn. S. N. Sp. 495.

H. II. 1. Die Sommerſproßen.

Belg. Sproetje. *Rumph. Angl.* knobbed Broad'ip. *Petiv. Gall.* Tete de ſerpent. *Dav.*

Teſta labro antice trilobo, dorſo tuberculato coronato, roſtro obtuſo.

Die Schalenlefze iſt vorne dreylappig, der Rücken knottig, und gekrönet, der Schnabel ſtumpf.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 300.

Rumph. *amb. t.* 37. *f.* Q.

Petiv. amb. t. 14. *f.* 10.

Gualt. Teſt. *t.* 32. *f.* A.

Argenv. Concb. *Pl.* 15. *f.* C.

Seb. Thes. *III. t.* 52. *f.* 17, 18.; *t.* 62. *f.* 11.

Knor. Vergn. III. 13. *t.* 2. *f.*; 26. *t.* 2, 3. *f.*

Mart. Koncb. *Kab. III.* 80. *t.* 825. 826. *f.*

H. II. 2. Strombus Gallus.

Linn. S. N. Sp. 496.

H. II. 2. **Der Kampfhahn.**

Belg. Kemphaantje. *Rumph. Angl.* The Plough. *Da Coſt. Gall.* Aile d'Ange. *Dav.*

Teſta labro mucronato longiſſimo, dorſo ſpinoſo, roſtro recto.

Die Schalenlefze hat einen ſehr langen hervortrettenden Finger, der Rücken iſt ſtachlicht, der Schnabel gerad.

Bonan.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 309. 310.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 12. *f.* 29. 30.

Rumph. amb. t. 37. *f.* 5.

Gualt. Teſt. *t.* 32. *f.* M.

Seb. Thes. III. *t.* 62. *f.* 1, 2.

Knor. Vergn. IV. 12. *t.* 1. *f.*

—— *Del. nat. I. t.* B. *IV f.* 3.

Mart. Konch. Kab. *III.* 84. *t.* 841, 842. *f.*

—— —— —— 85. *t.* 846. *f.*

Da Coſt. Elem. Pl. 5. *f.* 1.

H. II. 3. Strombus Auris Dianae.

Linn. S. N. Sp. 497.

H. II. 3. Der Dianenflügel.

Belg. Wyzer. *Rumph. Angl.* Horned Broad-Lip. *Petiv. Gall.* Oreille d' Ane. *Argenv.*

Teſta labro antice mucronato, dorſo tuberculoſo, roſtro erecto.

Die Schalenlefze hat einen hervortrettenden Finger, der Rücken iſt knottig, der Schnabel in die Höhe gebogen.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 301. 302.

Liſt. *Hiſt.* Concb. *l.* 4. *ſ.* 12. *ſ.* 26. 28.

Rumph. amb. t. 37. *f.* R.

Petiv. amb. t. 14. *f.* 11.

Gualt. Teſt. *t.* 32. *f.* D, H.

Argenv. Concb. *Pl.* 14. *f.* O.

Klein. Meth. *Oſtr.* t. 6. *f.* 106.

Seb. Thes. *III.* t. 61. *f.* 1 — 6. *t.* 62. *f.* 13.

Knor. Vergn. *II.* 15. *t.* 1.2. *f.*

Mart. Koncb. Kab. *III.* 84. *t.* 838. 839. *f.*

H. II. 4. Strombus Pugilis.

H. II. 4. Das Fleiſchhorn.

Linn. S. N. Sp. 498.

Belg. Vlees-Hoorn. *Gall.* Oreille de Cochon. *Dav.*

Teſta labro antice prominente rotundato, ſpira ſpinoſa, roſtro trilobo, fauce rubra.

Die rundliche Schalenlefze raget vorne hervor, der Schnirkel iſt ſtachlicht, der Rüſſel dreylappig, mit einem rothen Schlunde.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 299.

Gualt. Teſt. *t.* 32. *f.* B.

Argenv. Conch. *Pl.* 15. *f.* A.

Klein. Meth. *Oſtr.* t. 6. *f.* 108.

Knor. Vergn. *I.* 9. *t.* 1. *f.*

—— —— *III.* 16. *t.* 1. *f.*

Mart. Koncb. Kab. *III.* 81. *t.* 830. 831. *f.*

H. II. 5. Strombus Luhuanus.

H. II. 5. Die Luhoneſerſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 500.

Belg. Lohoenſche Hoorntje. *Rumph. Angl.* Lohoe Broad-Lip. *Petiv. Gall.* Gueule noire. *Argenv.*

Teſta labro prominulo, anfractibus rotundatis aequalibus, fauce ſanguinea, columella nigra.

Die Schalenlefze raget hervor, die Gewinde ſind rundlich, und gleich, der Schlund bluthroth, die Spindel ſchwarz.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 12. *f.* 6.
— — *Gaz. t.* 98. *f.* 10.
Petiv. amb. *t.* 14. *f.* 12.
Rumph. amb. *t.* 37. *f.* S.
Gualt. Teſt. *t.* 31. *f.* H, J.
Argenv. Conch. *Pl.* 14. *f.* N.
Seb. Thes. *III. t.* 61. *f.* 20, 21. *t.* 62. *f.* 31, 32.
Knor. Vergn. V. 16. *t.* 5. *f.*
Mart. Konch. Kab. *III.* 77. *t.* 789. 790. *f.*

H. II. 6. Strombus faſciatus.

H. II. 6. Die gebänderte Flügelſchnecke.

Teſta labro prominulo, anfractibus infimis obtuſe ſpinoſis, ventre faſciis fuſcis.

Die Schalenlefze raget etwas hervor, die unterſten Gewinde ſind mit ſtumpfen Stacheln gekrönet, und der Leib mit braunen Bändern umgeben. *Mart.*

Mart. Konch. Kab. *III.* 78. *t.* 800 - 802. *f.*

Teſta laeuis. Anfractus ſeptem, infimi duo ſpinoſi, ſpinis obtuſis. Labrum rotundatum prominulum. Labium reflexum. Baſis obtuſa biloba. Color teſtae albus, ventris faſciis interruptis fuſcis; faux roſea.

Die Schale iſt glatt. Die Gewinde der Zahl nach ſieben, davon die unterſten mit ſtumpfen Knoten beſezet ſind. Die Schalenlefze iſt rundlich, raget etwas hervor. Die Spindellefze übergeſchlagen. Der Grund ſtumpf und zweylappig. Die Schale iſt weiß, mit braunen unterbrochenen Bändern bemalet; der Schlund roſenroth.

H. II. 7. Strombus gibberulus.

Linn. S. N. Sp. 501.

H. II. 7. Die höckerige Kanarienſchnecke.

Belg. Gebande Kanartje. *Angl. Gall.* Ailée boſſue. *Angl.* Girdled Canarie. *Pet.*

Teſta labro prominulo, dorſo laeui, anfractibus gibboſis inaequalibus.

Die Schalenlefze raget hervor, der Rücken iſt glatt, die Gewinde ſind höckerig und ungleich.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 12. *f.* 1.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 150.

Rumph. amb. *t.* 37. *f. V.*

Petiv. amb. *t.* 14. *f.* 13.

Gualt. Teſt. *t.* 31. *f. N.*

Seb. Thes. *III.* 61. *t.* 53. *f.*

Knor. Vergn. *II.* 14. *t.* 3. *f.*

—— —— *III.* 13. *t.* 4. *f.*

Mart. Konch. Kab. *III.* 77. *t.* 792 — 796. *f.*

H. II. 8. Strombus Oniſcus.

Linn. S. N. Sp. 502.

H. II. 8. Die Aſſelſchnecke.

Belg. Graeuwe Moerbey. *Valent.*

Teſta ouata, cingulis nodoſis, ſpirae apice mucronato, labro granulato, baſi obtuſa.

Die eyförmige Schale hat knotige Gürteln, eine verdünnte Wirbelſpize, mit körniger Schalenleſze und ſtumpfen Grunde.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 4. *ſ.* 10. *f.* 44.
Petiv. Gaz. t. 48. *f.* 16.
Gualt. Teſt. t. 22. *f. F.*
Seb. Thes. III. *t.* 55. *f.* 23.
Knor. Vergn. IV. 12. *t.* 4. *f.*
—— —— *VI.* 15. *t.* 6. *f.*
Mart. Konch. Kab. *II.* 34. *t.* 357. 358. *f.*

H. III. Strombi, ampliati.

H. III. Mit ausgebreiteten Flügeln.

H. III. 1. Strombus Lucifer.

Linn. S. N. Sp. 503.

H. III. 1. Die Kameelſchnecke.

Belg. Gemarmelde Kameelhoorn. *Angl.* Spiked Whelk. *Gall.* Chameau.

Teſta transuerſim dupliciter ſtriata, ſpira carinata, minute tuberculato.

Die in die Quere doppelt geſtreifte Schale hat kielförmige kleinknottige Schnirkelgewinde.

Bonan.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 303.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 13. f. 4—6.

Rumph. amb. t. 49. f. M.

Valent. Abh. t. 10. f. 88.

Gualt. Teſt. t. 55. f. A. B. E.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. J.

Seb. Thes. III. t. 61. f. 8; t. 62. f. 38—40.

Knor. *Vergn.* II. 29. t. 1. f.

—— —— III. 5. t. 4. f; 16. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. III. 90. t. 878. 886.

Da Coſt. Elem. Pl. 5. f. 2.

H. III. 2. Strombus Gigas.

Linn. S. N. Sp. 504.

H. III. 2. Die gezakte Schweizerhoſe.

Belg. Getakt Vleugel-Hoorn. *Angl.* The large Conch. *Gall.* La grande Ailée. *Ital.* Ogniella.

Teſta labro rotundato maximo, ventris ſpiraeque ſpinis patentibus.

Die rundliche Schalenlefze iſt ſehr groß, der Leib und Schnirkel mit ausgebreiteten kegelförmigen Stacheln beſezet.

Fauce roſea.

Mit roſenrothem Schlunde.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 307. 321.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 12. f. 19.

Gualt. Teſt. *t.* 33. *f.* *A*; *t.* 54. *f.* *M.*
Knor. *Vergn.* *III.* 17. *t.* 1. *f.*
Mart. Konch. Kab. *III.* 80. *t.* 824. *f.*

H. III. 3. Strombus Epidromis.

H. III. 3. Das Beſansſegel.

Linn. S. *N.* Sp. 506.

Belg. Bezaantje *Rumph.* *Angl.* Great Canarie. *Pet.* *Gall.* La Tourterelle, *Dav.*

Teſta labro rotundato, breui, ventre laeui, ſpira ſubnodoſa.

Die rundliche Schalenlefze iſt kurz, der Leib glatt, der Schnirkel etwas knottig.

Bonan. Mus. Kirch. *f.* 146.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 12. *f.* 10.
Petiv. Gaz. *t.* 98. *f.* 11.
—— *amb.* *t.* 14. *f.* 18.
Rumph. amb. *t.* 36. *f.* M.
Seb. Thes. *III.* *t.* 62. *f.* 21 — 23. 26.
Knor. *Vergn.* *VI.* 33. *t.* 2. *f.*
Mart. Konch. Kab. III. 79. *t.* 821. *f.*

H. III.

H. III. 4. Strombus Canarium.

H. III. 4. Das Täubchen.

Linn. S. N. Sp. 507.

Belg. Bultje *Rumph.* *Angl.* Hunchbackt Canarie *Pet.* *Gall.* Pigeonne.

Teſta tumida, laeui; labro rotundato, breui, retuſo.

Die bäuchige glatte Schale, hat eine rundliche, kurze, eingezogene Schalenlefze.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 146.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 12. f. 9.
Petiv. Gaz. t. 98. f. 13.
—— amb. t. 14. f. 17.
Rumph. amb. t. 36. f. N.
Gualt. Teſt. t. 32. f. N. L.
Argenv. Conch. Pl. 14. f. Q.
Seb. Thes. III. t. 62. f. 28, 29, 24, 25.
Klein. Meth. Oſtr. t. 4. f. 73.
Knor. Vergn. I. 18. t. 5. f.
Mart. Konch. Kab. III. 79. t. 817. 818. f.

H. III. 5. Strombus vittatus.

H. III. 5. Das aufgewickelte Beſansſegel.

Linn. S. N. Sp. 508.

Belg. Opgerollde Bezaantje. *Rumph.* *Angl.* Great net Whelk. *Pet.* *Gall.* Miſaine roulée.

Teſta labro rotundato, ventre laeui, ſpirae elongatae anfractibus ſutura diſtinctis.

Die Schalenlefze iſt rundlich, der Leib glatt, die Gewinde des verlängerten Schnirkels haben eine Zwiſchennath.

Petiv. Gaz. t. 98. *f.* 12.

—— *amb. t.* 7. *f.* 9.

Rumph. amb. t. 36. *f.* O.

Argenv. Conch. Pl. 9. *f.* F.

Seb. Thes. III. *t.* 62. *f.* 18 — 20.

Knor Vergn. III. 20. *t.* 2. *f.*

Mart. Konch. Kab. *III.* 79. *t.* 822. *f.*

H. III. 6. Strombus accinctus.

H. III. 6. Die breite Kanarienſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 509.

Belg. Geblomde Kanarie. *Angl.* Broad knobbed Canarie. *Petiv.*

Teſta labro rotundato, ſpirae anfractibus ſtriatis, ventre laeui, cingulis quatuor albo maculatis.

Die Schalenlefze iſt rundlich, die Gewinde geſtreifet, der Leib glatt, mit vier weißen geſleckten Gürteln.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 12. *f.* 16.

Rumph. amb. t. 37. *f.* X.

Petiv. amb. t. 14. *f.* 19.

Argenv. Conch. Pl. 10. *f.* C.

Seb. Thes. III. t. 61. *f.* 15.

Mus. Caes. Vindobon.

H. III. 7. Strombus Urceus.
Linn. S. N. Sp. 312.

H. III. 7. Die knottige Kanarienſchnecke.

Belg. Gebulde Kanary. *Rumph. Angl.* Long knobbed Canarie. *Pet.*

Teſta labro attenuato, ſtriato, ventre ſpiraque plicato nodoſis.

Die Schalenlefze iſt verenget und geſtreifet, der Leib und der Schnirkel mit Knotten und Falten beſezet.

α alba transuerſim ſtriata, (major.)

α weiß, der Quere nach geſtreifet, (größer.)

β fuſco maculata, aut reticulata, laeuis (minor.)

β glatt, mit braunen Flecken, oder Nezen (kleiner.)

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 12. *f.* 13.

Petiv. Gaz. t. 98. *f.* 14.

—— *amb. t.* 14. *f.* 21.

Rumph. amb. t. 37. *f.* T.

Gualt. Teſt. t. 32. *f.* E.

Seb. Thes. III. t. 60. *f.* 28. 29.

Knor. Vergn. III. 13 *t.* 5. *f.*

Mart. Konch. Kab. III. 78. *t.* 804 — 806. *f.*

H. IV. 1. Strombus tuberculatus. | H. IV. 1. Die knottige Nadel.

Linn. S. *N.* *Sp.* 415.

Teſta turrita, transuerſim ſtriata, nodis glabris cincta; labro incraſſato.

Die gethürmte Schale iſt in die Quere geſtreifet, mit glatten Knotten umgeben, an der Schalenleſze verdickt.

Mart. Konch. Kab. *IV.* 157. *t.* 1490. *f.*
Mus. Caes. Vindobon.

I. Murex. | I. Die Stachelſchnecke.

Teſta ſpiralis ſuturis longitudinalibus varicoſis. Apertura deſinens in canalem rectum, aut ſubaſcendentem.

Die ſchnirkelförmig gewundene Schale iſt der Länge nach mit wulſtigen Näthen beſezet. Die Mündung endiget ſich in eine gerade, oder etwas aufſteigende Rinne.

I. I. Spinoſi, roſtro elongato. | I. I. Dornige, mit verlängertem Rüſſel.

I. I. 1. Murex Hauſtellum. | I. I. 1. Der Schnepfenſchnabel.

Linn.

Linn. S. N. Sp. 518.

Belg. Scheppertje. *Rumph.* *Angl.* The commonon Woodcock Shell. *Gall.* Tete de Becaſſe *Dav.*

Teſta ſubouata tuberculata, roſtro elongato ſubulato, recto, inermi.

Die etwas eyförmige knotige Schale hat einen verlängerten ahlförmigen, geraden, unbewaffneten Rüſſel.

α incarnata, maculis nigris.

α fleiſchroth, mit ſchwarzen Flecken.

β niuea, maculis rufis.

β ſchneeweiß, mit braunrothen Flecken.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 268.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 13. f. 23.
Rumph. amb. t. 26. f. F.
Petiv. amb. t. 4. f. 8.
Gualt. Teſt. t. 30. f. E.
Argenv. Conch. Pl. 16. f. B.
Klein. Meth. Oſtr. t. 4. f. 81.
Seb. Thes. III. t. 78. f. 5, 6.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.
Knor. Vergn. I. 12. t. 2, 3. f.
—— —— III. 9. t. 4. f.
Mart. Konch. Kab. III. 115. t. 1066. f.

I. I. 2. Murex Tribulus.

I. I. 2. Die Spinne.

Linn. S. N. Sp. 519.

Belg.

Belg. Spinnekop. *Rumph.* *Angl.* Thorney Woodcock. *Hill.* *Gall.* La becaſſe epineuſe. *Dav.*

Teſta ouata, ſpinis ſetaceis trifariis, roſtro elongato, ſubulato, ſpinoſo.

Die eyförmige Schale iſt mit einer dreyfachen Reihe borſtiger Stacheln beſezet, und mit einem verlängerten, ahlförmigen, ſtachlichten Rüſſel verſehen.

α ſpinis ſimplicibus, alternis majoribus.

α mit einfachen wechſelweiſe gröſſeren Stacheln.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 269.
Liſt. *Hiſt.* *Conch.* *l.* 4. *ſ.* 13. *f.* 22.
Petiv. *Gaz.* *t.* 101. *f.* 16.
—— *amb.* *t.* 6. *f.* 8.
Rumph. *amb.* *t.* 26. *f.* G.
Gualt. *Teſt.* *t.* 31. *f.* *A.*
Seb. Thes. III. *t.* 78. *ſ.* 4.
Hill. *Hiſt.* *of.* *Anim.* *Pl.* 8.
Knor. *Vergn.* *I.* 11. *t.* 3, 4. *f.*
—— *Delic.* *nat.* *t.* *B.* *V.* *f.* 5.
Murr. *Fund.* *Teſt.* *t.* 1. *f.* 15.
Mart. Konch. Kab. *III.* 113. *t.* 1053. 1054. *f.*
Da Coſt. *Elem.* *Pl.* 4. *f.* 5.

β ſpinis ſubaequalibus duplicatis.

β mit beynahe gleichgroſſen doppelten Stacheln.

Rumph. *amb.* *t.* 26. *f.* 3.
Gualt. *Teſt.* *t.* 31. *f.* *B.*

Argenv.

Argenv. Conch. *Pl.* 16. *f. A.*

Seb. *Thes. III. t.* 78. 1 — 3. *f.*

Knor. Verg. V. 27. *t.* 1. *f.*

Mart. Konch. Kab. *III.* 113. *t.* 1052. *f.*

I. I. 3. Murex cornutus.

I. I. 3. Der gezackte Schnepfenkopf.

Linn. S. N. Sp. 520.

Belg. Gedoornde Snippekop. *Angl.* Thorney Snipe. *Gall.* La grande Maſſüe d'Hercule. *Dav.*

Teſta ſubrotunda, ſpinis ſubulatis obliquis, roſtro elongato, ſpinis ſparſis.

Die rundliche Schale hat ahlförmige ſchiefſtehende Stacheln und einen verlängerten mit zerſtreuten Stacheln beſezten Rüſſel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *ſ.* 283.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 13. *f.* 21.

Rumph. *amb. t.* 26. *f.* 5.

Gualt. *Teſt. t.* 30. *f.* D.

Adans. *Seneg. Pl.* 8. *f.* 20.

Seb. *Thes. III. t.* 78. *f.* 7 — 9.

Knor. Vergn. VI. 17. *t.* 1. *f.*

Mart. Konch. Kab. *III.* 114. *t.* 1057. *f.*

I. I. 4. Murex Brandaris.

I. I. 4. Der dornige Schnepfenkopf.

Linn. S. N. Sp. 521.

Belg. Getackte Snippekop *Rumph. Angl.* The common thorney Murex. *Pet. Gall.* Maſſüe d'Hercule. *Dav.*

Teſta ouata, ſpinis rectis, roſtro mediocri ſubulato, recto, labio excauato.

Die eyförmige Schale hat gerade Stacheln, einen mittelmäſſig langen ahlförmigen geraden Rüſſel mit einer ausgehöhlten Schalenlefze.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 281.
Petiv. Gaz. *t.* 68. *f.* 12.
R*umph* amb. *t.* 26. *f.* 4.
Gualt. Teſt. *t.* 30. *f.* F.
Argenv. Zoom. *Pl.* 4. *f.* C.
Ginan. adr. *II.* *t.* 8. *f.* 61. 62.
Regenſ. Samml. 6. *t.* 67. *f.*
Knor. *Vergn.* *II.* 18. *t.* 1. 2. *f.*
——— ——— 22. *t.* 4. 5. *f.*
Mart. Konch. Konch *III.* 114. *t.* 1060. 1061. *f.*
——— ——— ——— 115. *t.* 1062 - 1065. *f.*

I. I. 5. Murex Trunculus.

I. I. 5. Das gehörnte Purpurhorn.

Linn. S. N. Sp. 522.

Belg. Gebandeerde Purper-Hoorn. *Gall.* Pourpre a bandes.

Teſta ouata nodoſa, ſpinis anticis majoribus, roſtro truncato breui, perforato.

Die eyförmige knotige Schale hat vorne größere Stacheln, und einen ſtumpfen kurzen durchbohrten Rüſſel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 271, 274, 277.
Gualt. Teſt. *t.* 31. *f.* C.
Argenv. Conch. *Pl.* 16. *f.* G.
Klein. Meth. Oſtr. *t.* 6. *f.* 104.
Seb. Thes. *III.* *t.* 52. *f.* 15. 16.
Knor. *Vergn.* *III.* 13. *t.* 1. *f.*
—— —— *V.* 13. *t.* 4. *f.*; 19. *t.* 6. *f.*
Mart. Konch. Kab. *III.* 109. *t.* 1019. 1020. *f.*

I. II. Suturis foliaceis: Purpurae. dictae.

I. II. Mit blätterigen Näthen: ſogenannte Purpurſchnecken.

I. II. 1. Murex tripterus.

I. II. 1. Die dreyflügige Purpurſchnecke.

Belg. Vleugel-hoorntje. *Gall.* Pourpre triangulaire ailée. *Dav.*

Teſta elongata triangulari, angulis alato membranaceis.

Die länglichte, dreyeckige Schale hat flügelförmig ausgebreitete Ecken.

Mart. Konch. *Kab.* *III.* 111. *t.* 1033. *f.*
Mus. *Caes.* *Vindobon.*

Teſta

Teſta elongato triangularis, tranſuerſim rugoſa; rugae inaequales acutae, ſtriis eleuatis longitudinalibus ſubtiliſſimis, decuſſatae. Spira conſtans anfractibus ſeptem, tuberculis ſolitariis inter ſuturas obſita. Suturae longitudinales tres obſoletae, totidem conſtituentes angulos expanſos in membranas plicatas aliformes. Apertura tuberculata ouato oblonga, deſinens in canalem rectum ſpira breuiorem. Color nitens niueus.

Die länglichte dreyeckige Schale iſt in die Quere gerunzelt; Die Runzeln ſind ungleich, und ſcharf, und mit erhabenen feinen Streifen der Länge nach durchkreuzet. Der Schnirkel beſtehet aus ſieben Gewinden, die zwiſchen den Näthen mit einzelnen Körnern beſezet ſind. Nach der Länge laufen drey undeutliche Näthe, welche eben ſo viele Ecken bilden, die ſich in häutige gefaltene Flügeln ausbreiten. Die länglicht eyförmige Mündung iſt mit Körnchen beſezet, und endiget ſich in eine gerade Rinne, die kürzer als der Schnirkel iſt. Die Farbe iſt glänzend ſchneeweiß.

I. II. 2. Murex triqueter.

I. II. 2. Die dreyſeitige Purpurſchnecke.

Belg. Geplekte Vleugel-Hoorentje. *Gall.* Pourpre triangulaire tachetée.

Teſta elongata triquetra ſubalata, reticulatim coſtata, roſtro recto clauſo.

Die länglichte dreyſeitige einigermaßen geſlügelte Schale iſt mit nezförmigen Ribben beſezet, und mit einem geraden geſchloſſenen Rüſſel verſehen.

Mart. Konch. Kab. III. 111. *t.* 1038. *f.*

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta elongata, coſtis tranſuerſis, & longitudinalibus reticulatim decuſſata. Spira pyramidata compoſita ex anfractibus ſenis. Suturae longitudinales tres, eleuatae; angulos totidem conſtituentes, in membranas plicatas obſoletas excreſcentes; quarum illa nonniſi labri externi, manifeſta eſt. Apertura elliptica,

Die Schale iſt länglicht, mit nach der Länge, und in die Quere laufenden Ribben durchkreuzet. Der pyramidenförmige Schnirkel beſtehet aus ſechs Gewinden. Die drey nach der Länge ſtehenden erhabenen Näthe bilden eben ſo viele Ecken, welche ſich in gefaltene, unvollkommene Flügeln verbreiten, davon

tica, deſinens in canalem elongatum rectum clauſum. Labrum crenulatum. Color albus maculis diſperſis rubris.

nur jener an der Schalenleſze deutlich iſt. Die Mündung iſt elliptiſch, und verlängert ſich in eine gerade geſchloſſene Rinne. Die Schalenleſze iſt gekerbet. Von weißer Farbe mit rothen Flecken.

I. II. 3. Murex ramoſus.

I. II. 3. Die Krausſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 523.

Belg. Ocean-Hoorn. *Rumph. Angl.* The Caltrup Shell. *Hill. Gall.* Chauſſe Trape. *Argenv.*

Teſta oblonga, triangula, trifariam frondoſa, anfractibus contiguis, roſtro truncato.

Die längliche, dreyeckige Schale hat drey Reihen krauſer Blätter, aneinandergewachſene Windungen, und einen abgeſtumpften Rüſſel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 275. 276.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 14. *f.* 41.

Rumph. amb. t. 26. *f. A.* I.

Petiv. amb. t. 12. *f.* 2.

Gualt. Teſt. t. 37. *f.* G. D. L.; *t.* 38. *f. A.*

Valent. Abh. t. 4. *f.* 38; 5. *t.* 42. *f.*

Argenv. Conch. *Pl.* 16. *f.* C. E. *H.*

——— *Zoom. Pl.* 4. *f.* D.

Seb. Thes. III. *t.* 77. *f.* I. 2. 7.

Klein. Meth. *Oſtr. t.* 4. *f.* 8.

Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.

Regenſ. Samml. I. 6. *t.* 6. *f.*

Knor. Vergn. I. 26. *t.* 1. 2. *f.*

——— ——— III. 9. *t.* 3. *f.*

——— ——— V. 11. *t.* 1. *f.*

Mart. Konch. Kab. III. 102. *t.* 980. *f.*

——— ——— ——— 103. *t.* 981 — 983. *f.*

——— ——— ——— 104. *t.* 984 — 986. *f.*

——— ——— ——— 105. *t.* 987 — 989. *f.*

I. II. 4. Murex Scorpio. — I. II. 4. Die Skorpionſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 524.

Belg. Scorpioentje *Rumph.* *Angl.* Leaſt ragged Whelk. *Petiv. Gall.* Patte de Crapaud. *Dav.*

Teſta quadrifariam frondoſa, ſpira capitata, roſtro truncato.

Die Schale hat drey Reihen krauſer Blätter, einen kolbigen Schnirkel, und abgeſtumpften Rüſſel.

Rumph. amb. *t.* 26. *f.* D.

Petiv. amb. *t.* 9. *f.* 14.

Valent. Abh. *t.* 4. *f.* 36. 37.

Gualt. Teſt. *t.* 37. *f.* M.

Argenv. Conch. Pl. 16. *f.* D.

Seb.

Seb. *Thes.* *III.* t. 77. f. 13—16.
Knör. *Vergn.* *II.* 11. t. 4. 5. f.
Mart. *Konch.* *Kab.* *III.* 112. t. 1040—1041. f.
Da Coſt. *Elem.* *Pl.* 5. f. 6.

I. II. 5. Murex ſaxatilis.

I. II. 5. Das Brandhorn.

Linn. *S.* *N.* *Sp.* 525.

Belg. Dubbelde Brana-Hoorn. *Angl.* The Endive-Shell; *Hill.* *Gall.* La Chicorée. *Argenv.*

Teſta ſexariam frondoſa, anfractibus contiguis, roſtro abbreuiato.

Die ſechsfach krausblätterige Schale, hat aneinander gewachſene Windungen, und einen verkürzten Rüſſel.

α brunna.

α braun.

β niuea, frondibus nigris.

β ſchneeweiß, mit ſchwarzen Krausblättern.

Rumph. *amb.* t. 26. f. C. 2.
Petiv. *amb.* t. 12. f. 1.
Argenv. *Conch.* *Pl.* 16. f. K.
Seb. *Thes.* III. t. 77. f. 5, 6.
Hill. *Hiſt.* *of.* *Anim.* *Pl.* 8.
Regenſ. *Samml.* I. 1. t. 2. f.

Knor. Vergn. II. 7. t. 4. 5. f.
—— —— III. 9. t. 2. f.
—— —— VI. 19. t. 1. 4. f.
Murr. Fund. Teſt. t. 1. f. 26.
Mart. Konch. Kab. III. 107. t. 1004-1010. f.
—— —— —— 108. t. 1011-1014. f.

I. II. 6. Murex Erinaceus.

I. II. 6. Die vieleckige Purpurſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 526.

Teſta multifariam ſubfrondoſa, ſpirae anfractibus multangulis, roſtro breuiuſculo.

Die Schale hat viele unvollkommene Krausblätter, vieleckige Wirbelgewinde, und einen etwas verkürzten Rüſſel.

Gualt. Teſt. t. 49. f. H.
Mus. Caes. Vindobon.

I. III. Varicoſi, ſuturis rotundis, toroſis.

I. III. Warzige, mit runden knottigen Näthen.

I. III. 1. Murex Rana.

I. III. 1. Die Krötenſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 527.

Belg. Padde-Hoorn. *Rumph.* *Angl.* Wide cadoe Whelk. *Petiv.* *Gall.* Raerocheuſe, *Dav.*

Teſta

Teſta ſuturis oppoſitis, compreſſis, cingulis muricatis, apertura ouata.

Die Schale hat entgegengeſezte zuſammengedrückte Näthe, dornige Gürteln, und eine eyrunde Oefnung.

α teſta rotundata, ſpinis dorſi, & ſuturarum breuibus.

α mit rundlicher Schale, derer Rücken und Näthe mit kurzen Dörnern beſezet ſind.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 182.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 15 *f.* 59.

Petiv. Gaz. *t.* 100. *f.* 12.

—— *amb. t.* 11. *f.* 15.

Rumph. amb. t. 24. *f.* G.

Gualt. Teſt. *t.* 49. *f.* L.

Argenv. Conch. Pl. 9. *f.* D.

Seb. Thes. III. *t.* 60. *f.* 15 — 18.

Regenſ. Samml. I. 6. *t.* 64. *f.*

Knor. Vergn. II. 13. *t.* 6. 7. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 133. *t.* 1271. *f.*

β teſta compreſſa, ſpinis ſuturarum elongatis.

β mit platgedrückter Schale, und verlängerten Stacheln auf den Näthen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 14. *f.* 44.

Seb. Thes. III. *t.* 60. *f.* 19.

Knor. Vergn. III. 7. *t.* 5. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 133. *t.* 1275. 1276. *f.*

I. III. 2. Murex Gyrinus.

Linn. S. N. Sp. 528.

I. III. 2. Die Froſchſchnecke.

Belg. Vorſchen - Poppe. *Gall.* Grenouillete.

Teſta ſuturis oppoſitis, continuatis, cingulis tuberculoſis faſciata; apertura rotunda.

Die Schale hat entgegengeſezte ununterbrochene Näthe, und iſt mit knottigen Gürteln, und einer rundlichen Mündung verſehen.

Seb. Thes. III. t. 60. f. 25 — 27.

Knor. Vergn. VI. 25. t. 5. 6. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 128. t. 1233. 1234. f.

I. III. 3. Murex Lampas.

Linn. S. N. Sp. 529.

I. III. 3. Der knottige Oelkuchen.

Belg. Gebulde Olykoek. *Rumph. Angl.* Knopped Trumpet. *Petiv. Gall.* Culotte de Suiſſe *Dav.*

Teſta granuloſa, ſuturis oppoſitis, cingulis tuberculatis, labro dentato, labio ſtriato.

Die körnige Schale hat entgegengeſezte Näthe, knottige Querbänder, eine gezähnte Schalenlefze, und geſtreifte Spindellippe.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 103.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 15. f. 88.

Rumph. amb. t. 28. f. C.

Petiv. amb. t. 12. f. 16. 17.

Gualt.

Gualt. Teſt. t. 50. f. D.

Argenv. Conch. t. 9. f. D.

Knor. Vergn. II. 28. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. III. 106. t. 998 — 123. f.

I. III. 4. Murex Olearium.

I. III. 4. Der geribbte Oelkuchen.

Linn. S. N. Sp. 530.

Belg. Gebande Argus Oogen. *Rumph. Angl.* Girdled Argus Shell. *Petiv Gall.* Argus a boutons.

Teſta ſuturis alternis, cingulis nodoſis, dorſo poſtice tranſverſim ſtriato.

Die Schale hat wechſelweiſe ſtehende Nåthe, knottige Gůrteln, und einen hinten mit Querſtreifen beſezten Růcken.

Bonan. Recr. cl. 3. t. 289.

Rumph. amb. t. 49. f. E.

Petiv. amb. t. 6. f. 6.

Gualt. Teſt. t. 50. f. A.

Knor. Vergn. V. 3. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 127. t. 1223. f.

I. III. 5. Murex coſtatus.

I. III. 6. Der eckige Oelkuchen.

Teſta ſubfuſiformi, coſtis transuerſis angulatis, ſutura ſolitaria, roſtro elongato.

Die einigermaßen ſpindelförmige Schale, hat eckige Querribben, eine einzelne Nath, mit einem verlängerten Rüſſel.

Seb. *Thes.* III. *t.* 57. *f.* 31.

Mart. *Konch.* *Kab.* *IV*. 131. *t.* 1253. *f.*

Teſta ſubfuſiformis. Anfractus circiter octo, cincti coſtis craſſis, conuexis, angulatis. Sulci intermedii ſtriati, ſtriis eleuatis, duplicatis. Sutura varicoſa, ſolitaria, labro ſuboppoſita. Apertura plicata, ouato oblonga, deſinens in roſtrum umbilicatum, canaliculatum recuruum. Color pallide luteus.

Die Schale iſt einigermaſſen ſpindelförmig Die Gewinde, deren beiläufig acht ſind, haben dicke erhabene eckige Ribben. Die Zwiſchenfurchen ſind geſtreifet, die Streifen erhaben und doppelt. Die Nath iſt knottig und einzeln, der Schalenlefze gegenüberſtehend. Die gefaltene länglich eyförmige Mündung endiget ſich in einen nabelförmig eingedrückten, rinnenartigen gekrümmten Rüſſel. Die Farbe iſt blaßgelb.

I. III. 6. Murex Femorale.

I. III. 6. Das Fußhorn.

Linn. S. *N.* *Sp.* 531.

Belg. Voet-Hoorn. *Rumph.* *Angl.* Stoone Whelk. *Gall.* Rhinoceros. *Dav.*

Teſta rugoſa, trigona; ſpirae apice tuberculato, apertura edentula, antice transuerſim expanſa.

Die runzelichte dreyeckige Schale hat eine knotige Wirbelſpize, mit einer ungezähnten vorne in die Quere erweiterten Mündung.

Bonan. *Recr.* *cl.* 3. *f.* 290.

Liſt. *Hiſt.* *Conch.* *l.* 4. *ſ.* 14. *f.* 37.

Rumph. *amb.* *t.* 26. *f.* *B.*

Petiv.

Petiv. amb. t. 12. *f.* 3.

Gualt. Teſt. t. 50. *f.* C.

Argenv. Conch. *Pl.* 10. *f.* B.

Seb. Thes. *III. t.* 63. *f.* 7 — 10.

Knor. Vergn. IV. 16. *t.* 1. *f.*

—— *Del. nat.* I. *t. B.* IV. *f.* 2.

Mart. Konch. Kab. III. 111. *t.* 1039. *f.*

I. III. 7. Murex cutaceus.

I. III. 7. Die Hautſchnecke.

Linn. S. *N.* Sp. 532.

Belg. Vell - Hoorn. *Gall.* Degrés bordés.

Teſta ſutura ſolitaria, nodisque transuerſim decuſſatis, apertura dentata, columella perforata.

Die Schale hat eine einzelne Nath, in die Quere durchkreuzte Knotten, eine gezähnte Mündung, und durchbohrte Spindel.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 14. *f.* 38.

Seb. Thes. *III. t.* 52. *f.* 10. 11.

Mart. Konch. Kab. *IV.* 118. t. 1085. 1086. *f.*

I. III. 8. Murex Pyrum.

I. III. 8. Die getrocknete Birne.

Linn. S. *N. Sp.* 535.

Belg. Gedrooyede Peer. *Rumph. Angl.* Hairy Whelk. *Petiv. Gall.* Poire ſeche.

Teſta ouata, nodoſa, transuerſim ſulcata, roſtro elongato flexuoſo.

Die eyförmige knottige Schale iſt in die Quere gefurchet, und mit einen langen gebogenen Rüſſel verſehen.

Liſt.

f. Rumph. amb. t. 26. f. E.
Petiv. amb. t. 12. f. 4.
Gualt. Teſt. t. 37. f. F.
Argenv. Conch. Pl. 10. f. O.
Regenſ. Samml. I. 6. t. 60. f.
Knor. Vergn. II. 7. t. 2. 3. f.
Mart. Konch. Kab. III. 112. t. 1040. 1041. f.

I. III. 9. Murex Rubecula.

I. III. 9. Die Livreeſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 536.

Belg. Livreyhoorn. *Gall.*

Teſta ſuturis oppoſitis, cingulis noduloſis, apertura dentata.

Die Schale hat entgegengeſezte Näthe, knottige Gürteln, und eine gezähnte Mündung.

Gualt. Teſt. t. 49. f. I.
Argenv. Conch. Pl. 9. f. I.
Seb. Thes. III. t. 49. f. 1 — 5.
Knor. Vergn. I. 13. t. 3. 4. f.
—— —— III. 5. t. 2. 3. f.
Mart. Konch. Kab. IV. 132. t. 1259 — 1266. f.

I. III. 10. Murex reticularis.

Linn. S. N. Sp. 538.

Teſta ſuturis ſuboppoſitis, tuberculata, ſtriis eleuatis reticulatis, roſtro abbreuiato.

I. III. 10. Die Nezſchnecke.

Die knottige Schale hat einigermaßen entgegengeſezte Näth, nezförmig durchkreuzte erhabene Streifen, und einen verkürzten Rüſſel.

Bonan. Recr. cl. 3. *f.* 193.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 14. *f.* 30.

Petiv. Gaz. t. 153. *f.* 6.

Gualt. Teſt.. t. 49. *f. M.*

Mus. Caes. Vindobon.

I. III. 11. Murex Anus.

Linn. S. N. Sp. 539.

Belg. Oorhorn. *Valent. Angl.* Hairy-Ear. *Petiv. Gall.* La Grimace.

Teſta gibboſa reticulatim tuberculata, ſuturis, & labiis dilatato membranaceis, roſtro erecto.

I. III. 11. Das krumme Maul.

Die höckerige, nezförmige, knottige Schale, hat ausgebreitete häutige Näthe und Lippen, mit einem aufgerichteten Schnabel.

Bonan. Recr. cl. 3. *f.* 279. 280.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 11. *f.* 57.

Petiv.

Petiv. Gaz. t. 74. f. 9.; t. 99. f. 10.
—— *amb.* t. 6. f. 4.
Rumph. vmb. t. 24. f. F.
Gualt. Teſt. t. 37. f. B. E.
Argenv. Conch. Pl. 9. f. H.
Seb. Thes. III. t. 60. f. 6. 7.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.
Knor. Vergn. III. 3. t. 5. f.
Mart. Konch. Kab. II. 41. t. 403. 404. f.
Da Coſt. Elem. Pl. 4. f. 2.

I. IV. Echinati, ſine roſtro. — I. IV. Dornige, ohne Rüſſel.

I. IV. 1. Murex Ricinus. — I. IV. 1. Die gezackte Maulbeere.

Linn. S. N. Sp. 540.

Belg. Gedakte Moerbey. *Rumph.* *Angl.* Small Spur Shell. *Pet.* *Gall.* L'Heriſſon. *Dav.*

Teſta ouata, ſpinis ſubulatis, apertura dentata.

Die eyförmige Schale iſt mit ahlförmigen Dörnern beſezet, und an der Mündung gezähnt.

α ore luteo, ſpinis longioribus (minor).

α mit gelber Mündung, und längeren Dörnern (kleiner).

β ore amethyſtino, ſpinis breuioribus (major).

β mit amethyſtfarbener Mündung, und kürzeren Dörnern (größer).

Rumph.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 11. f. 12.

Rumph. amb. t. 24. f. E.

Petiv. amb. t. 11. f. 11.

Gualt. Teſt. t. 28. f. N.

Seb. Thes. III. t. 60. f. 37. 3942.

Knor. Vergn. I. 25. t. 5. 6. f.

— — VI. 24. t. 7. f.

Mart. Konch. Kab. III. 101. t. 972. 973 f.

— — — 102. t. 976. 977. f.

I. IV. 2. Murex Nodus. — I. IV. 2. Die groſse Kaſtanie.

Linn. S. N. Sp. 541.

Belg. De bandeerde Caſtanje. *Angl.* The great Chesnut. *Gall.* La Chataigne a bandes.

Teſta utrinque attenuata, ſpinis conicis, labro tuberculato, columella laeui.

Die beiderſeits zugeſpizte Schale iſt mit kegelförmigen Stacheln beſezet, an der Schalenlefze knottig, an der Spindel glatt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 15. f. 10.

Seb. Thes. III. t. 60. f. 12.

Knor. Vergn. II. 2. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. III. 100. t. 957. 958. f.

I. IV. 3. Murex neritoideus.

I. IV. 3. Das Schminkpfläſterchen.

Linn. S. N. Sp. 542.

Belg. Roots-Hoorn met Moesjesjes. *Angl.* The Coequet. *Gall.* La Coquette.

Teſta obtuſe nodoſa, labro angulato, columella complanata, bimaculata.

Die Schale iſt mit ſtumpfen Knotten beſezet, an der Schalenlefze eckig, mit zween Flecken an der flachgedrückten Spindel.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *t.* 4. *ſ.* 15. *f.* 50.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 173. 174.

Petiv. Gaz. *t.* 19. *f.* 10.

Gualt. *Teſt.* *t.* 66. *f.* B. B.

Klein. *Meth.* *Oſtrac.* *t.* 1. *f.* 30.

Mart. Konch. *Kab.* *III.* 100. *t.* 959. 960. *f.*

I. IV. 4. Murex Mancinella.

I. IV. 4. Die lange Maulbeere.

Linn. S. N. Sp. 544.

Belg. Langverpige Maerberzie. *Angl.* The Mulberry Shell, *Hill.* *Gall.* La Mure allongée.

Teſta ouata oblonga, tuberculis acutis muricata, ore dentato amethyſtino.

Die eyförmige längliche Schale iſt mit ſpizigen Dörnern bewafnet, mit einer amethyſtfarbenen gezähnten Mündung.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 15. *f.* 5.

Petiv. Gaz. *t.* 48. *f.* 14.

Argenv. Conch. *Pl.* 17. *f. H.*

Hill. Hiſt. of Anim. Pl. 8.

Mart. Konch. Kab. *III.* 101. *t.* 970. *f.*

I. IV. 5. Murex Hippocaſtanum.

I. IV. 5. Das Pimpelchen.

Linn. S. N. Sp. 545.

Belg. Pimpeltje.

Teſta ouata ſtriata, quadrifariam ſpinoſa, columella umbilicata.

Die eyförmige geſtreifte Schale iſt mit vier Reihen Stacheln umgeben, und an der Spindel genabelt.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 13. *f.* 15.

Rumph. amb. *t.* 24. *f.* 4.

Gualt. Teſt. *t.* 31. *f.* F.

Seb. Thes. III. *t.* 49. *f.* 80 — 82.

Knor. Vergn. III. 7. *t.* 3. *f.*

—— —— *V.* 4. *t.* 2. *f.*

Mart. Konch. Kab. *II. t.* 40. *f.* 398.

I. IV. 6. Murex rugoſus.

I. IV. 6. Die runzelichte Knotenſchnecke.

Teſta

Teſta ouata, longitudinaliter rugoſa, ſtriis, cariniſque nodoſis tranſuerſis, roſtro umbilicato breui.

Die eyförmige, der Länge nach runzelichte Schale iſt in die Quere geſtreifet, und knottig gekielet; mit einem genabelten kurzen Rüſſel.

Mart. Konch. Kab. IV. 124. *t.* 1155. 1156. *f.*

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ouata. Anfractus quinque connati, longitudinaliter rugoſi, tranſuerſim ſtriati, & carinati, carinis angulatis. Apertura oualis columella umbilicata. Roſtrum breue, effuſum.

Die Schale iſt eyförmig. Die fünf Gewinde ſind zuſammengewachſen, nach der Länge gerunzelt, in die Quere geſtreifet, mit eckigen Kielen. Die Mündung eyförmig. Die Spindel genabelt. Der Rüſſel kurz und ausgeſchnitten.

I. IV. 7. Murex ſenticoſus.

I. IV. 7. Die Diſtelſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 546.

Belg. Diſtel-Hoorntje. *Angl.* Small prickle Whelk. *Petiv.*

Teſta ſubturrita, longitudinaliter coſtato muricata, tranſuerſim cancellata, ore ſtriato.

Die einigermaſſen gethürmte Schale iſt der Länge nach ſtachlicht geribbt, in die Quere gegittert, an der Mündung geſtreifet.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 35.

Rumph. amb. *t.* 29. *f.* N.

Petiv. amb. t. 9. *ſ.* 17.

Gualt. Teſt. *t.* 51. *ſ.* J.

Argenv. Conch. *Pl.* 9. *f.* O.

Seb. Thes. III. *t.* 49. *ſ.* 45 — 47.

Knor. Vergn. IV. 23. *t.* 4. 5. *f.*

I. IV. 8. Murex Melongena.

I. IV. 8. Das Bettzeug.

Linn. S. *N.* Sp. 547.

Belg. Gedoorende Schildpadſtaert. *Rumph. Angl.* The blue & white Murex. *Hill. Gall.* le Lard. *Dav.*

Teſta pyriformi, ſpira ſubſpinoſa prominente, apertura laeui.

Die birnſörmige Schale hat einen hervorragenden einigermaßen dornigen Schnirkel, und eine glatte Mündung.

α ventre transuerſim ſpinoſo.

α der Leib der Quere nach mit Stacheln beſezet.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 186. 295.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 13. *ſ.* 24.

Rumph amb. t. 24. *f.* 2.

Petiv. Gaz. *t.* 21. *f.* 9.

Gualt. Teſt. *t.* 26. *f.* F.

Argenv. Conch. *Pl.* 15. *f.* H.

Seb. Thes. *III. t.* 72. *f.* 1 — 9.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.
Regenſ. Samml. I. 5. *t.* 49. *f.*
Knor. Vergn. I. 17. *t.* 5. *f.*
Mart. Konch. Kab. *II.* 39. *t.* 391 — 893. *f.*
—— —— —— 40. *t.* 394. *f.*

β ventre ſine ſpinis. β der Leib ohne Stacheln.

Rumph. *amb. t.* 24. *f.* 3.
Petiv. amb. t. 21. *f.* 8.
Knor. Vergn. II. 10. *t.* 1. *f.*
Mart. Konch. Kab. *II.* 39. *t.* 393. *f.* 40. *t.* 395-397 *f.*

I. IV. 9. Murex rapiformis. I. IV. 9. Die dicke Rübe.

Belg. Geknobbelde Knoll. *Gall.* Gros-Radix.

Teſta pyriformi, ſpinis fornicatis obtuſis, anfractibus carinatis, roſtro breui, incuruo, umbilicato.

Die birnförmige Schale iſt mit hohlen ſtumpfen Stacheln beſezet, mit kielförmig erhabenen Gewinden, und einem kurzen krummen genabelten Rüſſel.

Teſta pyriformis, ponderoſa. Anfractus ſex, transuerſim ſtriati, carinati, carina ſpinis; fornicatis obtuſis

Die Schale iſt birnförmig, und ſchwer. Die ſechs Gewinde ſind geſtreift, und kielförmig, am Kiele

ruſis coronata. Sutura canaliculata. Spira pyramidata. Labrum intus transverſim ſtriatum. Columella umbilicata; umbilicus latus, profundus, lamelloſus, incurvatus in roſtrum breve inflexum.

mit hohlen ſtumpfen Stacheln gekrönet; Die Nath, rinnenartig ausgehöhlet; Der Schnirkel pyramidenförmig; Die Schalenlefze inwendig in die Quere geſtreifet. Die Spindel genabelt; der breite, tiefe, und blätterichte Nabel iſt in einen kurzen krummen Rüſſel gebogen.

α ſubſpinoſa albida.

α weiß, mit unvollkommenen Stacheln.

Knor. Vergn. V. 21. *t.* 2. *f.*

Mart. Konch. Kab. *III.* 68. *t.* 750. *f.*

β foliaceo ſpinoſa, fuſca.

β braun, mit Blättern und Stacheln beſezet.

Mart. Konch. *Kab. III.* 68. *t.* 754. 755. *f.*

I. IV. 10. Murex lacerus.

I. IV. 10. Der ausgeſchnittene Morgenſtern.

Teſta ovata, oblonga, ſtriata; anfractibus carinatis, ſpinoſis; labro antice ſoluto; columella perforata.

Die eyförmige länglichte geſtreifte Schale hat kielförmige ſtachlichte Gewinde, eine vorne ausgeſchnittene Schalenlefze, mit einer durchbohrten Spindel.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 15. *f.* 11.

Klein. Meth. Oſtr. t. 3. *f.* 56 — 58.

Seb. *Theſ*. *III*. *t*. 60. *f*. 30—32.

Mart. Konch. Kab. *III*. 100. *t*. 951. *f*.

Teſta ouata, utrinque attenuata. Anfractus quinque, transuerſim carinati; carina ſpinis obtuſis muricata. Ventris cingula ſpinoſa b na. Apertura ouato oblonga. Labium antice ſinu a columella ſolutum. Columella umbilicata. Color ex pallido roſeus.

Die eyförmige Schale iſt beiderſeits zugeſpizt. Die fünf Gewinde ſind in die Quere geſtreifet, und kielförmig, an dem Kiele mit ſtumpfen Stacheln beſezet. Um den Leib ſind zween ſtachlichte Bänder. Die Mündung iſt länglicht eyförmig. Die Schalenlefze vorne durch einen Ausſchnitt von der Spindel getrennet. Die Farbe iſt blaß roſenroth.

I. V. Roſtro recto elongato.

I. V. Mit einem geraden verlängerten Rüſſel.

I. V. 1. Murex babylonius.

I. V. 1. Der Babelsthurm.

Linn. *S*. *N*. *Sp*. 549.

Belg. Babilonſe Tooren. *Rumph*. The Babel Shell. *Pet*. *Gall*. La Tour de Babel. *Dav*.

Teſta turrita, cingulis acutis maculatis, labro fiſſo, roſtro elongato recto.

Die gethürmte Schale iſt mit ſcharfen geſleckten Gürteln umgeben, an der Schalenlefze geſpalten, mit einem verlängerten geraden Rüſſel.

Liſt. *Hiſt*. Conch. *l*. 4. *ſ*. 14. *f*. 11.

Rumph. *amb*. *t*. 29. *f*. L.

Gualt. Teſt. *t*. 52. *f*. *N N*.

Ar-

Argenv. Concb. *Pl.* 12. *f.* M.

Seb. Thes. *III.* t. 79. *f.*

Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 7.

Regenſ. Samml. I. 1. *t.* 9. *f.*

Knor. Vergn. IV. 13. *t.* 2. *f.*

— *Del. nat. I. t. B. IV. f.* 6.

Mart. Koncb. Kab. *IV.* 143. *t.* 1331. 1332. *f.*

I. V. 2. Murex javanus. — I. V. 2. Die javaniſche Spindel.

Linn. S. *N.* Sp. 550.

Teſta turrita, transuerſim ſtriata, anfractibus carinato tuberculatis, labro antice ſoluto.

Die gethürmte in die Queere geſtreifte Schale hat kielförmige knottige Gewinde, und eine vorne getrennte Spindellefze.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 79.

Liſt. Hiſt. Concb. *l.* 4. *ſ.* 12. *f.* 9.

Seb. Thes. III. t. 62. *f.* 42.

Knor. Vergn. VI. 27. *t.* 3. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 143. *t.* 1334. 1335. *f.*

I. V. 3. Murex Colus. — I. V. 3. Die franzöſiſche Spindel.

Linn. S. N. Sp. 551.

Belg. Tabaks-Pip. *Rumph. Angl.* Spindle-Shell. *Pet. Gall.* Le Fuſeau.

Teſta turrita, transuerſim ſtriata, carinato nodoſa, labro crenulato, roſtro recto elongato.

Die gethürmte in die Quere geſtreifte Schale hat knottige Kiele, eine gekerbte Spindelleſʒe, und einen geraden verlängerten Rüſſel.

Bonan. Recr. cl. 3. *f.* 360.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 14. *f.* 11.
Rumph. amb. *t.* 29. *f.* F.
Petiv. amb. *t.* 6. *f.* 5.
Gualt. Teſt. *t.* 52. *f.* L.
Argenv. Conch. *Pl.* 9. *f.* E.
Klein. Meth. Oſtr. *t.* 4. *f.* 78.
Seb. Thes. *III. t.* 79. 4. 5.
Regenſ. Samml. I. *t.* 12. *f.* 6.
Knor. Vergn. III. 5. *t.* 1. *f.* 14. *t.* 1. *f.*
Mart. Konch. Kab. *IV.* 144. *t.* 1339—1341. *f.*
—— —— —— 145. *t.* 1343—1344. *f.*
Müll. Linn. Naturſ. IV. 1. *B.* 17. *t.* 3. *f.*
Da Coſt. Elem. *Pl.* 4. *f.* 4.

I. V. 4. Murex Morio.

I. V. 4. Der bandirte Mohr.

Linn.

Linn. S. N. Sp. 552.

Teſta ventrieoſa nigra, faſcia transuerſa alba, ſpirae anfractibus nodoſis, columella rugoſa.

Die bäuchige ſchwarze Schale hat ein weißes Querband, und knottige Schnirkelgewinde mit einer runzelichten Spindel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 357.

Adans. Seneg. Pl. 2. *f.* 31.

Seb. Thes. III. t. 80. *f. plurimae.*

Regenſ. Samml. I. 11. *t.* 61. *f.*

Knor. Vergn. I. 20. *t.* 1. *f.*

—— —— *II.* 6. *t.* 2. *f.*

—— *Del. nat.* I. *t. B.* V. *f.* 4.

Mart. Konch. Kab. *IV.* 139. *t.* 1300. *f.*

I. V. 5. Murex Cochlidium.

I. V. 5. Die indiſche Spindel.

Linn. S. N. Sp. 553.

Belg. Indian. *Gall.* L'Indien.

Teſta ventricoſa, transuerſim ſulcata, anfractibus ſpinis coronatis, roſtro elongato recto.

Die bäuchige Schale iſt der Quere nach gefurchet, an den Gewinden mit Stacheln gekrönet, mit einem verlängerten geraden Rüſſel.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 14. f. 2.
Argenv. Conch. Pl. o. f. A.
Seb. Thes. III. t. 57. f. 27. 28.
Knor. *Vergn.* *VI.* 15. t. 4. f.; 26. t. 2. f.
Mart. Konch. Konch *IV.* 143. t. 1333. f.

I. V. 6. Murex Spirillus.

I. V. 6. Die langſchnabelige Rübe.

Linn. S. N. Sp. 554.

Belg. Langgeſtaarte gladde Knoll. *Gall.* Maſsive liſſe.

Teſta ventricoſa, ſpira acuminata, anfractibus acute marginatis, columellae labio expanſo.

Die bäuchige Schale hat einen zugeſpitzten Schnirkel, ſcharfrandige Gewinde mit einer ausgebreiteten Schalenleſze.

Knor. *Vergn.* *VI.* 24. t. 3. f.
Mart. Konch. Kab. *III.* 115. t. 1069. f.

I. V. 7. Murex canaliculatus.

I. V. 7. Die gezackte Spindel.

Linn. S. N. Sp. 555.

Belg. Raap. *Gall.* Navet a longue queüe.

Teſta

Teſta ventricoſa, ſpirae anfractibus canaliculo diſtinctis.

Die Gewinde der bäuchigen Schale ſind mit einer Rinne von einander abgeſondert.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 13. f. 2.
Valent. Abh. II. t. 92. f.
Gualt. Teſt. t. 47. f. A.
Seb. Thes. III. t. 68. f. 22.
Knor. Delic. nat. I. t. B. VI. f. 4.
Mart. Konch. Kab. III. 67. t. 742. 743. f.

I. V. 8. Murex perverſus.

I. V. 8. Die linksgewundene Feige.

Linn. S. N. Sp. 557.

Angl. The pointed Murex. *Hill.* *Gall.* Buccin unique. *Argenv.*

Teſta ventricoſa, anfractibus ſiniſtrorſis, ſpinoſo coronatis, roſtro elongato recto.

Die bäuchige Schale hat linksgewundene mit Stacheln gekrönte Windungen, und einen geraden verlängerten Rüſſel.

Gualt. Teſt. t. 30. f. B.
Argenv. Conch. Pl. 15. f. F.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 8.
Mus. Caes. Vindobon.

I. V. 9. Murex pugilinus.

I. V. 9. Das unächte Fleiſchhorn.

Teſta ventricoſa, anfractibus canaliculatis, acute coronatis, roſtro recto, extus tranſuerſim ſulcato.

Die bäuchige Schale hat rinnenartig ausgekehlte, und ſpizig gekrönte Windungen, mit einem geraden auswändig in die Quere gefurchten Rüſſel.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 13. f. infra 6.

Gualt. Teſt. t. 47. f. B.

Knor. Vergn. I. 30. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. *IV.* 152. t. 1323. 1324. f.

Teſta ventricoſa, craſſa. Anfractus ſeptem, infra ſuturam canaliculati, in medio carinati; carina ſpinis acutis breuibus coronata. Venter laeuis, ſpira, & roſtrum rectum, tranſuerſim undulato ſtriata. Columella ſubumbilicata. Color fuluus, aut pallide luteus.

Die Schale iſt bäuchich, und dick. Die ſieben Gewinde ſind unter der Nath rinnenartig ausgekehlet, in der Mitte kielförmig erhaben, und allda mit kurzen ſpizigen Stacheln gekrönet. Der Leib iſt glatt, der Schnirkel, und der gerade Rüſſel in die Quere wellenförmig geſtreifet. Die Spindel einigermaßen genabelt. Von gelbrother, oder blaßgelber Farbe.

I. V. 10. Murex aruanus.

I. V. 10. Die zweykielige Spindel.

Linn. S. N. Sp. 556.

Teſta

Teſta oblonga ventricoſa, anfractibus bicarinatis, roſtro elongato,

Die längliche bäuchige Schale hat zwey erhabene kielförmige Gürteln, und einen verlängerten Rüſſel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 101.

Rumph. amb. t. 28. *f. A.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 138. *t.* 1295. 1296. *f.*

I. V. 11. Murex deſpectus.

I. V. 11. Die nordiſche Spindel.

Linn. S. *N. Sp.* 559.

Belg. Noordſche Wulk. *Angl.* The common english Whelk. *Da Coſt.*

Teſta oblonga ventricoſa, anfractibus teretibus, roſtro recto.

Die längliche bäuchige Schale hat runde Gewinde, und einen geraden Rüſſel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 190.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 14. *f.* 4. ; *ſ.* 15. *f.* 15.

Linn. It. weſtg. t. 5. *f.* 8.

Seb. Thes. *III. t.* 83. *f.* 3 — 6.

Da Coſt, Elem. *Pl.* 1. *f.* 3 — 5.

Mart. Konch. Kab. *IV.* 136. *t.* 1292. 1294. *f.*

I. V. 12. Murex Tritonis.

I. V. 12. Die Tritonsſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 560.

Belg. Kink-Hoorn, *Rumph.* *Angl.* Tritons-trumpet. *Pet.* *Gall.* Trompe marine *Dav.*

Teſta oblonga, anfractibus teretibus, prope ſuturam crenulatis, varicibus longitudinalibus, apertura denticulata.

Die längliche Schale hat runde an der Nath gekerbte Windungen, mit nach der Länge laufenden Näthen, und einer gezähnelten Mündung.

Sulci tranſuerſi, ſtriati. Apex roſeus.

Nach der Quere laufen geſtreifte Furchen. Die Spize iſt roſenroth.

α attenuata roſea, & luteſcens immaculata.

α ſchmal, von roſenrother, oder gelblicher Farbe ohne Flecken.

Mart. Konch. Kab. IV. 134. t. 1278. 1279. f.

β ventricoſa, albo fuſcoque variegata.

β bäuchig, weiß und braun gefleckt.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 188.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 15. f. 12. 13.

Rumph. amb. t. 28. f. B.

Petiv. Gaz. t. 12. f. 15.

Gualt. Teſt. t. 48. f. A.

Seb.

Seb. Thes. III. t. 81. *f. omnes.*
Knor. Vergn. II. 16. *t.* 2. 3. *f.*
—— —— *V.* 5. *t.* 1. *f.*
—— *Del. nat. I. t. B. VI. f.* 1.
*Mart.*Konch.Kab. *IV.* 134. *t.* 1277. *f.*
—— —— 136. 1282. 1283. *f.*

I. V. 13. Murex Puſio.

I. V. 13. Die gefleckte Spindel.

Linn. S. N. Sp. 561.

Belg. Gnemoe-Hoorn,

Teſta oblonga, ventricoſa, laeui, anfractibus rotundatis, apertura laeui, roſtro breui.

Die längliche bäuchige glatte Schale, hat runde Gewinde, eine glatte Mündung, ſamt einem kurzen Rüſſel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 40.?
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 14. *f.* 7.
Gualt. Teſt. *t.* 52. *f.* 3.
Knor. Vergn. IV. 21. *t.* 7. *f.*
Mart. Konch. Kab. *IV.* 97. *t.* 1357. *f.*

I. V. 14. Murex accinctus.

I. V. 14. Die Gürtelſpindel.

Teſta

Teſta fuſiformi, laeui, fuſca, anfractibus conuexis, faſcia articulata alba, roſtro recto breui.

Die ſpindelförmige glatte Schale hat an den bäuchigen Gewinden einen gegliederten weißen Gürtel, mit einem kurzen geraden Rüſſel.

Mart. Konch. Kab. *IV*. 127. *t*. 1281. 1219. *f*.

Teſta fuſiformis, laeuis. Anfractus octo conuexi, attenuati, connati. Apertura ouato oblonga. Labrum intus ſtriatum. Columella laeuis, ſupra plica una transuerſa. Baſis extus transuerſim ſtriata, conſtituens roſtrum abbreuiatum, rectum. Color atro fuſcus, cingulo anguſto anfractuum albo, lineis angulatis rufis articulato.

Die Schale iſt ſpindelförmig und glatt. Die acht bäuchigen zuſammengewachſenen Gewinde verdünnen ſich. Die Schalenlefze iſt inwändig geſtreifet. Die Spindel glatt, und oben mit einer Querfalte verſehen. Der Grund iſt von außen in die Quere geſtreifet, und bildet einen geraden verkürzten Rüſſel. Von ſchwarzbrauner Farbe mit einer weißen ſchmalen Querbinde, die durch rothbraune Winkelzüge unterbrochen wird.

I. V. 15. Murex vulpinus.

I. V. 15. Die rothbraune Spindel.

Teſta oblonga, ventricoſa, glabra, baſi, anfractuumque marginibus ſtriatis, roſtro breui, torto.

Die längliche bäuchige glatte Spindel iſt an dem Rande der Windungen geſtreifet, und mit einem kurzen gedrehten Rüſſel verſehen.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta oblonga. Anfractus octo laeues, teretiuſculi, prope ſuturam transuerſim ſtriati. Venter conuexus ſubtus transuerſim ſtriatus, deſinens in roſtrum breue extus intortum. Apertura laeuis. Color ex fuſco ruber.

Die Schale iſt länglich. Die acht Gewinde glatt, rund, an der Nath in die Quere geſtreiſet Der erhabene Leib iſt unten der Quere nach geſtreiſet, und endiget ſich in einen kurzen, auswändig gedrehten Rüſſel. Die Mündung iſt glatt. Von braunrother Farbe.

I. V. 16. Murex Tulipa.

I. V. 16. Die Achatbirne.

Linn. S. *N.* *Sp.* 562.

Belg. Agaate - Peer. *Rumph. Gall.* L'Agathine. *Dav.*

Teſta oblonga ventricoſa, laeui, anfractibus rotundatis, ſutura geminata, columella uniplicata, roſtro patulo ſtriato.

Die längliche bäuchige glatte Schale hat runde mit einer zweyfachen Nath verſehene Gewinde, mit einer Falte an der Spindel, ſamt einem erweiterten geſtreiſten Rüſſel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 187.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 14. *f.* 1. 2.
Rumph. amb. *t.* 49. *f.* *H.*
Gualt. Teſt. *t.* 46. *f.* *A.*
Argenv. Conch. *Pl.* 13. *f.* K.
Seb. Thes. *III.* *t.* 71. *f.* 23 — 31.
Regenſ. Samml. I. 9. *t.* 35. *f.*

Knor. Vergn. V. 18. *t.* 5. *f.*
—— —— *VI.* 29. *t.* 1. *f.*
Mart. Konch. Kab. *IV.* 136. *t.* 1286. *f.*
—— —— —— 137. *t.* 1288. 1289. *f.*

I. V. 17. Murex Dolarium.

I. V. 17. Die Vortreppe.

Linn. S. N. Sp. 564.

Belg. Boſtrappen.

Teſta ventricoſa, coſtis obtuſis angulatis, labro plicato, columella umbilicata.

Die bäuchige Schale hat ſtumpfe, eckige Ribben, eine gefaltene Spindelleſze, ſamt einer genabelten Spindel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 347.
Seb. Thes. *III. t.* 52. *f.* 11.
Knor. Vergn. V. 3. *t.* 5. *f.*

I. V. 18. Murex lignarius.

I. V. 18. Die Holzſpindel.

Linn. S. N. Sp. 566.

Teſta

Teſta oblonga, anfractibus longitudinaliter plicatis, obtuſe nodoſis, roſtro abbreuiato.

Die längliche Schale hat ſtumpfknottige nach der Länge gefaltene Windungen mit einem verkürzten Schnabel.

Fulua, faſcia ventris niuea.

Rothgelb, mit einer weißen Querbinde um den Leib.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 32.

Seb. *Thes.* *III.* *t.* 52. *f.* 4.

Knor. *Vergn.* *VI.* 20. *t.* 7. *f.*

I. V. 19. Murex Trapezium.

I. V. 19. Die Bandſpindel.

Linn. S. *N.* *Sp.* 567.

Belg. Gebaande Knobbel-Hoorn. *Rumph.* *Gall.* Le Tapis. *Dav.*

Teſta oblonga, anfractibus carinato angulatis, apertura dentata, roſtro recto.

Die längliche Schale hat kielförmige eckige Windungen, eine gezähnte Mündung, mit einem geraden Schnabel.

Lineis transuerſis, geminatis fuſcis.

Mit gepaarten braunen Querſtreifen.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 287.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 14. *f.* 26.

Rumph. *amb.* *t.* 49. *f.* K.

Gualt. Teſt. t. 46. *f. B.*

Argenv. Concb. Pl. 10. *f. H.*

Seb. Thes. III. *t.* 79. *f.* 1.

Knor. Verg. IV. 20. *t.* 1. *f.*

—— —— *V.* 10. *t.* 4. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 139. *t.* 1298. 1299. *f.*

I. V. 20. Murex craticulatus.

I. V. 20. Die Wellenſpindel.

Linn. Sp. N. Sp. 569.

Teſta fuſiformi longitudinaliter rugoſa, cingulis eleuatis acutis, labro dentato, roſtro recto.

Die ſpindelförmige Schale iſt der Länge nach gerunzelt, und in die Quere mit erhabenen ſcharfen Ringen umgürtet, an der Schalenlefze gezähnt, mit einem geraden Rüſſel.

Niuea, maculis longitudinalibus croceis.

Schneeweiß, mit nach der Länge laufenden ſafranrothen Flecken.

Liſt. Hiſt. Concb. *l.* 4. *ſ.* 15. *f.* 22.

Knor. Vergn. II. 3. *t.* 6. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 149. *t.* 1382. 1383. *f.*

I. VI. Turriti, roſtro breui.

I. VI. Gethürmte, mit kurzem Rüſſel.

I. VI. 1. Murex Vertagus.

I. VI. 1. Die Schnauzennadel.

Linn. S. *N.* Sp. 571.

Belg. Witte Tuitje. *Rumph. Angl.* White ſnouted Peg. *Petiv. Gall.* Chenille blanche. *Dav.*

Teſta turrita, anfractibus ſuperne plicatis, roſtro aſcendente, columella biplicata.

Die gethürmte Schale hat oben gefaltene Windungen, einen aufgerichten Rüſſel, und zwo Falten an der Spindel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 84.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 15. *f.* 83.
Petiv. Gaz. *t.* 56. *f.* 4.
—— *amb.* *t.* 13. *f.* 14.
Rumph. *amb.* *t.* 30. *f.* K.
Gualt. Teſt. *t.* 57. *f.* D.
Argenv. Conch. *Pl.* 11. *f.* P.
Adans. Seneg. *Pl.* 10. *f.* 2.
Knor. *Vergn.* III. 20. *t.* 3. *f.*
—— —— *V.* 15. *t.* 6. *f.*
—— —— *VI.* 40. *t.* 4. 5. *f.*
Murr. Fund. *Teſt.* *t.* 1. *f.* 28.
Müll. Linn. *Naturſyſt.* *VI.* *B.* 17 *t.* 4 *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV*. 156. *t.* 1479. *f.*
——— ——— ——— 157. *t.* 1480. 2488. *f.*

I. VI. 2. Murex ſulcatus.

I. VI. 2. Die Mangesnadel.

Belg. Mauger - Naalde. *Rumph.* *Angl.* Mango's Peg. *Pet.*

Teſta turrita, longitudinaliter rugoſa, transuerſim ſulcata, labro ampliato, roſtro breuiſſimo recto.

Die gethürmte Schale iſt in die Länge gerunzelt, der Quere nach gefurchet, an der Schalenlefze ausgebreitet, mit einem ſehr kurzen geraden Rüſſel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 68.
Rumph. *amb.* *t.* 30. *f.* T.
Petiv. *amb.* *t.* 13. *f.* 22.
Mart. Konch. Kab. *IV*. 157. *t.* 1484-1485. *f.*

Teſta turrita. Anfractus undeni, decliues, plani, longitudinaliter rugoſi, transuerſim ſulcati. Labrum ampliatum, acute marginatum, antice ſolutum. Columella vix labiata. Angulo labro oppoſito. Roſtrum breuiſſimum, rectum. Color fuſcus.

Die Schale iſt gethürmet. Die eilf Gewinde ſind abhängig flach, nach der Länge mit Runzeln, in die breite mit Furchen beſezet. Die Schalenlefze iſt ausgebreitet, ſcharfrandig und vorne abgeſondert. An der Spindel iſt kaum eine Lefze. Der Schalenlefze gegen über ſtehet eine hervorragende Ecke. Der Rüſſel iſt ſehr kurz und gerad. Die Farbe braun.

I. VI. 3. Murex gibboſus.

Teſta turrita anfractibus marginatis, ventre gibbo; labro fiſſo, denticulato, roſtro breui.

I. VI. 3. Die höckerige Stachelnadel.

Die gethürmte Schale iſt an den Windungen eingeſäumet, auf dem Rücken höckerig, an der geſpaltenen Schalenlefze gezähnelt, und mit einem kurzen Rüſſel verſehen.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta turrita. Anfractus circiter nouem transuerſim ſtriati, plicis longitudinalibus decuſſati, ſupra prope ſuturam compreſſo marginati. Venter tubere dorſali gibbus. Apertura oblonga. Labrum ſupra ſinu transuerſo lato fiſſum, margine denticulatum. Columella replicata, laeuis. Roſtrum rectum, breue. Color albus, maculis pallide rubris.

Die Schale iſt gethürmet. Die Gewinde, deren beiläufig neun ſind, geſtreifet, mit nach der Länge laufenden Falten durchkreuzet, und oben an der Nath mit einem eingedrückten Rande verſehen. Der Leib hat auf den Rücken einen Höcker. Die Mündung iſt länglich. Die Schalenlefze durch einen breiten Queerausſchnitt geſpalten, am Rande gezähnelt. Die Spindel iſt übergeſchlagen, und glatt. Der Rüſſel gerad, und kurz. Von weißer Farbe mit blaßrothen Flecken.

I. VI. 4. Murex Aluco.

I. VI. 4. Die gefurchte Dornſpindel.

Linn. S. N. Sp. 572.

Belg. Weſt Indiſche Pauſe-Kroon. *Rumph. Angl.* Knopped Popes Crown. *Petiv.*

Teſta turrita, anfractibus transverſim ſulcatis in medio tuberculatis, columella uniplicata, roſtro aſcendente.

Die gethürmte Schale hat nach der Quere gefurchte, in der Mitte mit Knoten beſezte Gewinde, zwo Falten an der Spindel, und einen aufgerichten Rüſſel.

α albida.

α weißlich.

β alba, maculis lineisque fuſcis.

β weiß, mit braunen Flecken und Strichen.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 67.
Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 15. *f.* 87.
Rumph. *amb.* t. 30. *f.* O.
Petiv *amb.* *t.* 7. *f.* 12.
Gualt. *Teſt.* *t.* 57. *f.* G.
Argenv. Conch. *Pl.* 11. *f.* H.
Seb. Thes. *III.* *t.* 51. *f.* 25. *t.* 50. *f.* 15. 16.
Knor. *Vergn.* I. 16. *t.* 4. *f.*
Mart. Konch. *Kab.* *IV.* 156. t. 1473. 1474. *f.*

I. VI. 5. Murex coronatus.

I. VI. 5. Die gedornte Schnepfennadel.

Belg. Gedoornde Snuite Pen. *Rumph.* *Angl.* The roughſeren Shell. *Hill.*

Teſta

Teſta turrita, ſubſtriata, anfractibus coronatis, columella uniplicata, roſtro aſcendente.

Die gethürmte Schale iſt einigermaßen geſtreifet, an den Gewinden gekrönet, mit einer Falte an der Spindel, und einen aufgerichteten Rüſſel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 69.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 15. *f.* 79.
Rumph. *amb. t.* 30. *f. N.*
Petiv. amb. t. 13. *f.* 23.
Gualt. Teſt. *t.* 57. *f. A.*
Hill. Hiſt. of. *Anim. Pl.* 7.
Knor. Vergn. III. 16. *t.* 5. *f.*
Mart. Konch. Kab. *IV.* 156. *t.* 1478. *f.*

Teſta turrita ſubſtriata. Anfractus undeni, ſubtus laeues, in medio ſpinis procumbentibus coronati, prope ſuturam attenuati. Apertura, & roſtrum praecedentis. Color albidus, maculis latis, fuſcis,

Die Schale iſt gethürmet, und einigermaßen geſtreifet. Die eilf Gewinde ſind unten glatt, in der Mitte mit darniederliegenden Dornern gekrönet, nächſt der Nath verengert. Die Mündung und der Rüſſel iſt wie bei der vorhergehenden Art. Weißlich mit braunen Flecken.

I. VI. 6. Murex litteratus.

I. VI. 6. Die Buchſtabennadel.

Teſta ventricoſa turrita, nigro maculata, columella uniplicata, roſtro breui.

Die bäuchig gethürmte ſchwarzgefleckte Schale hat an der Spindel eine Falte, und einen kurzen Rüſſel.

Liſt

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 15 f. 89.
Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ventricoſa, turrita. Anfractus circiter octo coaliti, ſupra prope ſuturam ſpinis erectis breuibus muricati. Apertura ampliata. Columella uniplicata, Roſtrum breue, rectum. Color niueus, maculis punctatis, characteres nonnunquam aemulantibus, nigris.

Die Schale iſt bäuchig und gethürmet. Die acht Gewinde ſind zuſammengewachſen, und oben mit kurzen aufgerichteten Dörnern beſezet. Die Mündung iſt erweitert. Die Spindel hat eine Querfalte. Der Rüſſel iſt kurz, und gerad. Die Farbe ſchneeweiß, mit ſchwarzen punktirten Flecken, die bisweilen buchſtabenähnliche Zeichnungen bilden.

I. VI. 7. Murex fuſcatus.

Linn. S. N. Sp. 573.

I. VI. 7. Die gezackte Beſansſpindel.

Belg. Getaakte Bezaanknop. *Gall.* Obeliſce chinois. *Dav.*

Teſta turrita, anfractibus ſpinoſis, prope ſuturam crenulatis, baſi planiuſcula.

Die gethürmte Schale hat ſtachlichte, an der Nath gekerbte Windungen, und einen etwas flachen Boden.

α alba.

β ex fuſco luteo.

γ atro fuſca.

α weiß.

β braungelb.

γ ſchwarzbraun.

Gualt. Teſt. t. 56. f. E. H.
Argenv. Conch. Pl. 11. f. L.

Knor.

Knor. Vergn. III. 26. t. 4. 5. f.

I. VI. 8. Murex Radula. I. VI. 8. Die Nadelfeile.

Linn. S. *N.* Sp. 575.

Teſta turrita, anfractibus ſerie triplici punctatis, baſi planiuſcula ſulcata.

Die gethürmte Schale hat auf den Gewinden eine deeyfache Reihe hervorſtehender Punkte, mit einem etwas flachen gefurchten Boden.

α alba. α weiß.

Knor. Vergn. III. 15. t. 3. f.

β cingulis albis, rufis, fuſcisque. β mit weißen, rothbraunen und dunkelbraunen Gürteln bemalet.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 327.
Gualt. Teſt. *t.* 58. *f.* F.
Mus. Caes. Vindobon.

I. VI. 9. Murex atratus. I. VI. 9. Die ſchwarze Stachelnadel.

Teſta turrita, atra, anfractibus transuerſim ſtriatis, tuberculatis, columella uniplicata, roſtro recto.

Die gethürmte ſchwarze Schale hat knottige, in die Quere geſtreifte Windungen, eine Falte an der Spindel, mit einen geraden Rüſſel.

Teſta turrita. Anfractus decem, coaliti, tranſuerſim ſtriati, duplici tuberculorum acutorum, & breuium ſerie cincti. Apertura oblonga. Labrum dilatatum, crenulatum. Columella uniplicata. Angulus labri margini oppoſitus. Roſtrum rectum, breue. Color, ater, nitens.

Die Schale iſt gethürmet. Die zehen Gewinde ſind zuſammengewachſen, und mit einer doppelten Reihe kurzer ſpiziger Körnchen umgeben. Die Mündung iſt länglich. Die Schalenlefze erweitert, und fein gekerbet. Die Spindel hat eine Querfalte. Der Spindellefze gegenüber ſtehet eine hervorragende Ende. Der Rüſſel iſt gerad und kurz. Die Farbe iſt glänzend ſchwarz.

K. Trochus.

K. Die Kräuſelſchnecke.

Teſta ſpiralis. Apertura angulata, coarctata. Columella obliquata.

Die Schale iſt ſchnirkelförmig gewunden. Die Mündung eckig, und eingefaßt. Die Spindel ſtehet etwas ſchief.

K. I. Columella perforata.

K. I. Mit durchbohrter Spindel.

K. I. 1. Trochus niloticus.

K. I. 1. Die glatte Pyramide.

Linn. S. N. Sp. 579.

Belg.

Belg. Gevlakte Tol. *Rumph.* *Angl.* The great waved Top. *Pet.* *Gall.* Le Sabot marbré. *Argenv.*

Teſta conica, anfractibus conuexiuſculis laeuibus, columella perforata.

Die kegelförmige Schale hat einigermaßen erhabene glatte Gewinde, und einen durchbohrten Spindel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *t.* 102.
Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 8. *f.* 3.
Rumph. *amb.* *t.* 21. *f.* *A.*
Gualt. *Teſt.* *t.* 59. *f.* B. C.
Argenv. Conch. *Pl.* 8. *f.* C.
Gev. *Beluſt.* 5. *t.* 33 — 35.
Regenſ. *Samml.* I. 4. *t.* 42. *f.*
Knor. *Vergn.* I. 12. *t.* 1. *f.*
—— —— *II.* 5. *t.* 1. *f.*; 6. *t.* 1. *f.*

K. I. 2. Trochus maculatus.
Linn. *S. N.* *Sp.* 580.

K. I. 2. **Die knottige Pyramide.**

Belg. Bagyne-Drolle. *Rumph.*

Teſta conica, tuberculata, umbilico obliquo, labio bilobo.

Die kegelförmige kleinknottige Schale hat einen ſchiefen Nabel, und einen zweyfachen Lappen an der Schalenlippe.

a co-

α conica, anfractibus transuerſim ſtriatis; albida, rubro maculata.

α kegelförmig, mit in die Quere geſtreiften Windungen; weiß, mit rothen Flecken.

Gualt. Teſt. t. 61. *f.* E.
Knor. Vergn. II. 2. *t.* 4. 5. *f.*
Müll. Linn. *Nat. Syſt. VI.* 1. *B.* 18. *t.* 1. *f.*
Murr. Fund. *Teſt. t.* 1. *f.* 20.
Da Coſt. Elem. *Pl.* 3. *f.* 13.

β conica, anfractibus oblique rugoſis, prope ſuturam compreſſis; alba, viridisque, rubro maculata.

β kegelförmig, mit ſchiefrunzlichten, an der Nath zuſammengedrückten Windungen; weiß, und grün, mit rothen Flecken.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 8. *f.* 5.
Rumph. amb. t. 21. *f.* 3.
Gev. Beluſt. 7. *t.* 52 *f.*

γ conica attenuata, anfractibus transuerſim ſtriatis, prope ſuturam compreſſis; viridis fuſco maculata.

γ ſpizkegelförmig, mit in die Quere geſtreiften, an der Nath zuſammengedrückten Windungen; grün mit braunen Flecken.

Gualt. Teſt. t. 61. *f.* D. D.
Gev. Beluſt. 7. *t.* 48. *f.*
Regenſ. *Samml.* I. 2. *t.* 13. *f.*

K. I. 3. Trochus perſpectiuus.

K. I. 3. Die Perſpektivſchnecke.

Linn. S. *N.* *Sp.* 581.

Belg. Perſpectiv - Hoorn. *Rumph.* *Angl.* Spinnet - Shell. *Petiv.* *Gall.* Le Cadran. *Dav.*

Teſta conuexo conica, anfractibus decuſſatim ſtriatis, umbilico lato crenato.

Die gewölbt kegelförmige Schale hat kreuzweiſe geſtreifte Windungen, und einen weiten gekerbten Nabel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 27. 28.
Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 8. *f.* 24.
Rumph. *amb.* *t.* 27. *f.* L.
Petiv. *amb.* *t.* 2. *f.* 14.
Gualt. *Teſt.* *t.* 65. *f.* O.
Argenv. Conch. *Pl.* 9. *f.* *M.*
Gev. *Beluſt.* 25 *t.* 266 — 272 *f.*
Seb. *Thes.* *t.* 40. *f.* 1, 2, 13, 14, 28, 41, 42.
Regenſ. *Samml.* *I.* 6. *t.* 61. *f.*
Knor. *Vergn.* *I.* 11. *t.* 1. 2. *f.*

K. I. 4. Trochus pharaonius.

K. I. 4. Die Pharaoſchnecke.

Linn. S. *N.* Sp. 584.

Belg.

Belg. Prins Roberts Knop, *Gall.* Bonton de Camiſole. *Dav.*

Teſto ſubouata, ſtriata, punctis concatenatis globoſis, columella labioque dentato, umbilico crenato.

Die faſt eyförmige geſtreifte Schale iſt mit kettenförmig aneinanderſtehenden runden Körnern umgeben, an der Spindel und Schalenlefze gezähnt, am Nabel gekerbet.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 222.?
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 8. *f.* 25.
Petiv. Gaz. *t.* 14. *f.* 10.
Gualt. Teſt. *t.* 63. *f.* B.
Argenv. Conch. *Pl.* 11. *f.* L. Q.
Adans. Seneg. *Pl.* 12. *f.* 2.
Gev. Beluſt. 13. *t.* 101 — 107. *f.*
Knor. *Vergn.* I. 30. *t.* 6. *f.*
—— —— *IV.* 26. *t.* 3. 4. *f.*

K. I. 5. Trochus Magus.

K. I. 5. Der Hexenmeiſter.

Linn. *S. N. Sp.* 585.

Belg. Tovenaar. *Gall.* Le Sorciere. *Dav.*

Teſta umbilicata ſtriata: anfractibus ſupra plicatis.

Die genabelte und geſtreifte Schale hat an dem Oberrande gefaltene Windungen.

Gualt.

Gualt. Teſt. t. 64. f. C.
Argenv. Conch. Pl. 11. f. S.
Gev. Beluſt.. 13. t 127. f.
Knor. Vergn. VI. 27. t. 4. f.

K. I. 6. Trochus cinerarius.

Linn. S. N. Sp. 590.

Teſta umbilicata, conica, anfractibus prope ſuturam canaliculatis.

Alba, faſciis oblique fuſcis.

K. I. 6. Der ſchiefſtrahlige Kräuſel.

Die genabelte kegelförmige Schale iſt an der Nath ausgekehlet.

Weiß, mit ſchiefen braunen Querbändern.

Mus. Caes. Vindobon.

K. I. 7. Trochus umbilicatus.

Linn. S. N. Sp. 592.

Teſta conuexa, conica, anfractibus ſubſtriatis, umbilico cylindraceo.

K. I. 7. Die Wirbelſchnecke.

Die gewölbte kegelförmige Schale hat geſtreifte Gewinde und einen walzenförmig ausgehöhlten Nabel.

Mus. Caes. Vindobon.

K. I. 8.

K I. 8. Trochus faſciatus.

Teſta conica, laeui, anfractibus rotundatis ſupra compreſſis, umbilico profundo, labro crenulato.

K. I. 8. Die gebänderte Kräuſelſchnecke.

Die kegelförmige glatte Schale hat rundliche oben eingedrückte Gewinde, einen tiefen Nabel, mit einer gekerbten Spindelleſze.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta conica. Anfractus quinque rotundati, ſupra prope ſuturam complanati. Umbilicus verticalis profundus. Labium crenulatum. Color albidus, fuſco maculatus, faſcia transuerſa roſea.

Die Schale iſt kegelförmig. Ihre fünf rundliche Gewinde ſind oben an der Nath etwas flach gedrücket. Der Nabel iſt tief und ſenkrecht. Die Schalenleſze fein gekerbet. Die Farbe weiß mit braunen Flecken, und einem roſenrothen Querbande.

K. I. 9. Trochus teſſulatus.

Teſta conica, anfractibus rotundatis transuerſim ſtriatis, columella obſolete perforata.

K. I. 9. Der Würfelkräuſel.

Die kegelförmige Schale hat rundliche, in die Quere geſtreifte Windungen, und eine durchbohrte Spindel.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta

Teſta conuexo conica. Anfractus quinque transuerſim ſtriati, conuexiuſculi, decliues. Columella uniloba, replicata, obtegens foramen obliquum, tenue. Color albidus, luteo maculatus, teſſulis oblongis purpureis ſeriatim digeſtis, infra hunc corticem margaritaceus.

Die Schale iſt gewölbt kegelförmig. Die fünf Gewinde ſind in die Quere geſtreifet, etwas bäuchig, und abhängig. Die Spindel hat eine lappenförmige Ecke, und bedecket durch ihren Ueberſchlag das ſchiefe dünne Nabelloch. Die Farbe iſt weiß, mit gelben Flecken, und länglichen purpurrothen reiheweiſe ſtehenden Flecken; unter dieſer Rinde perlenmutterartig.

K. I. 10. Trochus ſolaris.

Linn. S. N. Sp. 593.

Belg. Zonne-Hoorn.

K. I. 10. Das Sonnenhorn.

Teſta umbilicata complanato conica, anfractibus ſpinoſo radiatis, apertura ſemicordata.

Die genabelte flachgedrückte kegelförmige Schale hat um die Gewinde ſtachlichte Strahlen, und eine halb herzförmige Mündung.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 366. 367.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 8. *f.* 9.
Rumph. amb. t. 20. *f.* K.
Gualt. Teſt. *t.* 65. *f. N.* P.
Argenv. Conch. *Pl.* 8. *f. H.*
Gev. Beluſt. 20. *t.* 192 *f.*
Knor. *Vergn. VI.* 26. *t.* 4. *f.*

K. II. 1. Trochus Pyramis.

K. II. 1. Die Spizſäule.

Teſta conica acuminata; anfractibus imbricatis, ſeriatim granuloſis; columella contorta imperforata.

Die kegelförmige zugeſpizte Schale hat ziegelförmig auf einander liegende, reiheweiſe mit Körnern beſezte Gewinde, mit einer krummgedrehten undurchbohrten Spindel.

Gev. Beluſt. 9 *t.* 68 *f.*

Knor. Vergn. I. 12. *t.* 4. *f.*

Teſta conica. acuminata. Anfractus duodecim plani decliues, ſerie tranſuerſa triplici granulorum cincti; margine inferiore imbricato, prominente, crenato, acuto. Baſis plāna, tranſuerſim ſtriata. Color pallide vireſcens, fuſco luteoue maculatus; infra corticem argenteus.

Die Schale iſt kegelförmig und zugeſpizt. Die zwölf Gewinde ſind abhängig, flach, mit einer dreyfachen Reihe Körnchen beſezet, am ziegelförmiggeſtellten ſcharfen hervorragenden Unterrande gekerbet. Der Grund iſt flach, und der Quere nach geſtreift. Blaßgrün mit braunen, oder gelben Flecken; unter der Rinde mit einem ſilberartigen Glanz.

K. II. 2. Trochus veſtiarius.

K. II. 2. Das Wulſtknöpfchen.

Linn. S. N. Sp. 594.

Belg. Bultslakja. *Gall.* Bouton de Camiſole. *Dav.*

Teſta

Teſta conico orbiculata laevi, columellae baſi calloſa.

Die plattkegelförmige ſcheibenrunde Schale hat am Boden der Spindel einen erhabenen Wulſt.

α rubella, cingulo albo.

α röthlich, mit einem weißen Gürtel.

β cinerea, cingulo albo fuſcoque.

β aſchengrau, mit einem weiß und braun gegliederten Gürtel.

γ alba, radiis obliquatis griſeis.

γ weiß, mit ſchiefen hellgrauen Strahlen.

δ plumbea, cingulo albo reticulato.

δ bleyförmig, mit einem weißgegliederten Gürtel.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *f.* 8. *f.* 64.
Petiv. Gaz. *t.* 11. *f.* 6.
Gualt. Teſt. t. 65. *f.* E. F. G.
Gev. Beluſt. 19. *t.* 189. *f.*
Knor. Vergn. VI. 22. *t.* 7. *f.*

K. II. 3. Trochus Labio.
Linn. S. N. Sp. 595.

K. II. 3. Die Dicklippe.

Belg. Diklip. *Angl.* Thick-lipt Top. *Petiv.*

Teſta imperforata, ouata, ſtriato tuberculata, apertura dentata, incraſſata; columella unidentata.

Die undurchbohrte eyförmige mit Streifen und Knotten beſezte Schale hat eine gezähnte dicke Lippe, und an der Spindel einen Zahn.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 8. f. 25. 26.
Rumph. amb. t. 21. f. E.
Petiv. amb. t. 12. f. 1.
Gev. Beluſt. 18. t. 165. f.
Mus. Caes. Vindobon.

K. II. 4. Trochus turbinatus.

K. II. 4. Der türkiſche Bund.

Belg. Tulbande.

Teſta ouata, laeui, anfractibus conuexis, columella unidentata, imperforata.

Die eyförmige Schale hat erhabene Gewinde, mit einem Zahne an der undurchbohrten Spindel.

α alba, maculis oblongis nigris.

α weiß, mit länglichen ſchwarzen Flecken.

β alba, venulis cingulisque articulatis nigris.

β weiß, mit ſchwarzen Adern, und gegliederten Gürteln.

γ alba, venulis, cingulisque articulatis purpureis.

γ weiß, mit purpurrothen Adern, und gegliederten Gürteln.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 4. ſ. 8. f. 33. 34. 35.
Gualt. Teſt. t. 63. f. D. E. G.
Argenv. Conch. Pl. 6. f. N.
Gev. Beluſt. 20. t. 197. 198. 200. 201. f.
Knor. Vergn. I. 10. t. 6. 7. f.

Teſta ouata, Anfractus ſex, conuexi, laeues contigui. Apertura lunata. laeuis. Columellae labium unidentatum.

Die Schale iſt eyförmig. Die ſechs Gewinde ſind erhaben, glatt, und aneinander verwachſen. Die Mündung mondförmig, und glatt. Die Spindelleſze mit einem Zahne verſehen.

K. II. 5. Trochus Tuber.

K. II. 5. Der Knottenbund.

Linn. S. N. Sp. 596.

Teſta imperforata conica, anfractibus ſubcarinatis utroque margine nodoſis.

Die Gewinde der undurchbohrten kegelförmigen Schale ſind einigermaßen kielförmig, und an jedem Rande knottig.

Argenv. Conch. Pl. 9. f. R.?
Gev. Beluſt. 19 t. 179 f.
Regenſ. Samml. 3. t. 27. f.
Knor. Vergn. I. 3. t. 2. f.

K. II. 6. Trochus Conulus.

K. II. 6. Der Schnurbund.

Linn. S. N. Sp. 598.

Teſta imperforata conica ſtriata; anfractibus linea elevata interſtinctis.

Die undurchbohrte kegelförmige geſtreifte Schale hat die Gewinde durch eine erhabene Querlinie abgeſondert.

Liſt. angl. t. 3. f. 15.
Bonan. Recr. cl. 3. f. 91. 99.
Gualt. Teſt. t. 61. f. M.
Klein. Meth. Oſtrac. t. 2. f. 36.
Gev. Beluſt. 9. t. 69, 70. f.
Knor. Vergn. VI. 27. t. 5. f.

K. II. 7. Trochus Zyziphinus.

K. II. 7. Der Jujubenkräuſel.

Linn. S. N. Sp. 599.

Teſta imperforata, conica, laevi, anfractibus marginatis.

Die undurchbohrte kegelförmige glatte Schale hat eingeſäumte Windungen.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 93.
Rumph. amb. t. 21. f. 1.

Petiv.

Gualt. Teſt. t. 91. f. B. C.

Argenv. Conch. Pl. 9. f. N.

Knor. Vergn. III. 14. t. 2. 3. f.

K. II. 8. Trochus granulatus.

Teſta imperforata, conica, ſtriis transuerſis tenuiſſimis, & granulatis, alternatim majoribus; ſuturis emarginatis.

K. II. 8. Der gekörnte Kräuſel.

Die undurchbohrte kegelförmige Schale iſt der Quere nach mit dünnen, und fein gekörnten Streifen von abwechſelnder Größe umgürtet, und an den Näthen eingeſäumet.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta conica, ventricoſa. Anfractus circiter decem, transuerſim ſtriati; ſtriis alternatim majoribus, & granulis moniliformi ſerie cinctis, ſupra prope ſuturam linea eleuata marginatis. Baſis conuexiuſcula, ſtriis majoribus rufo articulatis. Color griſeus, faux margaritacea.

Die Schale iſt kegelförmig bäuchig. Die Gewinde, deren ungefähr zehn, ſind in die Quere geſtreifet; die Streifen wechſelweiſe größer, mit Perlenſchnüren umgeben, oben an den Näthen mit einer erhabenen Linie eingeſäumet. Der Boden iſt etwas bäuchig, an welchem die größern Streifen rothbraun gegliedert ſind. Von hellgrauer Farbe, mit einem perlenmutterartigen Schlunde.

K. II. 9. Turbo crocatus.

K. II. 9. Der Safrankräuſel.

Teſta imperforata conica, laeui, ſutura ſulcata, anfractibus conuexis, ſpira crocea.

Die undurchbohrte kegelförmige Schale hat eine gefurchte Nath, gewölbte Windungen, mit einem ſafranrothen Schnirkel.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta conica, laeuis. Anfractus circiter quinque conuexi, ſulco ſuturali interſtincti. Baſis conuexa. Columella angulata, replicata, tegens foramen obſoletum. Color baſis, & epidermidis nitens albus, ſpirae ſub epidermide croceus.

Die Schale iſt kegelförmig, und glatt. Ungefähr fünf erhabene Gewinde, die an der Nath mit einer Furche von einander abgeſondert ſind. Der Grund iſt bauchig. Die eckige, übergeſchlagene Spindel decket ein undeutliches Nabelloch. Der ganze Grund und die Oberhant iſt glänzend weiß, der Schnirkel unter der Oberhaut ſafranroth.

K. III. Turriti, columella exſerta,

K. III. Gethürmte, mit hervorragender Spindelleſze.

K. III. 1. Trochus Teleſcopium.

K. III. 1. Die Seetonne.

Linn. S. *N.* *Sp.* 600.

Belg. Zeeton. *Rumph.* *Angl.* Indian Whirligig. *Petiv.* *Gall.* Le Teleſcope. *Dav.*

Teſta imperforata turrita, ſtriata, columella exſerta ſpirali.

Die undurchbohrte gethürmte und geſtreifte Schale hat eine hervorragende gewundene Spindel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 92.

Liſt. *Hiſt.* *Conch.* *t.* 4. *ſ.* 8. *f.* 10.

Rumph.

Rumph. amb. t. 21 *f.* 12.

Petiv. amb. t. 4. *f.* 10.

Argenv. Conch. *Pl.* 11. *f. B.*

Seb. Thes. III. t. 50. *f.* 1 — 12.

Knor. Vergn. III. 22. *t.* 2. 3. *f.*

—— *Del. nat. I. t. B. IV. f.* 9.

K. III. 2. Trochus dolabratus.

K. III. 2. Die Schifsfahne.

Linn. S. N. Sp. 601.

Belg. Vlaggetje.

Teſta umbilicata turrita, glabra; columella exſerta, recuruata, triplicata.

Die genabelte gethürmte glatte Schale hat eine hervorragende gedrehte, mit drey Falten verſehene Spindel.

Argenv. Conch. Pl. 14. *f. L.*

Knor. Vergn. VI. 29. *t.* 2. *f.*

L. Turbo.

L. Die Mondſchnecke.

Teſta ſpiralis, apertura coarctata, rotunda, integra.

Die ſchnirkelförmig gewundene Schale hat eine eingefaßte, runde, ganzrandige Mündung.

L. I. Imperforati, columella plana.	L. I. Undurchbohrte mit einer flachen Spindel.
L. I. 1. Turbo littoreus.	L. I. 1. Die Strandmondſchnecke.
Linn. S. N. Sp. 607.	

Belg. Aliekruiken. *Angl.* Couvin. *Gall.* Bigourneau.

Teſta ſubouata transuerſim faſciata, columella plana.	Die etwas eyförmige Schale iſt der Quere nach mit Bändern umgeben, und mit einer flachen Spindel verſehen.

Liſt. angl. t. 3. f. 9.
—— *Hiſt.* Conch. l. 4. ſ. 5. f. 43.
Gualt. Teſt. t. 45. f. G.
Mus. Caes. Vindobon.

L. I. 2. Turbo muricatus.	L. I. 2. Die Reißbreymondſchnecke.
Linn. S. N. Sp. 608.	
Teſta umbilicata, ſubouata, cincta punctis eminentibus transuerſim digeſtis, columella obtuſa.	Die genabelte, etwas eyförmige Schale iſt in die Quere mit erhabenen reiheweiſen Körnern beſezet, und mit einer ſtumpfen Spindel verſehen.

Gualt.

Gualt. Teſt. t. 45. f. F.

Mus. Caes. Vindobon.

L. II. Imperforati, ſolidi. L. II. Undurchbohrte dickſchalige.

L. II. 1. Turbo Pullus. L. II. 1. Die Bockſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 610.

Belg. Bokje.

Teſta imperforata ouata, laeui; apertura antice angulata. Die undurchbohrte, eyförmige glatte Schale hat eine vorne eckige Mündung.

Picta maculis, faſciisque purpureis & albidis. Mit weißlichen, und purpurrothen Flecken, und Bändern bemalet.

Mus. Caes. Vindobon.

L. II. 2. Turbo Petholatus. L. II. 2. Der Naſſauer.

Linn. S. N. Sp. 612.

Belg. Petool-Horn. *Angl.* Naſſaw-Shell. *Petiv. Gall.* La Naſſavienne. *Argenv.*

Teſta imperforata ouata, laeui, anfractibus verſus ſuturam obtuſe carinatis. Die undurchbohrte eyförmige glatte Schale iſt auf den Gewinden gegen die Nath mit einer ſtumpfen Querkiele umgeben.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 5. f. 39.
Rumph. amb. t. 19. f. D. 5. 6. 7.
Petiv. amb. t. 7. f. 15.
Argenv. Conch. Pl. 6. f. K.
Seb. Thes. III. t. 74. f. 23 — 29.
Klein. Meth. Oſtr. t. 2. f. 51.
Gev. Beluſt. 21. t. 205 — 208 f.
Regenſ. Samml. I. 8. t. 18. f. 9. t. 27 f.
Knor. Vergn. I. 3. t. 3. f.
—— —— II. 22. t. 1. 2. f.
—— —— III. 3. t. 3. f.; 23 t. 4. f. 28 t. 2 - 5 f.
—— *Del. nat. I. t. B. III. f. 7.*

L. II. 3. Turbo Cochlus.

L. II. 3. Der grüne Silbermund.

Linn. S. N. Sp. 613.

Belg. Zilvermond. *Angl.* Silver-Mouth Shell. *Gall.* Bouche d'Argent. *Argenv.*

Teſta imperforata, ouata, transuerſim obſolete ſulcata, cingulo unico dorſali craſſiore.

Die undurchbohrte eyförmige Schale iſt mit matten Querfurchen umgeben, deren eine auf den Rücken dicker als die andern iſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 5 f. 29.
Rumph. amb. t. 19. f. 4.
Petiv. amb. t. 9. f. 14.

Argenv. Conch. *Pl.* 6. *f.* J.

Seb. Thes. III. *t.* 74. *f.* 20, 21.

Gev. *Beluſt.* 20 *t.* 9. *f.*

Regenſ. Samml. I. 1. *t.* 12. *f.*

Knor. *Vergn.* I. 3. *t.* 3. *f.*

—— *Del. nat.* I. *t.* *B.* III. *f.* 6.

L. II. 4. Turbo Chryſoſtomus.

L. II. 4. Der Goldmund.

Linn. S. *N.* Sp. 614.

Belg. Goud-Mond. *Rumph.* *Angl.* The golden mout'd Snail. *Hill* *Gall.* Bouche d'or. *Dav.*

Teſta imperforata ſubouata rugoſa, anfractibus ſpinarum fornicatarum ſerie duplici cinctis.

Die undurchbohrte etwas eyförmige runzelichte Schale hat auf den Gewinden mit einer doppelten Reihe hohler Stacheln beſezet.

Rumph. amb. *t.* 19. *f.* E.

Petiv. amb. *t.* 4. *f.* 4.

Gualt. *Teſt.* *t.* 62 *f.* H.

Argenv. Conch. *Pl.* 6. *f.* D.

Klein. Meth. *Oſtr.* *t.* 7. *f.* 126.

Seb. Thes. III. *t.* 74. *f.* 9—11.

Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 7.

Gev. Beluſt. 18. *t.* 171. *f.*

Knor. *Vergn. II.* 14. *t.* 2. *f.*

—— —— *V.* 13. *t.* 3. *f.*

L. II. 5. Turbo Tectum perſicum.

L. II. 5. Das chineſiſche Dach.

Linn. S. *N. Sp.* 615.

Angl. The prikly Trochus *Hill.* *Gall.* Le toit chinois.

Teſta imperforata, ouata ſpinis obtuſis depreſſis, ſubtus papilloſa.

Die undurchbohrte eyförmige Schale iſt unten mit Wärzchen, oben mit ſtumpfen niedergedruckten Dörnern beſezet.

Argenv. Conch. *Pl.* 8. *f.* P.

Hill. Hiſt. of Anim. Pl. 7.

Mus. Caes. Vindobon.

L. II. 6. Turbo Pagodus.

L. II. 6. Die Pagodenſchnecke.

Linn. S. *N. Sp.* 616.

Belg. Langleevende Tol. *Rumph.* *Angl.* Great Neſtors Top. *Petiv.* *Gall.* La Pagode. *Dav.*

Teſta imperforata, conica, ſpinis obtuſis concatenatis, ſubtus papilloſa, ſtriata.

Die undurchbohrte kegelförmige untenher warzige und geſtreifte Schale iſt mit auf den Gewinden mit aneinander ſchlieſſenden ſtumpfen Dörnern beſezet.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 8. *f.* 36.
Rumph. amb. t. 21. *f.* D.
Petiv. amb. t. 10. *f.* 8.
Gualt. Teſt. t. 22. *f.* B. C.
Argenv. Conch. Pl. 8. *f. A.*
Gev. Beluſt. 8. *t.* 62. *f.*
Knor. Vergn. I. 25. *t.* 3. 4. *f.*

L. II. 7. Turbo Calcar. L. II. 7. Der Sporn.

Linn. S. N. Sp. 617.

Belg. De Spoor. *Rumph.* *Angl.* Spur-Shell. *Pet.* *Gall.* L' Eperon. *Dav.*

Teſta ſubimperforata depreſſa, anfractibus ſcabris ſupra ſpinis fornicato compreſſis.

Die eigermaßen undurchbohrte niedergedrückte Schale iſt auf den Gewinden rauh, und oben mit blattgedrückten hohlen Dörnern umgeben.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 6. f. 46.

Rumph amb. t. 20. f. J.

Petiv. amb. t. 9. f. 13.

Argenv. Conch. Pl. 6. f. R.

Klein. Meth. Oſtr. t. I. f. 128.

Gev. Beluſt. 8. t. 60. f.

Knor. Vergn. III. 20. t. I. f.

L. II. 8. Turbo rugoſus.

L. II. 8. Der Runzelbund.

Linn. S. N. Sp. 618.

Belg. Gerimpelde Tulband.

Teſta imperforata ſubouata, ſtriata, anfractibus ſuperne rugoſis.

Die undurchbohrte einigermaßen eyförmige geſtreifte Schale hat am obern Umfange der Gewinde mit Knotten beſezet.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 12.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 8. f. 41.

Gualt. Teſt. t. 63. f. C. F. H.

Seb. Thes. III. t. 74. f. 13. 14.

Gev. Beluſt. 15. t. 136. f.

Knor. Vergn. III. 20. t. I. f.

L. II. 9. Turbo marmoratus.

L. II. 9. Die Schlangenhaut.

Linn. S. *N.* *Sp.* 619.

Belg. Slangen-Velle-Hoorn. *Angl.* The green Giants Ear, *Gall.* L'oreille de geant.

Teſta imperforata ſubouata laeui, anfractibus trifariam marginato nodoſis, columella ſubroſtrata explanata.

Die undurchbohrte etwas eyförmige glatte Schale iſt am Rande der Gewinde mit einer dreyfachen Reihe Knotten umgeben, und an der Spindel einigermaßen in einen Rüſſel verlängert, und flachgedrückt.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *t.* 4. *ſ.* 5. *f.* 46.
Rumph. amb. *t.* 19. *f.* *A.* *B.*
Gualt. Teſt. *t.* 64. *f.* *A.*
Seb. *Thes.* III. *t.* 74. *f.* 1. 2.
Klein. Meth. Oſtr. *t.* 7. *f.* 124.
Gev. Beluſt. 13. *t.* 128 — 131 *f.*
Regenſ. Samml. I. 5. *t.* 52. *f.*
Knor. *Vergn.* III. 26. *t.* 1 *f.*; 27. *t.* 11. *f.*

L. II. 10. Turbo ſarmaticus.

L. II. 10. Der Oelkrug.

Linn. S. N. Sp. 620.
Belg. Bont Knobbel-Hoorn. *Rumph. Gall.* Le burgau. *Dav.*

Teſta imperforata, conuexo nodoſa obtuſa, anfractibus ſupra nodoſis, canali interſtinctis.

Die undurchbohrte erhaben-runde ſtumpfe Schale hat oben knottige Gewinde, die durch eine Rinne von einander abgeſondert ſtehen.

Argenv. Conch. *Pl.* 8. *f.* B.

Gev. Beluſt. 7. *t.* 52 *f.*

Knor. Vergn. II. 9. *t.* 1. *f.*

L. II. 11. Turbo galeatus.

L. II. 11. Die Sturmhaubenartige Mondſchnecke.

Teſta turbinata transuerſim ſulcata, anfractibus oblique angulatis, labio unidentato.

Die birnförmige Schale iſt in die Quere gefurchet, auf den Gewinden mit ſchiefen Ecken, und an der Spindellefze mit einem Zähnchen beſezet.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 8. *f.* 51.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta turbinata ſolida. Anfractus quatuor, transuerſim ſulcati, prope marginem externum angulis obliquis, obtuſis. Apertura lunata. Labrum integrum acutum. Columella ſubumbilicata. Labium reflexum plica, ſeu denticulo acuto notatum. Color albus, punctis diſperſis rufis.

Die Schale iſt dicht und birnförmig. Die vier Gewinde ſind der Quere nach gefurchet, am äußern Rande mit ſchiefen, ſtumpfen Ecken verſehen. Die Mündung mondförmig. Die Schalenlefze ganzrandig, und ſcharf. Die Spindel einigermaßen durchbohret. Die Spindellefze übergeſchlagen, nnd mit einer ſpizigen zahnförmigen Falte beſezet. Von weißer Farbe mit zerſtreuten rothbraunen Punkten.

L. II. 12.

L. II. 12. Turbo trochiformis.

L. II. 12. Die kräuſelartige Mondſchnecke.

Gall. La fripiere. *Dav.*

Teſta imperforata conuexo conica, anfractibus plicato-rugoſis, baſi plano concaua, apertura falcata.

Die undurchbohrte, runderhabene kegelförmige Schale iſt auf den Windungen mit Runzeln und Falten beſezet, am Grunde flach und hohl, mit einer ſichelförmigen Mündung.

Knor. Vergn. III. 29. *t.* 1. 2. *f.*

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta conuexo conica, tenera, ſubpellucida. Anfractus decliues imbricati, plicato rugoſi. Baſis plano concaua. Labrum integerrimum, falcatum. Columella ſubhorizontalis, reflexa, imperforata. Color albus, radiis obliquis curuatis luteis.

Die Schale iſt runderhaben kegelförmig, dünn, und halb durchſichtig. Die ziegelförmig abhängigen Gewinde ſind mit Runzeln und Falten beſezet. Der Grund iſt flach und hohl. Die Schalenlefze ganzrandig und ſichelförmig. Die Spindel beinahe wagrecht, ohne Nabel. Von weißer Farbe, mit krummen gelben Querſtrahlen.

Veſtigiata, teſtis alienis inſidentibus.

Sie hat Eindrücke von fremden aufſizenden Schalen.

L. II. 13. Turbo helicinus.

L. II. 13. Die Schnirkelmondſchnecke.

Teſta rotundata glabra, anfractibus conuexis, columella incraſſata, ſubimperforata.

Die rundliche glatte Schale hat gewölbte Windungen, eine verdickte Spindel, mit einem unvollkommenen Nabel.

Knor. Vergn. V. 3. t. 1. f.
Mus. Caes. Vindobon.

Teſta rotundata, ſolida. Anfractus ſex conuexi, laeues, contigui. Apertura ouata. Columella incraſſata, replicata; Umbilicus obſoletus, tectus. Color epidermidis ex purpureo virideſcens, faucis argenteo margaritaceus.

Die Schale iſt rundlicht und dicht. Die ſechs Gewinde ſind erhaben, glatt, und berühren einander. Die Spindel iſt verdicht, übergeſchlagen, mit einem gedeckten unvollkommenen Nabelloche. Die Oberhaut iſt purpurfarbig und grünlich, der Schlund mit einem ſilbernen Perlenmutterglanz.

L. III. Solidi, perforati.

L. III. Dichte, durchbohrte.

L. III. 1. Turbo cinereus.

L. III. 1. Die aſchengraue Mondſchnecke.

Teſta rotundata, laeui, anfractibus conuexis, columellae baſi elongata, fauce ſulcata, umbilico lato.

Die rundliche glatte Schale hat erhabene Gewinde, einen gefurchten Schlund mit einem breiten Nabelloche.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta

Teſta rotundata, laeuis. Anfractus ſex conuexi, prope ſuturam complanati, & obſolete transuerſim ſtriati Apertura ſemicircularis. Columellae baſis elongata, diducta. Vmbilicus profundus. Color cinereus, maculis & lineis albis nigrisque,

Die Schale iſt rundlich und glatt. Die ſechs Gewinde ſind bäuchig, nächſt der Nath plattgedrückt, mit unvollkommenen Querſtreifen. Die Mündung iſt halbrund. Der Grund der Spindel iſt verlängert, und ausgebreitet. Der Nabel tief. Von aſchengrauer Farbe mit weiſſen und ſchwarzen Flecken und Strichen.

L. III. 2. Turbo noduloſus.

L. III. 3. Die knottige Mondſchnecke.

Teſta conico rotundata, anfractibus noduloſo ſtriatis, denticulo umbilicali.

Die runderhabene kegelförmige Schale iſt an den Gewinden mit Knotten und Streifen beſezet, und an dem Nabelloche mit einem Zähnchen verſehen.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſimillima ſequenti, ſed transuerſim ſtriata, nodisque obliquis obſita. Color niger, maculis diſperſis niueis.

Die Schale iſt der folgenden am ähnlichſten, nur iſt ſie mit ſchiefen Knotten und Streifen beſezet. Von ſchwarzer Farbe mit zerſtreuten ſchneeweißen Flecken.

L. III. 3. Turbo Pica.

L. III. 3. Die Elſter.

Linn. S. N. Sp. 622.

Belg. Soldát. *Angl.* Magpye Top-Shell. *Pet. Gall.* La Pie. *Dav.*

Teſta umbilicata, conico rotundata, laeui, denticulo umbilicali.

Die genabelte runderhabene kegelförmige glatte Schale iſt am Nabelloche mit einem Zähnchen verſehen.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 29. 30.
Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 14. *f.* 2.
Petiv. *Gaz.* *t.* 70. *f.* 9.
Rumph. *amb.* *t.* 21. *f.* *A.*
Gualt. *Teſt.* *t.* 68. *f.* *B.*
Argenv. *Conch.* *Pl.* 8. *f.* G.
Adans. *Seneg.* *Pl.* 12. *f.* 7.
Gev. *Beluſt.* *t.* 10 *f.* 74 — 77.
—— —— 11. *t.* 78 — 80. *f.*
Regenſ. Samml. I. 6. *t.* 66. *f.*; 11 *t.* 57 *f.*
Knor. *Vergn.* I. 10. *t.* 1. *f.*
—— —— *II.* 21. *t.* 3. *f.*

L. III. 4. Turbo Argyroſtomus.

L. III. 4. Der geribbte Silbermund.

Linn. S. N. Sp. 624.

Belg. Geplekte Zilver-Mond. *Angl.* The ſpotted Silvermouth. *Gall* La bouche d'argent bariolée, *Argenv.*

Teſta

Teſta umbilicata, ſubouata, transuerſim cingulata, longitudinaliter ſtriata.

Die genabelte eyförmige Schale iſt in die Quere gegürtet, und der Länge nach geſtreifet.

Alba, faſciis longitudinalibus fuſcis.

Weiß, mit nach der Länge herablaufenden Bändern.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 12. f. 9.

Rumph. amb. t. 19. f. 3.

Gualt. Teſt. t. 64. f. D.

Argenv. Conch. Pl. 6. f. F.

Seb. Thes. III. t. 74. 4. 6.

Gev. Beluſt. 16. t. 153. 154. f.

Regenſ. Samml. I. 10. t. 43. f.

Knor. Vergn. III. 15. t. 5. f.

Da Coſt. Elem. Pl. 3. f. 12.

L. III. 5. Turbo margaritaceus.

L. III. 5. Der bunte Silbermund.

Linn. S. N. Sp. 625.

Belg. Bonte Zilver-Mond.

Teſta umbilicata ſubouata cingulis eleuatis, intercoſtalibus laeuibus.

Die genabelte, einigermaßen eyförmige Schale hat erhabene zwiſchen den Furchen liegende Gürteln.

Alba maculis virideſcentibus fuſcisque.

Weiß, mit grünlichen und braunen Flecken.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 11.
Argenv. Conch. *Pl.* 6. *f.* *A.*
Seb. Thes. III. *t.* 74. *f.* 3.
Gev. *Beluſt.* 17. *t.* 155—158. *f.*

L. III. 6. Turbo Delphinus.

L. III. 6. Der gezackte Delphin.

Linn. *S. N.* *Sp.* 626.

Belg. Getackte Dolphyn. *Angl.* The echinated Snail, *Petiv.* *Gall.* le Dauphin. *Dav.*

Teſta umbilicato hiſpida, anfractuum ſpinis ramoſis.

Die Schale hat einen gezackten Nabel, und mit äſtigen Stacheln beſezte Gewinde.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 31.
Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 6. *f.* 45.
Rumph. *amb.* *t.* 20. *f.* *H.*

Petiv.

Petiv. amb. t. 3. f. 1.
Gualt. Teſt. t. 68. f. C.
Gev. Beluſt. 4. t. 26 — 28. f.
Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 7.
Argenv. Conch. Pl. 6. f. H.
Seb. Thes. III. t. 59. f. 15 — 27.
Knor. Vergn. I. 22. t. 4. 5. f.

L. III. 7. Turbo diſtortus.

L. III. 7. Der geribbte Delphin.

Linn. S. N. Sp. 627.

Teſta umbilicata, ſubmucronata, ſpinis indiuiſis.

Die genabelte und gezackte Schale iſt an den Gewinden mit ungetheilten Stacheln beſezet.

Gualt. Teſt. t. 68. f. D.
Gev. Beluſt. 4 t. 24 f.
Seb. Thes. III. t. 59. f. 1 — 6.
Knor. Vergn. IV. 7. t. 2. 3. f. ; 8. t. 1. f.

L. III. 8. Turbo carinatus.

L. III. 8. Die gekielte Mondſchnecke.

Teſta rotundata, anfractibus carinatis, umbilico ſpirali profundo.

Die rundliche Schale iſt an den Gewinden mit Kielen umgeben, und mit einem tiefen ſchnirkelſörmigen Nabel verſehen.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta rotundata, pyramidata, tenera, ſubpellucida. Anfractus quinque teretes, cincti carinis lamelloſis tribus ſex, ſupremis tenuioribus. Apertura orbicularis. Vmbilicus verticalis, ſpiralis, latus. Color albus.

Die Schale iſt rund, pyramidenförmig, dünn und halbdurchſichtig. Die fünf Gewinde ſind erhaben rund, mit drey bis ſechs blätterichten Kielen, davon die oberſten dünner ſind, umgeben. Die Mündung iſt rund. Der breite ſchnirkelförmige Nabel ſtehet ſenkrecht. Von weißer Farbe.

L. IV. Cancellati.

L. IV. Gegitterte.

L. IV. 1. Turbo ſcalaris.

L. IV. 1. Die ächte Wendeltreppe.

Linn. S. N. *Sp.* 630.

Belg. Wenteltrap. *Angl.* Royal Stair-Caſe. *Pet. Gall.* La vraie Scalata. *Dav.*

Teſta umbilicata, ventricoſo conica, anfractibus diſtantibus, faſciis longitudinalibus membranaceis intertextis.

Die genabelte bäuchige kegelförmige Schale hat entfernte Gewinde, die mit nach der Länge herablaufenden häutigen Klammern verwachſen ſind.

Rumph.

Rumph. amb. t. 49. f. A.

Petiv. amb. t. 2. f. 9.

Gualt. Teſt. t. 10. f. ZZ.

Argenv. Conch. Pl. 11. f. V.

Knor. Vergn. IV. 20. t. 2. 3. f.

—— —— V. 23. t. 1. f.; 24. t. 6. f.

Murr. Fund. Teſt. t. 1. f. 7.

Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1428. 1431. f.

—— —— —— 153. t. 1432. 1433. f.

L. IV. 2. Turbo Clathrus.

L. IV. 2. Die gemeine Wendeltreppe.

Linn. S. N. Sp. 631.

Belg. Wentel-Trapje. *Angl.* Smaal Stair-Caſe. *Petiv.* *Gall.* La fauſſe ſcalata. *Dav.*

Teſta exumbilicata turrita, anfractibus contiguis, faſciis longitudinalibus membranaceis.

Die thurmförmige Schale hat von einander entfernte Gewinde, und häutige nach der Länge laufende Klammern, ohne Nabelloch.

α niuea, unicolor.

α ſchneeweiß, einfärbig.

β niuea, maculis diſperſis purpureis.

β ſchneeweiß, mit zerſtreuten purpurrothen Flecken.

γ griſea, clathris niueis.

γ lichtgrau, mit ſchneeweißen Klammern.

Bonan.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 111.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 5. *f.* 51.

Gualt. *Teſt.* *t.* 58. *f.* H.

Klein. *Meth.* *Oſtr.* *t.* 3. *f.* 66.

Ginan. adr. *II.* *t.* 6. *f.* 54.

Knor. *Vergn.* *I.* 11. *t.* 5. *f.*

—— —— *IV.* 20. *t.* 4—6. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 157. *t.* 1484 *f.*

L. IV. 3. Turbo Uua. L. IV. 3. Das Bienenkörbchen.

Linn. S. N. Sp. 636.

Belg. Gebakerde Kindje. *Gall.* Enfant au maillot. *Dav.*

Teſta umbilicata, ouata, anfractibus contiguis, plicis longitudinalibus, columella uniplicata.

Die genabelte eyförmige Schale hat aneinander genäherte Windungen, mit nach der Länge laufenden Falten, und einer Falte an der Spindel.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 140.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 5 *f.* 47.

Petiv. Gaz. t. 27. f. 2.
Gualt. Teſt. t. 58. f. D.
Seb. Thes. III. t. 55. f. 12.
Knor. Vergn. VI. 25. t. 4. f.
Mart. Konch. Konch *IV.* 153. *t.* 1439. *f.*

L. IV. 4. Turbo Lincina.

L. IV. 4. Der Breitrand.

Linn. S. N. Sp. 639.

Teſta umbilicata oblonga, anfractibus decuſſatim ſtriatis, aperturae limbo dilatato.

Die genabelte längliche Schale hat gleichbreite kreuzweiſe geſtreifte Windungen, mit einem erweiterten Mündungsrande.

Petiv. Gaz. *t.* 118. *f.* 11.
Klein. Meth. *Oſtr. t. 3. f.* 71.
Berlin. Mag. *IV.* 3. *t. 3. f.*
Mus. Caes. Vindobon.

L. V. Turriti.

L. V. Gethürmte.

L. V. 1. Turbo imbricatus.

L. V. 1. Die bunte Schraube.

Linn.

Linn. S. N. Sp. 640.

Teſta turrita, anfractibus deorſum imbricatis.

Die Gewinde der gethürmten Schale ſind niederwärts ziegelförmig gefalten.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 5. *f.* 61.

Gualt. Teſt. t. 58. *f.* E.

Seb. Thes. III. t. 56. *f.* 34.

Knor. *Vergn. VI.* 25. t. 2. *f.*

Mart. Konch. *Kab. IV.* 152. *t.* 1422. *f.*

L. V. 2. Turbo acutangulus.

Linn. S. N. Sp. 642.

L. V. 2. Die Scharfribbe.

Teſta turrita, anfractuum carina unica majore, acuta.

Die Gewinde der gethürmten Schale haben einen größeren und ſcharfſchneidigen Querkiel.

Bonan. Recr. cl. 3. *f.* 117.

Gualt. Teſt. t. 58. *f. B.*

Mart. Konch. *Kab. IV.* 67. t. 742. 743. *f.*

L. V. 3. Turbo duplicatus.

L. V. 3. Die Doppelribbe.

Linn.

Linn. S. *N.* Sp. 643.

Teſta turrita, anfractuum carinis duabus acutis.

Die Gewinde der gethürmten Schale haben zween ſcharfe Querkiele.

Liſt. *angl.* *t.* 3. *f.* 7.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 114.

Gualt. Teſt. *t.* 58. *f.* C.

Seb. Thes. *III.* *t.* 56. *f.* 7. 8.

Mus. Caes. Vindobon.

L. V. 4. Turbo exoletus.

L. V. 4. Die alte Schraube.

Linn. *S.* *N.* *Sp.* 644.

Teſta turrita, anfractibus longitudinaliter rugoſis, carinis duabus obtuſis marginalibus.

Die Gewinde der gethürmten nach der Länge gerunzelten Schale haben zween ſtumpfe am Rande ſtehende Querkiele.

Liſt. *Hiſt.* *Conch.* *l.* 4. *ſ.* 5. *f.* 53.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 113.

Argenv. Conch. *Pl.* 14. *f.* C.

Mus. Caes. Vindobon.

L. V. 5.

L. V. 5. Turbo torcularis.

L. V. 5. Die geſtreifte Trommelſchraube.

Teſta turrita, anfractibus transuerſim ſtriatis, carinis duabus obtuſis ſubmarginalibus.

Die Gewinde der gethürmten Schale ſind in die Quere geſtreifet, und mit zween ſtumpfen vom Rande etwas entfernten Querkielen umgeben.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta turrita. Anfractus circiter duodeni transuerſim ſtriati, carinis cincti duabus diſtantibus, obtuſis, margini cuiuis propinguis. Apertura aſſinium. Color albus, maculis longitudinalibus undulatis fuſcis.

Die Schale iſt gethürmt. Die Gewinde deren ungefähr zwölf, ſind der Quere nach geſtreifet, und mit zween ſtumpfen Querkielen umgeben, die nicht weit von jedem Rande entfernet ſtehen. Die Mündung iſt wie an den anverwandten Arten. Die Farbe weiß mit wellenförmigen nach der Länge laufenden Flecken.

L. V. 6. Turbo Terebra.

L. V. 6. Die Trommelſchraube.

Linn. S. *N.* *Sp.* 645.

Belg. Trommel - Schroef.

Teſta turrita, anfractuum carinis ſex, acutis.

Die Gewinde der gethürmten Schale haben ſechs ſcharfe Querkiele.

Be-

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 115.

Rumph. *amb.* *t.* 30. *f.* *M.*

Petiv. *amb.* *t.* 13. *f.* 18.

Gualt. *Teſt.* *t.* 58. *f.* *A.*

Adans. Seneg. *Pl.* 10. *f.* 6.

Argenv. Conch. *Pl.* 11. *f.* *D.*

Seb. Thes. III. *t.* 56. *f.* 40.

Knor. *Vergn.* *I.* 8. *t.* 6. *f.*

Mart. Konch. Kab. *IV.* 152. *t.* 1425. *f.*

L. V. 7. Turbo bidens.

L. V. 7. Die gefleckte Zahnſchraube.

Linn. S. *N.* *Sp.* 649.

Teſta turrita, pellucida, anfractibus contrariis, prope ſuturam maculatis, apertura poſtice bidentata.

Die gethürmte durchſichtige Schale hat linksgewundene an der Nath gefleckte Windungen, und hinten an der Mündung zween Zähnchen.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 1. *f.* 39.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 41.

Gualt. *Teſt.* *t.* 4. *f.* C.

Argenv. Conch. *Pl.* 28. *f.* 20.

Murr. Fund. *Teſt.* *t.* 1. *f.* 2.

Schroet. Erdkonch. 1. *t.* 4. *f.*

L. V. 8. Turbo quinquedentatus.

Teſta turrita ſubpellucida, labio tridentato, labro biplicato.

L. V. 8. Die fünfzähnige Schraube.

Die gethürmte halbdurchſichtige Schale hat an der Spindellefze drey, an der Schalenlefze zwo Falten.

Mus. Caes. Vindobon.

Simillima praecedenti. Teſta cylindraceo turrita. Anfractus duodecim. Columella ſubumbilicata. Labium plicis membranaceis tribus; labrum binis. Color albidus.

Die Schale iſt der vorhergehenden am ähnlichſten, von gethürmter walzenförmiger Geſtalt. Der Gewinde ſind zwölf an der Zahl. Die Spindel iſt einigermaßen genabelt. Die Spindellefze iſt mit drey, die Schalenlefze mit zwo dünnen Falten beſezet. Von weißlicher Farbe.

L. V. 9. Turbo detritus.

Müll. Hiſt. Verm. II. Sp. 300.

Teſta ouata, laeui, columella ſubimperforata, apertura ouata.

L. V. 9. Die eyförmige Schraube.

Die Schale iſt eyförmig, und glatt; die Spindel einigermaßen durchbohret, die Mündung eyförmig.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 1. ſ. 1. f. 2.
Gualt. Teſt. t. 5 f. N.
Berlin. Magaz. III. 5. t. 53. f.
Schroet. Erdkonch. 1. t. 1. f.

M. Cornu.

Teſta elongato conica volutata. Anfractus cylindrici diſtantes. Apertura elabiata, imperforata.

M. Die Hornſchnecke.

Die verlängerte kegelförmige gedrehte Schale hat walzenförmige freyſtehende Gewinde, und eine Mündung ohne Lefzen und Nabelloch.

M. 1. Cornu Copiae.

Teſta conico turrita, anfractibus duobus, apertura orbiculata.

M. 1. Das Füllhorn.

Die kegelförmig gethürmte Schale hat zwey Gewinde, und eine ganz runde Mündung.

Index Mus. Caes. Vindobon. I.
Mus. Caes. Vindobon.

Teſta conico turrita dextrorſum volutata. Anfractus duo continuati, teretes, diſtantes, infimo remotiſſimo. Apex obtuſus. Apertura orbicularis latere interno paulumper revoluta, ſine columella, labio, & umbilico. Color luteſcens, faſciis tribus longitudinalibus dorſi, fuſcis. Hinc ab affine ſpecie *Sebae* (*) *Argenvilliique* (**) & vix non *Othon. Mülleri* (***) diſtincta.

Die Schale iſt kegelförmig und gethürmet, nach der Rechten gedrehet. Die zwey Gewinde ſind unterbrochen, walzenförmig, und ſtehen von einander frey entfernet, davon das lezte am weiteſten abſtehet. Die Spize iſt ſtumpf. Die Mündung ſcheibenrund, an der inneren Seite etwas wenig auswärts übergeſchlagen, ohne Spindel, Lefze, und Nabelloch. Von gelblicher Farbe, mit drey nach der Länge des Rückens laufenden ſchwarzbraunen Bändern. Dadurch unterſcheidet ſie ſich als eine beſondere Art von jener, welcher Seba (*) und Argenville (**) und vielleicht auch von der, welcher Otho Müller (***) gedenket.

N. Helix.

Teſta ſpiralis, anfractibus contiguis, columella elabiata, apertura coarctata.

N. Die Schnirkelſchnecke.

Die ſchnirkelförmige Schale hat verwachſene Gewinde, an der Spindel keine Lefze, und an der Mündung keinen Einſchnitt.

(*) *Thes. III. t. 40 f. 27.*

(**) *Conch. II. Pl. 9. f. 2.*

(***) *Hiſt. Verm. II. Sp. 313.*

N. I.

N. I. Teſta ancipiti. N. I. Mit zweyſchneidiger Schale.

N. I. 1. Helix Scarabaeus. N. I. 1. Die Käferſchnecke.

Linn. S. *N.* Sp. 655.

Belg. Toover Slak. *Angl.* River ragged Mouth. *Pet. Gall.* Gueule de Loup. *Dav.*

Teſta ouata, ancipiti; apertura dentata. Die eyförmige zweyſchneidige Schale hat eine gezähnte Mündung.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 5. *f.* 31. 32.
Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 44. 385.
Petiv. Gaz. *t.* 4. *f.* 10.
—— *amb. t.* 12. *f.* 3.
Rumph amb. t. 27. *f.* J.
Gualt. Teſt. *t.* 4. *f.* S.
Argenv. Conch. *Pl.* 9. *f.* T.
Klein. Meth. Oſtr. *t.* 1. *f.* 23.
Berlin. Mag. III. 6. *t.* 67. *f.*
Knor. Vergn. VI. 19. *t.* 2. 3. *f.*

N. II. Anfractibus carinatis. N. II. Mit kielförmigen Gewinden.

N. II. 1. Helix Lapicida. N. II. 1. Der Steinpicker.

Linn. S. N. Sp. 656.

Belg. Steenbikker. *Angl.* Land Cheeſe Shell. *Pet. Gall.* Le Planorbe terreſtre. *Geof.*

Teſta carinata, orbiculari, umbilicata, utrinque conuexa, apertura marginata, transuerſali, ouata.

Die gekielte ſcheibenrunde genabelte Schale iſt beiderſeits runderhaben, mit einer eingeſäumten, querliegenden, eyförmigen Mündung.

Liſt. angl. t. 2 f. 14.

—— —— *Hiſt.* Conch. l. 1. ſ. 8. f. 68.

Petiv. Gaz. t. 92. f. 11.

Berlin. Magaz. II. 3 t. 15. f.

Slotterb. Act. helv. V. 3 t. 36 f.

Schroet. Erdk. 2 t. 23 f.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 2. Helix algira.

N. II. 2. Der Wachsſchnirkel.

Linn. S. N. Sp. 660.

Teſta ſubcarinata, complanata, anfractibus teretibus, ſupra reticulatim ſtriatis, umbilico peruio.

Die einigermaßen gekielte flache Schale hat runde Gewinde, die oben kreuzförmig geſtreifet ſind, mit einem tiefen Nabel.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 3. Helix Planobis.

N. II. 3. Die Scheibenſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 662.

Teſta carinata, umbilicata, plana, ſupra concaua apertura utrinque acuta.

Die gekielte, genabelte flache Schale, iſt oben ausgehöhlet, und mit einer beiderſeits ſcharfen Mündung verſehen.

Liſt. angl. t. 2 *f.* 27.

—— *Hiſt. Conch. l.* 2. *p.* 1. *f.* 24.

Petiv. Gaz. t. 10. *f.* 11.

Gualt. Teſt. t. 4. *f.* EE.

Klein. Meth. Oſtr. t. 1. *f.* 8.

Gev. Beluſt. 4. *t.* 21. 23. *f.*

Berlin. Magaz. IV. 8. t. 18. *f.*

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 4. Helix marginata.

N. II. 4. Der eingeſäumte Kegelſchnirkel.

Müll. Hiſt. Verm. II. *Sp.* 241.

Teſta umbilicata, carinata, depreſſo conica, oblique ſtriata, apertura transuerſa, triangulari.

Die genabelte und gekielte, flachkegelförmige Schale iſt ſchief geſtreifet, und mit einer querliegenden dreyeckigen Mündung verſehen.

Alba, faſciis transuerſis rufis.

Weiß, mit rothbraunen Querbändern,

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 5. Helix plicata.

N. II. 5. Der Faltenmund.

Teſta umbilicata, carinata, depreſſoconica, ſubtus conuexa gibba, apertura quadrangulari, ſauce plicata.

Die genabelte, gekielte, flachkegelförmige Schale iſt unten erhaben rund, und höckerig, und inner der viereckigen Mündung mit Falten beſezet.

Knor. Vergn. VI. 26. t. 5. f.

Teſta depreſſo conica. Anfractus ſupra ſex, ſubtus vnicus, gibbus, margine acute carinato. Vmbilicus centralis, ſpiralis, peruius. Apertura quadrangularis, margine reflexo. Faux prope columellam plica transuerſa ſolitaria elongata, prope labrum plicis duabus marginalibus acutis. Color rufus.

Die Schale iſt flachkegelförmig. Oben ſtehen ſechs Gewinde, unten ein höckeriges, welches mit einer ſcharfen Kiele umgeben iſt. Der ſchnirkelförmige, tiefe Nabel durchdringet die Mitte. Die Mündung viereckig, und eingeſäumt. Inner derſelben ſtehet an der Spindel ein einzelne verlängerte Querfalte, am Rande der Schalenleſzen aber zwo. Von brauner Farbe.

N. II. 6. Helix obuerſa.

N. II. 6. Der Flachwirbel.

Teſta

Teſta imperforata turbinata, anfractibus ſupra planis, marginato carinatis, columella imperforata.

Die Gewinde der zuſammengedrückten birnförmigen Schale, ſind oben flach, und an der Kiele gerändert, die Spindel undurchbohret.

Gualt. Teſt. *t.* 68. *f.* E.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta turbinata ſubtus conuexa, ſupra plana, plicis transuerſis, & obliquis undique decuſſata. Anfractus quinque, ſupra plani, limbo carina marginata cincti. Apertura transuerſa, ſubtus arcuata Columellae labrum tenuiſſimum, replicatum, imperforatum. Color albus.

Die Schale iſt einigermaßen birnförmig, unten erhabenrund, oben flach, mit ſchief und querlaufenden Runzeln beſezet. Die fünf Gewinde ſind oben Flach, mit einer eingeſäumten Kiele umgeben. Die Mündung ſtehet in die Quere, und iſt unten gekrümmet. Die Spindelleſze iſt übergeſchlagen, ſehr dünn und undurchbohret. Von weißer Farbe.

N. II. 7. Helix tornata.

N. II. 7. Der gedrehte Kegel.

Teſta ſubimperforata, trochiformi, anfractibus imbricatis, apertura triangulari.

Die kaum durchbohrte kräuſelförmige Schale hat ziegelförmig übereinander liegende Gewinde, und eine dreyeckige Mündung.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 8. *f.* 61.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta trochiformis. Anfractus ſex imbricatim decliues, oblique ſubſtriati, infimo margine acuto transuerſim carinato, ſubtus conuexo. Apertura transuerſa, triangularis. Labrum extrorſum marginatum. Columella reflexa, obtegens foramen obſoletum, tenue. Color extus fuſcus, faucis niueus.

Die Schale iſt kräuſelförmig. Die ſechs ziegelförmig übereinanderliegende Gewinde ſind ſchief geſtreifet, das untere iſt der Quere nach ſcharf gekielet, unten bäuchig erhaben. Die dreyeckige Mündung ſteht in die Quere. Die Schalenlefze iſt auswärts geſäumet. Die übergeſchlagene Spindellefze bedecket ein unvollkommenes dünnes Nabelloch. Die Farbe iſt außen braun, der Schlund ſchneeweiß.

N. II. 8. Helix ringens.

N. II. 8. Das verkehrte Mundſtück.

Linn. Sp. N. Sp. 664.

Teſta ſubcarinata, imperforata, apertura reſupinata, utrinque dentata.

Die einigermaßen gekielte, undurchbohrte Schale hat eine aufwärts gekehrte beiderſeits gezähnte Mündung.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 330. 331.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 1. *ſ.* 11. *f.* 100.
Argenv. Conch. *Pl.* 28. *f.* 13. 14.
Berlin. Mag. II. 4. *t.* 42. *f.*
Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 9. Helix ſinuata.

N. II. 9. Die ausgeſchnittene Schnirkelſchnecke.

Müll.

Müll. Hiſt. Verm. Sp. 217.

Teſta ſubcarinata, imperforata, apertura transuerſa, labro extus triplicato, intus quadridentato.

Die einigermaßen gekielte undurchbohrte Schale hat eine querliegende Mündung, die an der Schalenlefze mit drey, an der Spindellefze mit vier Zähnen beſezet iſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 1. *f.* 99.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 10. Helix Carocolla.

N. II. 10. Die Baſtardlampe.

Linn. S. N. Sp. 665.

Gall. La Lampe antique. *Argenv.*

Teſta carinata, imperforata, utrinque conuexa.

Die gekielte undurchbohrte Schale iſt beiderſeits erhabenrund.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 1. *ſ.* 10. *f.* 87.

Argenv. Conch. Pl. 8. *f.* D.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 11. Helix Cornu militare.

N. II. 11. Die Karkalſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 666.

Belg. Karkal.

Teſta ſubcarinata, imperforata, conuexa, apertura patula, emarginata.

Die einigermaßen gekielte undurchbohrte runderhabene Schale hat eine erweiterte, eingeſäumte Mündung.

Niuea, ſuturis emarginatis,

Schneeweiß, mit geränderten Gewinden.

Gualt. Teſt. t. 3. *f.* J.

Knor. Vergn. VI. 32. *t.* 2. *f.*

N. II. 12. Helix maculata.

N. II. 12. Der gefleckte Schnirkel.

Teſta perforata, ſubcarinata, depreſſa, oblique ſtriata, ſubtus conuexa.

Die etwas gekielte und flache Schale iſt ſchief geſtreifet, und unten runderhaben.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta

Teſta rotundata depreſſa, ſubtus conuexa. Anfractus ſex, teretes, oblique ſtriati, extus obſolete carinati. Apertura lunata. Labrum marginatum. Columella perforata. Color albidus, maculis latis difformibus fuluis.

Die rundliche etwas flache Schale iſt unten erhabenrund. Die ſechs runde ſchief geſtreiſte Gewinde ſind einigermaßen gekielet. Die Mündung mondsförmig. Die Schalenleſze geſäumet. Die Spindel durchbohret. Von weißer Farbe mit breiten unförmigen rothgelben Flecken.

N. II. 13. Helix punctata.

N. II. 13. Der punktirte Zahnwirbel.

Teſta ſubcarinata, rotundata, ſubperforata, labio incraſſato ſinuato, labro tridentato.

Die ſtumpfkielige, rundliche, faſt undurchbohrte Schale hat eine verdickte ausgeſchnittene Spindelleſze, mie drey Zähnchen an der Schalenleſze.

Mus. Caeſ. Vindobon.

Teſta rotundata, ſubcompreſſa. Anfractus quinque conuexi, infimus carina obſoleta cinctus. Apertura transuerſa, oblonga. Labri margo incraſſatus, antice ſinuatus. Labrum marginatum denticulis obtuſis, marginalibus, tribus. Columella foramine tenui ſubobtecto. Color fuſcus, cingulo dorſali tenui, punctisque circa ſuturam radiantibus luteis. Apertura rubeſcens,

Die rundliche, etwas zuſammengedrückte Schale hat fünf rund erhabene Gewinde, deren äuſſeres mit einem unvollkommenen Kiele umgeben iſt. Die längliche Mündung ſteht in die Quere. Die Spindelleſze hat einen verdickten, vorne ausgeſchnittenen Rand. Die Schalenleſze iſt geſäumet und am Rande mit drey ſtumpfen Zähnchen beſezet. Die Spindel hat ein dünnes beynahe gedecktes Nabelloch. Die Farbe braun, mit einer ſchmalen Querbinde um den Rücken, und nach der Nath ſtrahlförmig ſtehenden Punkten von hellgelber Farbe. Die Mündung iſt röthlicht.

N. III. Vmbilicatae, anfractibus rotundis. | N. III. Genabelte, mit runden Gewinden.

N. III. 1. Helix cornea.
Linn. S. N. Sp. 671.

N. III. 1. Das Waldhorn.

Belg. Europiſche Poſt-hoorn. *Angl.* Great River Cheeſe-Shell. *Petiv. Gall.* Le grande Planorbe. *Geof.*

Teſta umbilicata plana, anfractibus quatuor teretibus.

Die genabelte flache Schale hat vier runde Gewinde.

Liſt. angl. t. 2. f. 26.
Bonan. Recr. cl. 3. f. 316.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 2. p. 1. f. 40.
Petiv. Gaz. t. 92. f. 5.
Gualt. Teſt. t. 4. f. DD.
Gev. Beluſt. 3. t. 18. 19. f.
Seb. Thes. III. t. 39. f. 17.
Argenv. Conch. Pl. t. 27. f. 8.
Ginan. adr. II. t. 2. f. 12.
Berlin. Mag. IV. 8. t. 17. f.
Knor. Vergn. V. 22. t. 6. f.
Da Coſt. Elem. Pl. 3. f. 10.

N. III. 2. Helix polygyrata.

N. III. 2. Die Schnirkelſcheibe.

Teſta

Teſta orbiculata, ſupra plana, ſubtus concaua, anfractibus teretibus decem.

Die ſchelbenförmige und unten hohle Schale beſtehet aus zehen runden Gewinden.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta orbiculata. Supra plana, ſubtus concaua. Anfractus decem teretes tenuiſſime oblique ſtriati. Apertura rotundato oblonga. Labrum emarginatum. Color luteſcens, faſcia tranſuerſa fulua.

Die Schale iſt ſchelbenförmig, oben flach, unten hohl. Die zehn runden Gewinde ſind ſehr fein ſchief geſtreifet. Die Mündung iſt länglicht rund. Die Schalenleſze geſäumet. Von gelblicher Schale, mit einer rothgelben Querbinde.

N. III. 3. Helix Cornu arietis.

N. III. 3. Das Widderhorn.

Linn. S. N. Sp. 674.

Belg. Rams-Hoorn. *Angl.* Great girdled Braſile cheeſe Shell. *Petiv.*

Teſta umbilicata, planiuſculo, anfractibus teretibus ſenis, apertura ouali.

Die genabelte, etwas flache Schale hat ſechs runde Gewinde, und eine eyförmige Mündung.

Niuea, faſcis tranſuerſis rufis.

Schneeweiß, mit braunrothen Querbinden.

Liſt.

Petiv. Gaz. t. 92. f. 4.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 14 — 15.

Klein. Meth. Oſtr. t. 1. f. 7.

Gev. Beluſt. 3 t. 12. 13. f.

Knor. Vergn. I. 2. t. 4. 5. f.

N. III. 4. Helix ampullacea.

Linn. S. N. Sp. 676.

N. III. 4. Die Schlammſchnecke.

Belg. Slyk-Slek. *Angl.* Smooth girdled Snail-Shell. *Petiv.*

Teſta perforata, ſubgloboſa, anfractibus teretibus, prope ſuturam complanatis; apertura oblonga.

Die durchbohrte kugelförmige Schale hat runde an der Nath plattgdrückte Windungen, mit einen länglichten Mündung.

Rumph. amb. t. 27. f. Q.

Petiv. amb. t. 12. f. 14.

Gualt. Teſt. t. 1. f. R.

Seb. Thes. III. t. 38. f. 1 — 7. 58. 59.

Gev. Beluſt. 27. t. 289. 291. f.

Berlin. Mag. III. 6. t. 68. f.

Knor. Vergn. V. 5. t. 2. f.

N. III. 5. Helix Pomatia.

N. III. 5. Die gemeine Weinbergſchnecke.

Linn. S. N. *Sp.* 677.

Belg. Wyngards - Slak. *Angl.* Wine - Gard Snail. *Gall.* Le Vigneron. *Geof.*

Teſta perforata ſubgloboſa, faſciis tranſuerſis obſoletis, apertura rotundato lunata.

Die durchbohrte einigermaßen kugelförmige Schael hat undeutliche Querbinden, mit einer rundlichen mondförmigen Mündung.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 316.
Liſt. angl. t. 2. *f.* 1.
—— *Hiſt. Conch. l.* 1. *f.* 46.
Gualt. Teſt. *t.* 1. *f. A.*
Argenv. Conch. *Pl.* 28. *f.* 1.
—— Zoom. *Pl.* 9. *f.* 4.
Gev. Beluſt. 29. *t.* 330 — 342. *f.*
Berlin. Mag. II. 1. *t.* 1. *f.*
Schroet. Erdk. 1. *t.* 10. *f.*

N. III. 6. Helix Pomaria.

N. III. 6. Die linksgewundene Weinbergſchnecke.

 Müll.

Müll. Hiſt. Verm. Sp. 244.

Teſta perforata, ſubglobosa, ſiniſtroſa, ruſeſcente, faſciis transuerſis obſoletis.

Die durchbohrte, einigermaßen kugelförmige, linksgewundene Schale iſt von braunlichter Farbe, mit matten Querbändern.

Mus. Caes. Vindobon.

N. III. 7. Helix cretacea.

N. III. 7. Die Kreidenſchnecke.

Müll. Hiſt. Verm. (*nemoralis*) *Sp.* 157.

Teſta perforata ſubgloboſa, laeui, albida, faſciis transuerſis fuſcis.

Die durchbohrte einigermaſſen kugelförmige glatte Schale iſt von weißlichter Farbe mit braunen Querbändern.

Mus. Caes. Vindobon.

N. III. 8. Helix glauca.

N. III. 8. Das Kuhauge.

Linn. S. N. Sp. 678.

Teſta umbilicata, ſubrotunda, acuminata; labro marginato, apertura ouali.

Die genabelte, rundlichte ſpizwirblige Schale hat an der eyförmigen Mündung eine geſäumte Schalenleſze.

Seb.

Seb. Thes. III. *t.* 38. *f.* 8.

Gev. Beluſt. 3. *t.* 20. *f.*

Knor. Vergn. V. 5. *t.* 5. *f.*

N. III. 9. Helix citrina.

Linn. S. N. Sp. 679.

Belg. Navel-Slak.

N. III. 9. Die Nabelſchnecke.

Teſta perforata rotundata, compreſſa, laeui, faſcia transuerſa diuerſicolore.

Die durchbohrte rundlichte flachgedrückte glatte Schale iſt mit einem gefärbten Bande umgeben.

α ſubpellucida, pallide ſulphurea, faſciis duabus opacis niueis, ſuprema tenuiore.

α halbdurchſichtig, blaßſchwefelgelb mit zwey ſchneeweißen Bändern, davon das obere ſchmäle riſt.

Gev. Beluſt. 26. *t* 285. *f.*

Mus. Caes. Vindobon.

β lactea, faſcia dorſali rufa, niueae opacae ſuperne contigua.

β ſchneeweiß mit einem rothbraunen Querbande, unter welchem nahe eine ſchneeweiße undurchſichtige Binde lieget.

Mus. Caes. Vindobon.

γ butyracea, ſpira apice & faſcia dorſali ferrugineis.	γ butterfarbig, mit einer roſtfarbigen Schnirkelſpize, und Querbande um den Rücken.

Gualt. Teſt. t. 2. f. D.

Argenv. Conch. Pl. 28. f. 10.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 1 — 6.

Mus. Caes. Vindobon.

δ ferruginea, faſcia dorſali alba.	δ roſtfarbig, mit einer weißen Querbinde.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 1. f. 57.

Gualt. Teſt. t. 3. f. E.

Gev. Beluſt. 26 t. 277 f.

Knor. Vergn. V. 22. t. 7. f.

Mus. Caes. Vindobon.

N. III. 10. Helix zonaria.	N. III. 10. Die Gürtelſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 681.

Belg. Gebandeerde Poſt-hoorn. *Gall.* Cornet de Poſtilon bandé.

Teſta

Teſta umbilicata, depreſſa, apertura transuerſa, labro candido reflexo.

Die genabelte flache Schale hat an der querliegenden Mündung eine weiße übergeſchlagene Schalenlefze.

α alba, undis niueis, faſciis transuerſis tribus rufis, infima latiore.

α weiß, mit ſchneeweißen Wellen, und drey rothbraunen Querbinden, davon die untere ſchmäler iſt.

β alba, faſciis octo inaequalibus rufis.

β weiß, mit acht ungleich breiten rothbraunen Querbändern.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 1. *f.* 72.
Gualt. Teſt. t. 3. *f.* L.
Seb. Thes. *III. t.* 40. *f.* 52. 53. 55.
Knor. Verg. V. 21. *t.* 3. 4. *f.*

N. III. 11. Helix Voluulus.

N. III. 11. Das Wirbelhorn.

Müll. Hiſt. Verm. Sp. 280.

Teſta trochiformi, umbilicata, mucronata; apertura rotunda, labro reflexo.

Die kräuſelartige genabelte ſpitzwirblige Schale hat an der runden Mündung eine übergeſchlagene Schalenlefze.

Petiv. Gaz. t. 77. *f.* 6.
Seb. Thes. III. t. 40. *f.* 18. 19.

N. III. 12. Helix ungulina.

Linn. S. N. Sp. 682.

N. III. 12. Das Schlangenhorn.

Belg. Slangetje. *Rumph. Angl.* Thick-lipt Cake-Shell. *Pet. Gall.* Cornet de Chaſſeur. *Dav.*

Teſta utrinque umbilicata, ſubgloboſa, apertura lunata, labro reflexo albo.

Die beiderſeits genabelte, einigermaßen kugelförmige Schale hat an der mondförmigen Mündung eine übergeſchlagene weiße Schalenlefze.

Baſis obtuſe carinata.

Der Grund hat eine ſtumpfe Querkiele.

Rumph. amb. t. 27 *f.* R.

Petiv. amb. t. 12. *f.* 13.

Klein. Meth. Oſtr. t. 1. *f.* 11.

Gev. Beluſt. 7. *t.* 7. *f.*

Mus. Caes. Vindobon.

N. III. 13. Helix Pileus.

Müll. Hiſt. Verm. Sp. 277.

N. III. 13. Der Huthſchnirkel.

Teſta perforata, conica, alba; faſciis transuerſis rufis, apertura transuerſa, labro reflexo.

Die durchbohrte kegelförmige weiße Schale iſt mit rothbraunen Querbändern umgeben, und an der querliegenden Mündung mit einer übergeſchlagenen Schalenlefze verſehen.

Mus. Caes. Vindobon.

N. III. 14. Helix mammillaris.

N. III. 14. Der Warzenſchnirkel.

Linn. S. *N.* *Sp.* 685.

Teſta umbilicata, ouata; apertura oblonga, apici adnata.

Die genabelte eyförmige Schale hat eine länglichte mit der Schnirkelſpize verwachſene Mündung.

Liſt. *Hiſt.* *Conch.* *l.* 2. *f.* 36.
Mus. *Caes.* *Vindobon.*

N. III. 15. Helix peruerſa.

N. III. 15. Der verkehrte Schnirkel.

Linn. S. *N.* *Sp.* 688.

Belg. Top-Slak. *Gall.* L'Unique.

Teſta ſubperforata, ouato oblonga, ſiniſtrorſa, labro reflexo albo.

Die einigermaßen durchbohrte, länglicht eyrunde linksgewundene Schale, hat eine übergeſchlagene weiße Schalenlefze.

α aurantia, linea longitudinali una alteraue purpurea.

α orangengelb, mit einer, oder mehrern nach der Länge herablaufenden purpurrothen Linien.

Bonan. Recr. cl. 3. *f.* 116.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 1. *f.* 33.
Gualt. Teſt. t. 5. *f.* P.
Argenv. Conch. Pl. 9. *f.* G. *interior.*
Seb. Thes. III. t. 40. *f.* 37.
Berlin. Mag. III. 28. t. 4. 5. *f.*

β viridis, faſciis citrinis.

β grün, mit zitronengelben Bändern.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 1. *f.* 34.
Gualt. Teſt. t. 5. *f.* P.
Knor. Vergn. V. 23. t. 4. *f.*

γ alba, maculis longitudinalibus rufis.

γ weiß, mit nach der Länge herablaufenden rothbraunen Flecken.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 8. *f.* 64.
Petiv. Gaz. t. 76. *f.* 5.
Gualt. Teſt. t. 5. *f.* O.
Knor. Vergn. V. 23. t. 5. *f.*

N. III. 16. Helix janthina.

N. III. 16. Die blaue Schnirkelſchnecke.

Linn.

Linn. S. N. Sp. 689.

Belg. Kwalle - Bootje.

Teſta ſubimperforata ſubrotunda, obtuſa, fragili, apertura dilatata, labro marginato.

Die einigermaßen genabelte faſt runde, ſtumpfwirblige, dünne Schale hat eine erweiterte Mündung, mit einer übergeſchlagenen Schalenlefze.

Rumph. amb. t. 20. *f.* 2.

Gualt. Teſt. t. 64. *f.* 0.

Berlin. Magaz. II. 2. *t.* 2. *f.*

Knor. Vergn. II. 30. *t.* 2. 3. *f.*

N. III. 17. Helix viuipara.

N. III. 17. Die lebendig gebährende Schnirkelſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 690.

Teſta ſubimperforata, ouato oblonga, ventricoſa, faſciis transuerſis fuſcis; apertura rotunda.

Die einigermaßen durchbohrte länglichte eyförmige bäuchige Schale hat braune Querbänder, und eine runde Mündung.

Liſt. angl. t. 2. *f.* 18.

—— *Hiſt. Conch. l.* 2. *f.* 26.

Petiv. Gaz. t. 99. f. 16.

Gualt. Teſt. t. 5. f. A.

Argenv. Zoom. Pl. 8. f. 2.

Seb. Thes. III. t. 93. f. 34.

Ginan. adr. II. t. 2. f. 8.

Berlin. Mag. IV. 7. t. 4—9. f.

Müll. Linn. Naturſ. VI. 1. B. 18. t. 4. f.

N. III. 18. Helix vitrea.

N. III. 18. Der Glasſchnirkel.

Teſta ſubimperforata ouata, ſubpellucida, ventricoſa, ſpirae anfractibus carinatis.

Die einigermaßen durchbohrte eyförmige, halbdurchſichtige Schale hat kielförmig erhabene Schnirkelgewinde.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ouata, fragiliſſima, ſubpellucida, laeuis. Anfractus quinque, infimus ventricoſus, conuexus; ſuperiores ſpirales carinati. Apertura ouato oblonga. Columella perforata, foramine tenui ſubobtecto. Color luteo fuſcus; faſciis longitudinalibus undulatis ſulphureis.

Die Schale iſt eyförmig und ſehr gebrechlich, halbdurchſichtig und glatt. Sie beſtehet aus fünf Gewinden, davon das unterſte bäuchig, und runderhaben, die oberen aber, welche den Schnirkel bilden, kielförmig erhaben ſind. Die Mündung iſt länglicht eyförmig; Die Spindel durchbohret, mit einem dünnen halbgedeckten Nabelloch. Von gelblich brauner Farbe mit nach der Länge herablaufenden wellenförmigen ſchwefelgelben Bändern.

N. IV.

N. IV. Rodundatae, imperforatae.

N. IV. Rundlichte, undurchbohrte.

N. IV. 1. Helix nemoralis.

N. IV. 1. Die Waldſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 691.

Teſta imperforata, rotundata, labro fuſco.

Die undurchbohrte rundlichte Schale hat eine braune Mündung.

α lutea unicolor.

α gelb, einfärbig.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 1. f. 54.
Petiv. Gaz. t. 91. f. 9.
Gev. Beluſt. 32. t. 398. f.

β lutea, faſcia transuerſa fuſca.

β gelb mit einer rothbraunen Querbinde.

Petiv. Gaz. t. 91. f. 10.
Gualt. Teſt. t. 2. f. D.
Seb. Thes. III. t. 39. f. 18.
Gev. Beluſt. 32. t. 403. f.
Schroet. Erdk. 2. t. 38. f.

γ lutea, faſciis tribus fuſcis, infima & media latiſſima.

γ gelb, mit drey braunen Querbinden, davon die unterſte und mittere die breiteſten ſind.

Gev.

Gev. Beluſt. 32. *t.* 407. *f.*

δ lutea, faſciis quatuor fuſcis.

δ gelb, mit vier braunen Querbändern.

Gev. Beluſt. 32. *t.* 408 *f.*
Berlin Magaz. II. 3. *t.* 30. *f.*
Schlott. Act. helv. V. 3. *t.* 9. *f.*

ε lutea, faſciis quatuor fuſcis, inferioribus ſubaequalibus, ſuprema anguſtiore.

ε gelb, mit vier braunen Querbändern, davon die oberſte ſchmaler, die unteren gleichbreit ſind.

Berlin. Mag. II. 3. *t.* 27. 28. 29. *f.*
Schlott. Act. helv. V. 3. *t.* 2. 3. *f.*
Mus. Caes. Vindobon.

ζ lutea, faſciis quinque fuſcis, furſum decreſcentibus.

ζ gelb, mit fünf braunen Querbändern.

Seb. Thes. III. *t.* 39. *f.* 12.
Gualt. Teſt. t. 2. *f.* F.
Berlin. Mag. II. 3. *t.* 31. 32. *f.*
Schlott. Act. helv. V. 3. *t.* 10. *f.*
Schroet. Erdkonch. I. *t.* 17. *f.*

η roſea,

η roſea, faſciis quinque transuerſis fuſcis, binis, infimis latioribus.

η roſenroth, mit fünf braunen Querbändern.

Mus. Caeſ. Vindobon.

N. IV. 2. Helix hortenſis.

N. IV. 2. Die Gartenſchnecke.

Teſta imperforata, ſubgloboſa, labro albo.

Die undurchbohrte rundlichte Schale, hat eine weiße Mündung.

Lutea, faſciis quinque transuerſis fuſcis, ſurſum decreſcentibus.

Gelb, mit fünf braunen Querbändern, davon die oberen ſchmäler ſind.

Gev. Beluſt. 31. *t.* 374. 375. *f.*

N. IV. 3. Helix picta.

N. IV. 3. Die gemalte Schnirkelſchnecke.

Teſta imperforata, ſubgloboſa, obtuſa, laeui, columella anfractuumque marginibus coloratis.

Die undurchbohrte rundlichte glatte Schale, iſt an der Spindel, und an dem Rande der Gewinde gefärbet.

Teſta ſubgloboſa, laeuis. Anfractus quatuor conuexi, infimus ventricoſus, ſpirales obtuſi, complanati. Apertura lunata. Columella ſpiralis, patens.

Die Schale iſt einigermaßen kugelförmig, und glatt. Die vier Gewinde ſind erhabenrund, davon das unterſte bäuchig, die aber den Schnirkel ausmachen, ſtumpf und flach gedrücket ſind. Die Mündung iſt mondförmig, Die Spindel ſchnirkelförmig und offen.

α gri-

α griſea, columella lineaque ſuturali & transuerſa dorſi fuſca.

α lichtgrau, mit brauner Spindel, und einer braunen Querlinie nächſt der Nath, und um die Mitte des Rückens.

Mus. Caes. Vindobon.

β roſea, columella lineaque ſuturali & transuerſa dorſi fuſca.

β roſenroth, mit brauner Spindel, und einer braunen Querlinie nächſt der Nath, und um die Mitte des Rückens.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 5.

Knor. Vergn. I. 10. *t.* 2. *f.*

γ ſulphurea, columella lineaque ſuturali anfractuum rubra.

γ ſchwefelgelb, mit brauner Spindel, und rothen Linie an den Rändern der Gewinde.

Mus. Caes. Vindobon.

N. IV. 4. Helix verſicolor.

N. IV. 4. Die bunte Schnirkelſchnecke.

Teſta imperforata ſubgloboſa niuea, columella roſea, lineis transuerſis faſciisque intermediis diſcoloribus.

Die undurchbohrte, rundliche Schale hat eine rothe Spindel, dünne Querlinien, mit dazwiſchen liegenden Bändern von verſchiedenen Farben.

Mus. Caes. Vindobon.

Te-

Teſta ſubgloboſa laeuis. Anfractus conuexi, infimus ventricoſus, ſpirales obtuſi. Apertura lunata. Columella ſpiralis, imperforata. Color niueus, lineis transuerſis parallelis fuſciis, faſciisque intermediis ſulphureis, roſeisque; columella roſea.

Die Schale iſt rundlicht, und glatt. Die ſechs Gewinde ſind erhabenrund, das unterſte bauchig, die den Schnirkel bilden ſtumpf. Die Mündung iſt eyförmig. Die Spindel ſchnirkelförmig, undurchbohret. Von ſchneeweißer Farbe mit braunen gleichweitſtehenden Querlinien, mit ſafrangelben, und roſenrothen Zwiſchenbändern. Die Spindel iſt roſenroth.

N. IV. 5. Helix aperta.

N. IV. 5. Die offene Schnirkelſchnecke.

Teſta imperforata, ſubgloboſa, ſpira obtuſa, minima, columella ſpirali aperta.

Die undurchbohrte rundlichte Schale hat einen ſtumpfen kleinen Schnirkel, und eine ſchnirkelförmige offene Spindel.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſubgloboſa, tenuis, longitudinaliter obſolete ſtriata. Anfractus tres, infimus ventricoſus, ſuperiores ſpirales obtuſi, breues, complanati. Apertura lunata. Columella imperforata, ſpiralis, aperta. Color fuſcus.

Die Schale iſt einigermaßen kugelförmig, dünn, und nach der Länge ſehr fein geſtreifet. Sie beſtehet aus drey Gewinden, davon das unterſte bauchig, die oberen Schnirkelgewinde aber ſtumpf, kurz, und flach gedrückt ſind. Die Mündung iſt mondförmig. Die Spindel undurchbohret, ſchnirkelförmig, und offen. Die Farbe braun.

N. IV. 6. Helix Haematragus.

Teſta conuexo trochiformi, caſtanea, faſcia transuerſa alba; apertura transuerſim elongata roſea.

N. IV. 6. Das Blutohr.

Die runderhabene kräuſelförmige kaſtanienbraune Schale hat ein weißes Querband und eine querliegende länglichte roſenrothe Mündung.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 2. *f.* 3.
Seb. Thes. III. t. 40. *f.* 6. 7.
Gev. Beluſt. 28. *t.* 328. 329. *f.*

Teſta trochiformis. Anfractus quinque conuexi, uniformiter de creſcentes, & eleuati in ſpiram conicam obtuſum. Suturae contiguae crenulatae. Apertura transuerſim elongata auriformis. Columella imperforata complanata. Color caſtaneus, faſcia infra medium dorſi transuerſa alba. Apertura, & ſpirae apex roſea.

Die Schale iſt kegelförmig. Die fünf Gewinde ſind erhabenrund, und nehmen gleichförmig ab in einen kegelförmigen Schnirkel. Die Näthe ſind an einander verwachſen und gekerbet. Die Mündung iſt in die Quere verlängert und ohrförmig. Die Spindel undurchbohret und flach. Von kaſtanienbrauner Farbe, mit einem weißen Querbande unter der Mitte des Rückens. Die Mündung und die Schnirkelſpize ſind roſenroth.

N. IV. 7. Helix Melanotragus.

N. IV. 7. Das Schwarzohr.

Teſta conuexa, trochiformi, caſtanea, faſciis duabus transuerſis niueis; apertura transuerſim elongata nigra.

Die runderhabene kräuſelförmige kaſtanienbraune Schale hat zwey ſchneeweiße Querbänder und eine in die Quere verlängerte ſchwarze Mündung.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſimillima priori: parum depreſſior, caſtanea, faſcia transuerſa niuea, prope ſuturam tenui, lata vero infra medium dorſi. Apertura ex fuſco nigra.

Die Schale iſt der vorhergehenden am ähnlichſten: nur etwas flächer, von kaſtanienbrauner Farbe, mit zwey ſchneeweißen Querbändern, davon das ſchmälere nächſt der Nath, das breite aber unter der Mitte des Rückens liegt. Die Mündung ſchwarzbraun.

N. V. Turritae.

N. V. Gethürmte.

N. V. 1. Helix decollata.

N. V. 1. Die abgeſtuzte Schnirkelnadel.

Linn. S. N. Sp. 695.

Teſta turrita, ſubperſorata; vertice obtuſe truncato, apertura ouata.

Die gethürmte, einigermaſſen durchbohrte Schale hat eine ſtumpf abgeſtuzte Schnirkelſpize; mit einer eyförmigen Mündung.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 56.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 1. *ſ.* 1. *f.* 12.
Petiv. Gaz. *t.* 66. *f.* 1.
Gualt. Teſt. *t.* 4. *f.* O. P. Q.
Argenv. Conch. *Pl.* 27. *f.* 5.
Knor. Vergn. VI. 12. *t.* 3. *f.*
Murr. Fund. *Teſt. t.* 1. *f.* 3.

N. V. 2. Helix calcarea.

N. V. 2. Die Marmornadel.

Teſta turrita, longitudinaliter ſtriata, alba; anfractibus decem, apertura ouata.

Die gethürmte nach der Länge feingeſtreifte weiße Schale hat eine ſtumpf abgeſtuzte Schnirkelſpize mit einer eyförmigen Mündung.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 1. *ſ.* 1. *f.* 9.
Gualt. Teſt. *t.* 6. *f.* J.
Mus. Caes. Vindobon.

Teſta priori ſimillima: at triplo major, nitens, longitudinaliter tenuiſſime ſtriata. Anfractus decem, teretes, vniformiter decreſcentes.

Die Schale iſt der vorigen am ähnlichſten: aber dreymal größer, glatt, und nach der Länge ſehr fein geſtreifet. Die zehen Gewinde

Aper-

Apertura ouata. Columella torta, tecta labio expanſo, tenui. Color albus.

ſind rund, und nehmen gleichförmig ab. Die Mündung iſt eyförmig. Die Spindel gedrehet, und mit einer ausgebreiteten dünnen Lefze gedecket. Von weißer Farbe.

An prioris varietas perfecta?

Vielleicht eine vollkommene Abänderung der vorigen Art.

N. V. 3. Helix plicata.

N. V. 3. Die gefaltene Schnirkelnadel.

Teſta ſubulata, anfractibus plicis longitudinalibus coronatis.

Die ahlförmige Schale iſt an den Gewinden mit erhabenen nach der Länge herablaufenden Falten gekrönet.

Gualt. Teſt. t. 6. f. H.
Berlin. Magaz. IV. 10. t. 51. f.
Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſubulata ſubpellucida. Anfractus decem conuexi, prope ſuturam ſuperiorem plicis elevatis longitudinalibus coronati. Apertura ouata. Columella elabiata.

Die Schale iſt ahlförmig und halb durchſichtig. Die zehen Gewinde ſind erhabenrund, und an der obern Nath mit nach der Länge herablaufenden Falten gekrönet. Die Mündung iſt eyförmig. Die Spindel ohne Lefze.

N. V. 4. Helix maculata.

N. V. 4. Die gefleckte Schnirkelnadel.

Teſta ſubulata laeui, picta undis longitudinalibus rufis.

Die ahlförmige glatte Schale iſt mit nach der Länge herablaufenden rothbraunen Wellen bemalet.

Gualt. Teſt. t. 6. f. G.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſubulata, laeuis, ſtriis transuerſis ſubtiliſſimis circumdata. Anfractus circiter duodecem conuexi. Apertura ouata. Labium laeue. Color pallidus, faſciis undulatis longitudinalibus rufis.

Die Schale iſt ahlförmig und glatt, mit sehr feinen Querſtreifen umgeben. Die Gewinde deren beyläufig zwölf, ſind erhabenrund Die Mündung eyförmig. Die Spindelleſze glatt. Von blaßer Farb mit nach der Länge laufenden rothbraunen Wellen bemalet.

N. V. 5. Helix fuſcatus.

N. V. 5. Die braune Schnirkelnadel.

Teſta ſubulata laeui, anfractibus teretibus.

Die ahlförmige glatte braune Schale hat flachrunde Gewinde.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 2. f. 10.

Gualt. Teſt. t. 6. f. E.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta

Teſta ſubulata laeuis, transuerſim ſubtiliſſime ſtriata, Anfractus decem teretes. Apertura ouata. Labium laeue. Faux cinerea. Color ex luteo fuſcus.

Die Schale iſt eyförmig und glatt, in die Quere ſehr fein geſtreiſet. Die zehen Gewinde ſind flachrund. Die Mündung eyförmig. Die Spindellefze iſt glatt. Der Schlund aſchengrau. Die Schale außen gelblichtbraun.

N. VI. Ouatae, imperforatae.

N. IV. Eyförmige, undurchbohrte,

N. VI. 1. Helix Amarula.

N. VI. 1. Die Fluß-Papſtkrone.

Linn. S. N. Sp. 702.

Belg. Rivier Pauſe-Kroon, *Rumph. Angl.* River-Mitter-Shell. *Petiv. Gall.* La tiare fluviatile. *Dav.*

Teſta ouata imperforata, nigra; anfractibus ſurſum ſpinoſo dentatis.

Die eyförmige undurchbohrte ſchwarze Schale iſt oben an den Gewinden mit zahnförmigen Stacheln beſezet.

Dorſum notatum cicatricibus oualibus, margine albo cinctis, quemadmodum Nerita pulligera.

Der Rücken iſt nach Art der bruttragenden Schwimmſchnecken, mit eyförmigen Narben beſezet, die mit einem weißen Saume eingefaßt ſind.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 2. *p.* 1. *f.* 33.

Rumph. amb. t. 33. *f.* F. F.

Petiv. amb. t. 4. f. 3.

Gualt. Teſt. t. 6. f. B

Argenv. Conch. Pl. 27. f. poſt 6tam.

Seb. Thes. III. t. 53. f. 24. 25.

Berlin. Magaz. IV. 9. t. 38. f.

Mus. Caes. Vindobon.

N. VI. 2. Helix ſtagnalis.

N. IV. 2. Das Teichhorn.

Linn. S. N. Sp. 703.

Teſta ouato ſubulata, imperforata, ſubangulata, ventricoſa; apertura ouata.

Die eyförmige ahlförmig zugeſpizte Schale iſt bäuchig und etwas eckig, mit einer eyförmigen Mündung.

Liſt. angl. t. 2. f. 21.

——— Hiſt. Conch. l. 4. p. 1. f. 21.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 55.

Gualt. Teſt. t. 5. f. J.

Argenv. Conch. Pl. t. 27. f. 6.

——— Zoom. Pl. 8. f. 5.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 41 — 46. 52. 53.

Klein. Meth. Oſtr. t. 3. f. 69.

Slotterb. Act. helv. V. t. 3 f. 25. 26.

Ginan.

Ginan. adr. *II.p.* 2. *t.* 1. *f.* *A.B.C.*

Berlin. Mag. IV. 9. *t.* 33. 35. 36. *f.*

Mus. Caes. Vindobon.

N. VI. 3. Helix auricularia.

Linn. S. N. Sp. 708.

Gall. La Conque ſpherique.

Teſta ſubimperforata ampullacea, ſpira mucronata breui, apertura ampliata.

N. VI. 3. Das Ohrhorn.

Die undurchbohrte aufgeblaſene Schale hat kurze, verdünnte Schnirkelſpize, und eine weite Mündung.

Liſt. angl. t. 2. *f.* 23.

—— *Hiſt. Conch. l.* 1. *p.* 1. *f.* 23.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 54.

Gualt. Teſt. t. 5. *f.* F. G.

Argenv. Conch. *Pl.* 27. *f.* 7.; *Pl.* 28. *f.* 22.

Schlott. Act. helv. V. 3. *t.* 27. 28.

Ginan. adr. *II. p.* 2. *t.* 1. *f.* 3.

Berlin. Mag. III. 5. *t.* 66. *f.*

—— —— *IV.* 11. *t.* 59. *f.*

Schroet. Erdk. 1 *t.* 3 *f.*

Murr. Fund. *Teſt. t.* 1. *f.* 4.

Mus. Caes. Vindobon.

N. VI. 4. Helix ſolida.

Teſta ouato oblonga, imperforata ſolida, glabra; anfractibus conuexis, columella incraſſata.

N. VI. 4. Die dickſchalige Schnirkelſchnecke.

Die eyförmig länglichte undurchbohrte Schale iſt dicht und glatt, mit erhabenrunden Gewinden, und einer verdickten Spindel.

Muſ. Caes. Vindobon.

Teſta oblonga, ſolida, glabra. Anfractus ſex conuexi, contingui. Apertura rotundato oblonga. Columella imperforata, labio incraſſato, breui. Color roſeus, lineis transuerſis tenuiſſimis rubro alboque articulatis.

Die Schale iſt länglicht, dicht, und glatt. Die ſechs Gewinde ſind an einander verwachſen, und erhabenrund. Die Spindel iſt undurchbohret, mit einer verdickten Lefze. Von roſenrother Farbe, mit ſehr feinen roth und weiß unterbrochenen Querlinien.

N. VI. 5. Helix haliotoidea.

N. VI. 5. Die Milchſchale.

Linn. S. *N.* *Sp.* 713.

Belg. Witte Oor-Schulp. *Angl.* White Ear. *Pet.* *Gall.* Oreille de Venus. *Dav.*

Teſta

Teſta elliptica, complanata, imperforata; apertura ad apicem uſque hiante.

Die elliptiſche, plattgedrückte undurchbohrte Schale hat eine bis in die innerſte Wirbelſpize offene Mündung.

Liſt. *Hiſt.* Conch. l. 4. ſ. 5. f. 21.
Petiv. amb. t. 16. f. 29.
Rumph. amb. t. 40. f. R.
Gualt. *Teſt.* t. 69. f. F.
Argenv. Conch. Pl. 5. f. C.
Adans. Seneg. Pl. 2. f. 2.
Klein. *Meth.* Oſtr. t. 7. f. 114.
Knor. *Vergn.* *VI.* 39. t. 5. f.
Mart. Konch. Kab. I. 15. t. 151. 152. f.
Da Coſt. *Elem.* *Pl.* 3. f. 8.

N. VI. 6. Helix àmbigua.
Linn. S. N. Sp. 714.

N. VI. 6. Der Halbmond.

Teſta ſubimperforata, rotundata, ſolida; apertura ſemiorbiculari; labio incraſſato.

Die undurchbohrte, rundliche, dichte Schale hat eine halbrunde Mündung mit einer verdickten Spindelleſze.

Labium citrinum.

Die Spindelleſze iſt zitrongelb.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 5. f. 39. 40.
Adans. Seneg. Pl. 1. f. 6. 7.
Gev. Beluſt. 28. t. 319. 320. f.
Knor. Vergn. VI. 23. t. 5. 6. f.

O. Nerita.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 329.

Teſta ſpiralis. Aperturae labio transuerſo planiuſculo.

O. Die Schwimmſchnecke.

Die Schale iſt ſchnirkelförmig. Die Mündung hat eine flachgedrückte querliegende Spindellefze.

O. I. Vmbilicatae.

O. I. Genabelte.

O. I. 1. Nerita Canrena.
Linn. S. N. Sp. 715.

O. I. 1. Der Knotennabel.

Belg. Navel-Slak. *Angl.* Dice Nerit.

Teſta umbilicata, laeui; ſpira mucronata; umbilico gibbo bifido.

Die genabelte, glatte, ſpizwirblige Schale hat einen höckerigen zweytheiligen Nabel.

α albi-

α albida, punctis adſperſa ferrugineis. α weißlich, mit roſtfarbigen Punkten.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 228.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 5. f. 11.
Gualt. Teſt. t. 67. f. Q. S.
Adans. Seneg. Pl. 13. f. 3.
Seb. Thes. III. t. 38. f. 60. 61.
Knor. Vergn. I. 10. t. 3. f.
Murr. Fund. Teſt. t. 1. f. 23.

β albida, ſeriebus transuerſis macularum ferruginearum. β weißlicht, mit Querbändern von roſtfarbigen Flecken.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 224.
Gualt. Teſt. t. 67. f. R.
Seb. Thes. III. t. 38. f. 62. 63.
Gev. Beluſt. 27. t. 303. 304. f.

γ albida, lineis longitudinalibus angulatis ferrugineis. γ weißlicht, mit nach der Länge laufenden roſtfarbigen Winkelzügen.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 4. *ſ.* 5. *f.* 1.
Gualt. Teſt. t. 67. *f.* X.
Gev. Beluſt. 27. *t.* 295. 302. *f.*
Argenv. Conch. Pl. 7. *f.* C.
Adans. Seneg. Pl. 13. *f.* 4.
Seb. Thes. III. *t.* 38. *f.* 1. 54.
Regenſ. Samml. I. 3. *t.* 34. *f.*
Knor. Vergn. I. 10. *t.* 4. *f.*

δ griſea, faſciis transuerſis albo fuſcoque articulatis.

δ gelbgrau, mit weiß und braun unterbrochenen Querbändern.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 4. *ſ.* 5. *f.* 3. 4. 8.
Gualt. Teſt. t. 67. *f.* V.
Seb. Thes. t. 38. *f.* 27. 28. 51. 52. 64. 65.
Gev. Beluſt. 27 *t.* 294. *f.*
Knor. Vergn. I. 10. *t.* 5. *f.*
—— —— *II.* 10. *t.* 5. *f.*
—— —— *III.* 15. *t.* 4. *f.*; 20. *t.* 4. *f.*

O. I. 2. Nerita glaucina.

O. I. 2. Die dicklippige Schwimmſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 716.

Gall. Limaçon du Rivage.

Teſta umbilicata laeui, ſpira obtuſa, umbilico ſemiclauſo; labio gibbo decolore.

Die genabelte glatte ſtumpfwirblige Schale hat einen halbgedeckten Nabel, mit einer höckerigen gefärbten Lippe.

Liſt. angl. t. 3 *f.* 10.

——*Hiſt. Conch. l.* 4. *ſ.* 5. *f.* 10.

Rumph. amb. t. 22. *f.* C.

Petiv. amb. t. 10. *f.* 11.

Gualt. Teſt. t. 67. *f.* M. P. T.

Adans. Seneg. Pl. 13. *f.* 4.

Seb. Thes. III. *t.* 38. *f.* 33.

Knor. Vergn. VI. 13. *t.* 7. *f.*

O. I. 3. Nerita rufa.

O. I. 3. Die braune Nerite.

Angl. Twin girdled Nerit. *Petiv.*

Teſta umbilicata, laeui, ſpira obtuſa, umbilico biſido.

Die genabelte glatte ſtumpfwirblige Schale, hat einen zweyſpaltigen Nabel.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 6. *f.* 34.

Rumph. amb. t. 22. *f. D.*

Petiv.

Petiv amb. t. 11. *f.* 3.

Argenv. Conch. *Pl.* 7. *f.* Z.

Seb. Thes. III. t. 39. *f.* 30.

Gev. Beluſt. 27. *t.* 296. *f.*

Teſta ſubgloboſa, laeuis. Anfractus quatuor, infimus ventricoſus, ſuperiores efformantes ſpiram complanatam, obtuſam. Apertura ſemirotunda. Labium reflexum, glabrum, non claudens umbilicum. Vmbilicus profundus, coſta eleuauata bipartitus.

Die Schale iſt einigermaßen genabelt und glatt. Von den vier Gewinden iſt das unterſte bäuchig, die obern bilden einen zuſammengedrückten ſtumpfen Schnirkel. Die Mündung iſt halbrund Die Spindellefze iſt übergeſchlagen, und glatt, mit einem offenen tiefen Nabel, welcher durch eine erhabene Ribbe in zwey getheilet wird.

O. I. 4. Nerita Vitellus.

O. I. 4. Der Eyerdotter.

Linn. S. N. Sp. 717.

Belg. Strand - Doijer. *Angl.* Doyer Velk, Nerit- *Pet.* *Gall.* Jaune d' oeuf. *Dav.*

Teſta umbilicata ſubgloboſa laeui, umbilico aperto aequali.

Die genabelte einigermaßen kugelrunde glatte Schale hat einen offenen glatten Nabel.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 5. *f.* 12.

Rumph. amb. t. 22. *f. A.*

Petiv. amb. t. 10. *f.* 13.

Gualt. Teſt. t. 67. *f.* L.

Argenv. Conch. *Pl.* 7. *f.* D.

Gev. Beluſt. 27. *t.* 292 *f.*

Seb. Thes. *III. t.* 38. *f.* 30. 31.
Knor. Vergn. I. 7. *t.* 2. *f.*
—— —— *II.* 8. *t.* 5. *f.*

O. I. 5. Nerita Albumen.

O. I. 5. Der geſchobene Eyerdotter.

Linn. S. N. Sp. 718.

Belg. Platte Doyer. *Angl.* Velk Nerit. *Gall.* Jaune d'oeuf applati. *Dav.*

Teſta umbilicata conuexa, umbilico ſubcordato, labio explanato.

Die genabelte erhabenrunde Schale hat einen etwas herzförmigen Nabel, mit einer ausgebreiteten Spindellippe.

Rumph. amb. t. 22. *f. B.*
Petiv. amb. t. 10. *f.* 14.
Gualt. Teſt. t. 67. *f. A. B.*
Argenv. Conch. Pl. 7. *f.* T.
Gev. Beluſt. 28. *t.* 309. *f.*
Regenſ. Samml. I. 5. *t.* 54. *f.*
Knor. *Vergn. II.* 11. *t.* 1. *f.*
—— —— *IV.* 7. *t.* 4. 5. *f.*

O. I. 6. Nerita Mammilla.

O. I. 6. Der Warzendotter.

Linn.

Linn. S. N. Sp. 719.

Belg. Slek-hoorn. *Angl.* White Nerit. *Petiv. Gall.* Mammelon blanc. *Dav.*

Teſta umbilicata, ouata, glabra; umbilico obtecto, apertura ouata.

Die genabelte, eyförmige, glatte Schale hat einen gedeckten Nabel, mit einer eyförmigen Mündung.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 5. f. 22.
Rumph. amb. t. 22. f. F.
Petiv. amb. t. 10. f. 15.
Gualt. Teſt. t. 67. f. C. D.
Argenv. Conch. Pl. 7. f. X.
Seb. Thes. III. t. 38. f. 9. 10.
Gev. Beluſt. 28. t. 306. f.
Knor. Vergn. I. 6. t. 6. 7. f.
—— —— IV. 8. t. 4. f.
—— —— VI. 40. t. 2. 3. f.

O. I. 7. Nerita ſulcata.

O. I. 7. Die gefurchte Schwimmſchnecke.

Teſta ſubgloboſa, ſulcis longitudinalibus, obliquatis; umbilico bifido.

Die einigermaßen kugelförmige Schale hat nach der Länge herab, etwas ſchief laufende Strahlen, und einen zweyſpaltigen Nabel.

Knor.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ſubgloboſa. Anfractus quatuor. Spira mucronata. Sulci ſeu plicae inciſae ſecundum longitudinem deſcendentes. Vmbilicus perforatus, coſta eleuata bipartitus. Color lacteus.

Die Schale iſt einigermaßen kugelförmig. Der Gewinde ſind vier. Der Schnirkel iſt zugeſpizt. Nach der Länge herab und etwas ſchief laufen ausgeſchnittene Furchen oder Falten. Der Nabel iſt offen, und mit einer erhabenen Ribbe in zwey getheilet. Von ſchneeweißer Farbe.

O. II. Imperforatae, labio edentulo.

O. II. Undurchbohrte, ohne Zähnchen an der Spindelleſze.

O. II. 1. Nerita Radula.

O. II. 1. Die rauhe Schwimmſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 721.

Teſta tranſuerſim ſulcata, coſtis intermediis acute tuberculatis.

Die Schale iſt der Quere nach gefurchet, und auf den Zwiſchenribben mit ſpizigen Körnern beſezet.

Gev. Beluſt. 23 *t.* 241 *f.*

Mus. Caes. Vindobon.

O. II. 2. Nerita littoralis.

O. II. 2. Die Strandnerite.

Linn. S. N. Sp. 723.

Teſta laeui, vertice obtuſiuſculo, labio acuto edentulo.

Die glatte etwas ſtumpfwirblige Schale hat eine ſcharfe Schalenleſze ohne Zähnchen.

Liſt. angl. t. 2. *f.* 2.

—— *Hiſt. Conch. l.* 4. *ſ.* 6. *f.* 35 — 38.

Gev. Beluſt. 24. *t.* 250. 252 257. *f.*

Picturis, & coloribus innumeris varians.

Davon giebt es der Farbe und Zeichnung nach unzählbare Spielarten.

O. II. 3. Nerita lacuſtris.

O. II. 3. Die Sumpfnerite.

Linn. S. N. Sp. 725.

Teſta laeui, apice exquiſito, labiis edentulis.

Die glatte Schale hat eine hervorragende Wirbelſpize, und ungezähnelte Leſzen.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 2. *p.* 1. *f.* 38.; *l.* 4. *ſ.* 6. *f.* 43

Petiv. Gaz. t. 91. *f.* 3.

Gualt. Teſt. t. 4. *f.* M. LL.

Gev. Beluſt. 24. *t.* 258 — 265. *f.*

Berlin. Mag. IV. 8. *t.* 27. 28. *f.*

O. III. Imperforatae, labio dentato.

O. III. Undurchbohrte mit ungezähnter Spindelleſze.

O. III. 1. Nerita pulligera.

O. III. 1. Die bruttragende Nerite.

Linn. S. N. Sp. 726.

Belg. Rood-Oog. *Angl.* Red Nerit.

Teſta

Teſta laeui, ſpirae apice excauato umbilicato, labio crenulato.

Die glatte Schale hat eine nabelförmig ausgehöhlte Schnirkelſpize, und eine glatte feingekerbte Spindelleſze.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 2. *p.* 1. *f.* 37.
Petiv. Gaz. *t.* 11. *f.* 4.
—— *amb. t.* 11. *f.* 4.
Rumph. amb. t. 22. *f. H.*
Gualt. Teſt. t. 4. *f. HH.*
Seb. Thes. III. *t.* 41. *f.* 23 — 26.
Gev. Beluſt. 31. 23. *t.* 242. *f.*
Berlin. Mag. IV. 8. *t.* 31. *f.*
Knor. Verg. VI. 13. *t.* 3. *f.*

O. III. 2. Nerita cornea.
Linn. S. N. Sp. 722.

O. III. 2. Die Hornnerite.

Teſta rotundata, obſolete ſtriata, labiis edentulis.

Die rundlichte mattgeſtreifte Schale hat an den Lippen keine Zähne.

Nigra, punctis faſciisque transuerſis luteis.

Schwarz, mit gelben Punkten und Querbändern.

Argenv. Conch. *Pl.* 6. *f. M.*
Gev. Beluſt. 22. *t.* 226. *f.*

O. III. 3. Nerita viridis.

O. III. 3. Die grüne Schwimmſchnecke.

Linn. S. *N.* Sp. 729.

Teſta laeui viridi, labio crenulato.

Die glatte grüne Schale hat eine feingekerbte Schalenleſze.

Mus. Caes. Vindobon.

O. III. 4. Nerita virginea.

Linn. S. *N.* *Sp.* 730.

O. III. 4. Der Blutzahn.

Belg. Ploedige Tand. *Gall.* Quenotte.

Teſta laeui, ouata, labio gibbo, crenulato.

Die glatte eyförmige Schale hat eine höckerige feingekerbte Schalenleſze.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 204.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 6. *f.* 25. 26.

Petiv. Gaz. *t.* 11. *f.* 3.

Argenv. Conch. *Pl.* 7. *f.* P.

Gev. *Beluſt.* 24. *t.* 251. *f.*

Knor. *Vergn.* *V.* 3. *t.* 2. *f.*

O. III. 5. Nerita pennata.

O. III. 5. Die gefiederte Schwimmſchnecke.

Teſta

Teſta rotundata, laeui, labio plano crenulato.

Die rundliche glatte Schahat eine flache feingekerbte Schalenlefze.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 6. f. 29.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta rotundata, laeuis. Anfractus circiter quatuor, infra ſuturam complanati. Spira obtuſa; Apex eroſus. Apertura ſemicircularis. Labrum acutum. Labium complanatum, crenulatum. Color oliuaceus alboque varius, maculis transuerſis pennatis nigris.

Die Schale iſt rundlich und glatt. Die Gewinde, deren ungefehr vier ſind, an der Nath zuſammengedrückt. Der Schnirkel iſt ſtumpf; die Spize ausgefreſſen. Die Mündung halbrund. Die Schalenlefze ſcharfrandig. Die Spindellefze flach, und gekerbet. Die Farbe olivengrün, und weiß gefleckt, mit federförmigen querliegenden ſchwarzen Flecken.

O. III. 6. Nerita polita.

O. III. 6. Die glatte Schwimmſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 731.

Teſta laeui, obtuſa, labio dentato, labro crenulato.

Die Schale iſt glatt und ſtumpfwirblig, die Spindellefze gezähnt, die Schalenlefze gekerbet.

α fuſco alboque nebuloſa, faſciis transuerſis rubris.

α braun und weiß nebelicht, mit rothen Querbändern.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 6. *f.* 17.
Gualt. *Teſt.* t. 66. *f.* G.
Regenſ. Samml. I. 4. *t.* 43. *f.*.
Seb. Thes. *III.* *t.* 59. *f.* I. 3.
Gev. *Beluſt.* 22. *t.* 223. 224. *f.*

β albo, fuſcoque nebuloſa,

β weiß, und braun nebelicht.

Rumph. *amb.* t. 22. *f.* F.
Petiv. *amb.* t. 11. *f.* 20.
Gualt. *Teſt.* t. 66. *f.* H.
Argenv. Conch. *Pl.* 7. *f.* K.
Gev. *Beluſt.* 22. t. 220 — 221. *f.*

γ griſeo rubroque nebuloſa, faſciis transuerſis niueis.

γ lichtgrau, und rothnebelicht, mit ſchneeweißen Querbändern.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 221.
Gev. *Beluſt.*. 24. t 245. *f.*

O. III. 7. Nerita Peloronta.

O. III. 7. Der Peleront Nerite.

Linn. *S.* *N.* *Sp.* 732.

Belg. Poelorontje. *Rumph.* *Angl.* Poeloroon Nerit. *Petiv.*

Teſta

Teſta ſtriata, labiis dentatis, interiore planiuſculo rugoſo.

Die geſtreifte Schale hat gezähnte Lippen, deren innere flach, und runzelicht iſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 6. *f.* 11.

Rumph. amb. t. 22. *f.* K.

Petiv. amb. t. 11. *f.* 6.

Gev. Beluſt. 27. *t.* 299. *f.*

Knor. Vergn. III. 1. *t.* 4. *f.*

O. III. 8. Nerita Albicilla.

O. III. 8. Die ſtumpfe Schwimmſchnecke.

L*inn.* S. *N.* S*p.* 733.

Teſta ſtriata, ſpira obtuſiſſima, labiis dentatis, interiore tuberculato.

Die geſtreifte Schale hat einen ſehr ſtumpfen Wirbel, und gezähnte Lippen, deren innere mit Körnern beſezet iſt.

Rumph. amb. t. 22. *f.* 8.

Gev. Beluſt. 23. *t.* 229. *f.*

Knor. Vergn. VI. 13. *t.* 4. *f.*

O. III. 9. Nerita plicata.

Linn. S. N. Sp. 735.

Teſta ſulcata, labiis dentatis, interiore rotundato, exteriore utrinque dentibus acutis.

O. III. 9. Die Faltennerite.

Die gefaltene Schale hat gezähnte Lippen, deren innere rundlicht, die äuſſere aber beiderſeits mit ſpizigen Zähnen beſezet iſt.

Knor. Vergn. V. 15. *t.* 4. *f.*

Mus. Caes. Vindobon.

O. III. 10. Nerita groſſa.

Linn. S. N. Sp. 736.

Teſta ſulcata, labiis dentatis, interiore conuexo rugoſo.

O. III. 10. Die geribbte Schwimmſchnecke.

Die gefurchte Schale hat gezähnte Lippen, deren innere runderhaben, und runzelicht iſt.

Rumph. amb. t. 22. *f. N.*

Petiv. amb. t. 5. *f.* 8.

Gev. Beluſt. 22. *t.* 228. *f.* ?

Mus. Caes. Vindobon.

O. III. 11. Nerita Chamaeleon.

Linn. S. N. Sp. 737.

O. III. 11. Das Kamelotchen.

Belg. Kamelotje. *Rumph.* *Angl.* Camel Nerit. *Petiv.*

Teſta ſulcis viginti, labiis dentatis, interiore rugoſo, tuberculato.

Die Schale hat zwanzig Furchen, und gezähnte Lippen, deren innere mit Runzeln und Körnern beſezet iſt.

Rumph amb. t. 22. *f.* L.

Petiv. amb. t. 11. *f.* 7.

Gev. Beluſt. 23. *t.* 231. *f.*

Regenſ. Samml. I. 3. *t.* 26. *f.*

Knor. Vergn. II. 9. *t.* 1. *f.*

O. III. 12. Nerita undata.

Linn. S. N. Sp. 738.

O. III. 12. Die Wellennerite.

Teſta ſulcis triginta, labiis dentatis, interiore rugoſo, tuberculato.

Die Schale hat dreyßig Runzeln, und gezähnte Lippen, deren innere mit Runzeln und Körnern beſezet iſt.

Bonan. Recr. cl. 2. *f.* 215.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 6. *f.* 6.

Rumph. amb. t. 22. *f.* 4.

Gev. Beluſt. 22. *t.* 227. *f.*

Knor. Vergn. VI. 13. *t.* 2. *f.*

O. III. 13. Nerita Exuvia.

O. III. 13. Die breitfurchige Schwimmſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 739.

Belg. Geworte Alykruyk. *Angl.* Deep-rigd Nerit. *Petiv.*

Teſta ſulcata, labiis dentatis, interiore tuberculato.

Die gefurchte Schale hat gezähnte Lippen, deren innere mit Körnern beſezet iſt.

Bonan. Recr. *cl.* 3. *f.* 220.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 6. *f.* 14.

Petiv. Gaz. *t.* 100. *f.* 6.

—— *amb.* t. 11. *f.* 9.

Rumph. amb. t. 22. *f.* M.

Gualt. Teſt. *t.* 66. *f.* CC.

Argenv. Conch. *Pl.* 7. *f.* J.

Seb. Thes. III. t. 59. *f.* 4—9.

Gev. Beluſt. 23. *t.* 239. 240. *f.*

Knor. Vergn. III. 1. *t.* 5. *f.*

Da Coſt. Elem. Pl. 3. 14. 15. *f.*

P. Ha-

P. Haliotis. | P. Die Ohrſchnecke.

Teſta auriformis, foraminibus ſecundum longitudinem digeſtis. Spira occultata laterali.

Die Schale iſt ohrförmig und der Länge nach mit Löchern durchbohret. Der Schnirkel ſtehet verborgen an der Seite.

P. 1. Haliotis Midae. | P. 1. Das Hohlohr.

Linn. S. *N.* *Sp.* 740.

Belg. Groot Holzeeor. *Angl.* The great Ear-Shell. *Hill.* *Gall.* La grande Oreille de Mer.

Teſta ſubrotunda, rugoſa, limbo lato.

Die beinahe runde und runzelichte Schale hat einen breiten Rand.

Liſt. *Hiſt.* *Conch.* *l.* 4. *ſ.* 7. *f.* 5.
Gualt. *Teſt.* *t.* 96. *f.* B.
Valent. *Abh.* 12. *t.* 102. *f.*
Argenv. Conch. *Pl.* 3. *f.* *A.*
Hill. *Hiſt.* *of.* *Anim.* *Pl.* 7.
Knor. *Vergn.* *V.* 20. *t.* 3. *f.*
Mart. Konch. Kab. *I.* 14. *t.* 136. *f.*

P. 2.

P. 2. Haliotis ſtriata.	P. 2. Das geſtreifte Ohr.

Linn. S. N. Sp. 742.

Belg. Geſtrepte Zeeohr. *Gall.* Oreille de mer ſtriée.

Teſta ouata, transuerſim rugoſa, longitudinaliter ſtriata.	Die eyförmige Schale iſt nach der Quere gerunzelt, und in die Länge geſtreifet.

Knor. Vergn. I. 20. *t.* 5. *f.*

Mart. Konch. *Kab.* I. 14. *t.* 138. *f.*

P. 3. Haliotis marmorata.	P. 3. Das Marmorohr.

Linn. S. *N.* Sp. 741.

Gall. Oreille marbrée.

Teſta ouata, ſtriis longitudinalibus, transuerſis, obſoletis.	Die eyförmige Schale iſt der Länge nach geſtreifet, und in die Breite mit matten Streifen beſezet.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 7. *f.* 6.

Argenv. Conch. *Pl.* 3. *f.* B.

Knor. Vergn. II. 17. *t.* 4. 5. *f.*

Mart. Konch. *Kab.* I. 14. *t.* 139. *f.*

P. 4. Haliotis aſinina. P. 4. Das Eſelohr.

Linn. S. N. Sp. 745.

Belg. Lange Parlemoor - Schulp. *Angl.* Long Sea Ear. *Hill. Gall.* Oreille d'ane. *Dav.*

Teſta ouato oblonga, glabra, margine ſubſulcato, dorſo ſtriato.

Die eyförmige, länglichte glatte Schale iſt am Rande einigermaßen gefurchet, und auf dem Rücken geſtreifet.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 7. *f.* 1.
Rumph. amb. *t.* 40 *f.* E. F.
Petiv. amb. *t.* 16. *f.* 34.
Gualt. Teſt. *t.* 69. *f.* D.
Argenv. Conch. *Pl.* 3. *f.* E.
Hill. Hiſt. of. Anim. *Pl.* 7.
Regenſ. Samml. III. 9. *t.* 29. *f.*
Knor. Vergn. III. 15. *t.* 1. *f.*
Mart. Konch. Kab. I. 16. *t.* 150. *f.*

Q. Patella. | Q. Die Napfſchnecke.

Teſta fornicata, ſubconica, absque ſpira.

Die Schale iſt gewölbet, kegelförmig, ohne Schnirkel.

Q. I. Labio interno.

Q. I. Mit einer Lippe in der inneren Wölbung.

Q. I. 1. Patella equeſtris.

Q. I. 1. Die Fiſchweiberhaube.

Linn. Sp. N. Sp. 747.

Belg. Vjſchhuiſje. *Rumph. Angl.* Beaked Limpet. *Hill. Gall.* Le Cabochon. *Dav.*

Teſta conica, vertice obliquo, labio ſubverticali canaliculato.

Die kegelförmige Schale hat einen ſchiefen Wirbel, und eine rinnenförmige nahe unter dem Wirbel ſtehende Lippe.

Bonan. Recr. *cl.* 1. *f.* 12.
Liſt. *Hiſt. Conch. l.* 4. *ſ.* 1. *f.* 39.
Rumph. *amb. t.* 40. *f.* P. O.
Petiv. *amb. t.* 16. *f.* 28.
Gualt. *Teſt. t.* 9. *f.* Z.

Hill.

Hill. Hiſt. of. Anim. Pl. 7.

Dav. Cat. *ſyſt.* I. *Pl.* 2. *f. B. b.*

Mart. Konch. Kab. *I.* 13. *t.* 117 — 110. *f.*

Murr. Fund. *Teſt. t.* 1. *f.* 5.

Walch Naturf. IX. 3. *t.* 1. 2. *f.*

Q. I. 2. Patella fornicata. Q. I. 2. Der Pantofel.

Linn. S. N. Sp. 751.

Belg. Pantofeltje. *Angl.* Small indian Canoe-Shell. *Gall.* Le Sandale. *Dav.*

Teſta ouata, vertice marginali, mucronato, incuruo, labio interno concauo.

Die eyförmige Schale hat an einem Ende einen ſpizigen gekrümmten Wirbel, mit einer hohlen Lippe.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 1. *f.* 33.

Argenv. Conch. *Pl.* 2. *f. N.*

Adans. Seneg. *Pl.* 2. *f.* 8.

Knor. Vergn. VI. 21. *t.* 8. *f.*

Mart., Konch. Konch *I.* 13. *t.* 129. 130. *f.*

Q. II. Margine angulato. | Q. II. Mit eckigem Rande.

Q. II. 1. Patella ſaccharina. | Q. II. 1. Die Sternpatelle.

Linn. S. *N.* Sp. 754.

Belg. Bonnetje. *Angl.* White rib'd Limpet. *Pet. Gall.* Aſtrolepas. *Dav.*

Teſta margine angulato, coſtis carinatis acutis.

Die Schale hat einen eckigen Rand, und ſcharfkielige Ribben.

Liſt. Hiſt. Conch. *t.* 4. *ſ.* 1. *f.* 10.
Rumph. amb. *t.* 40. *f.* B.
Petiv. amb. *t.* 3. *f.* 3.
Gualt. Teſt. *t.* 9. *f.* M. O.
Argenv. Conch. *Pl.* 3. *f.* M.
Klein. Meth. *Oſtr.* *t.* 8. *f.* 4.
Knor. *Vergn.* III. 29. *t.* 3. *f.*
Mart. Konch. Kab. I. 9. *t.* 76. *f.*
Murr. Fund. *Teſt.* *t.* 1. *ſ.* 6.

Q. II. 2. Patella barbara. | Q. II. 2. Die Müze.

Linn. S. *N.* Sp. 755.

Belg. Grasje.

Teſta

Teſta angulata, coſtis viginti undatis, tuberculatis.

Die eckige Schale hat zwanzig wellenförmige knotige Ribben.

Knor. Vergn. V. 13. *t.* 5. *f.*

Q. II. 2. Patella plicata.

Q. II. 2. Die Faltenpatelle.

Gall. La tete de Meduſe. *Dav.*

Teſta angulata, coſtis triginta obtuſis, unduloſis, transuerſim rugoſis.

Die eckige Schale hat dreyßig ſtumpfe, wellenförmige, in die Quere gerunzelte Ribben.

Knor. Vergn. III. 30. *t.* 1. *f.*
Dav. Cat. ſyſt. I. Pl. 3. *f.* D.
Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ouata. Margo dentatus, dentibus 30 - 34. Coſtae totidem dorſales, undatae, transuerſim rugoſae. Vertex ſubcentralis, obtuſus. Color albus, maculis fuſcis.

Die Schale iſt eyförmig. Der Rand mit 30 — 34 Zähnen umgeben. Auf dem Rücken liegen eben ſo viele wellenförmige und in die Quere gerunzelte Ribben. Der ſtumpfe Wirbel ſtehet nahe am Mittelpunkt. Weiß mit braunen Flecken.

Q. II. 3. Patella granularis.

Q. II. 3. Die Feſtung.

Linn. S. *N.* Sp. 756.

Belg. De Fortreſſe. *Angl.* The Fortreſſe. *Gall.* La Fortereſſe. *Dav.*

Teſta angulata, dorſo ſquamis angulatis imbricato, fundo fuſco.

Die eckige Schale hat auf dem Rücken ziegelförmig geſtellte eckige Schuppen, und einen braunen Boden.

Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 1. *f.* 13.
Gualt. Teſt. *t.* 9. *f.* F.
Argenv. Conch. *Pl.* 2. *f.* G.
Hill. *Hiſt.* of. *Anim.* *Pl.* 7.
Regenſ. *Samml.* I. 9. *t.* 31. *f.*
Knor. *Delic.* *nat.* I. *t.* B. *V.* *f.* 8.
—— *Vergn.* I. 30. *t.* 2. *f.*
Mart. Konch. Kab. I. 9. *t.* 71.

Q. II. 4. Patella Oculus.

Q. II. 4. Das Bocksaug.

Angl. Goat's Eye Limpet. *Da Coſt.* *Gall.* L'oeil de bouc. *Argenv.*

Teſta

Teſta angulata, coſtis carinatis, vertice fundoque albo.

Die eckige Schale hat kielförmige Ribben, den Wirbel und Grund von weißer Farbe.

Gualt. Teſt. t. 9. f. H.
Argenv. Conch. Pl. 2. f. B.
Mart. Konch. Kab. I. 10. t. 86. f.
Da Coſt. Elem. Pl. 2. f. 1.

Teſta ſimilis priori, a qua differt: colore fundi verticisque albo, ſquamarumque defectu.

Eine Art die der vorhergehenden ähnlich iſt, von der ſie ſich durch die weiße Farbe des Wirbels und Grundes, und durch den Mangel der Schuppen unterſcheidet.

Q. II. 5. Patella granatina.
Linn. S. N. Sp. 757.

Q. II. 5. Das Körnerſchild.

Belg. Gedoornd Kapje. *Gall.* Lepas granuleux.

Teſta multiſulcata, punctis elevatis muricata, margine dentato.

Die Schale iſt mit vielen Furchen und erhabenen Punkten beſezet, und mit einem erhabenen Rande verſehen.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 4. ſ. 1. f. 15.
Bonan. Mus. Kirch. cl. 2. f. 22.
Argenv. Conch. Pl. 2. f. H.
Regenſ. Samml. I. 2. t. 14. f.
Mart, Konch. Kab. I. 8. t. 61.

Q. II. 6. Patella coerulea.

Q. II. 6. Die blaue Napfſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 759.

Teſta inaequaliter ſulcata, cauitate coeruleſcente, margine ſubangulato.

Die Schale iſt mit ungleichen Furchen beſezet, in der Höhlung blaulicht, und am Rande einigermaßen eckig.

Mus. Caes. Vindobon.

Q. II. 7. Patella miniata.

Q. II. 7. Der Sonnenſchirm.

Belg. Geſtraalte Kapje. *Gall.* Le Paraſol. *Dan.*

Teſta ouata, ſtriis inaequalibus decuſſatis, margine ſubangulato.

Die eyförmige Schale iſt mit ungleichen Strichen durchkreuzet, und am Rande einigermaßen eckig.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 1. f. 21.

Knor. Vergn. V. 8. t. 4 — 6. f.; 19. t. 2. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 7. t. 52. f.; 8. t. 63. f.

Teſta ouata. Margo obſolete angulatus. Dorſum ſtriis longitudinalibus transuerſisque decuſſatim ſtriatum. Vertex obtuſus. Color albus, punctis minutis, radiisque roſeis.

Die Schale iſt eyförmig. Der Rand hat vollkommene Ecken. Der Rücken iſt der Länge und Quere nach mit feinen Streifen durchkreuzet. Der Wirbel ſtumpf. Weiß mit kleinen Punkten und Strahlen von roſenrother Farbe.

Q. II. 8. Patella Cochlear.

Q. II. 8. Der Löffel.

Gall. La Cuilliere.

Teſta ouata, complanata, poſtice attenuata, margine ſubangulato.

Die Schale iſt eyförmig und plattgedrückt, hinten verſchmälert, und am Rande einigermaßen eckig.

Knor. Vergn. II. 26. t. 3. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta oualis. Margo crenatus. Dorſum antice planiuſculum, poſtice attenuatum, utrinque compreſ-

Die Schale iſt eyrund. Der Rand gekerbet. Der Rücken vorne etwas flach, hinten verlängert, an bei-

 ſum.

ſum. Striatum, ſtriis longitudinalibus inaequalibus. Cauitas poſtrorſum canaliculata. Color albus, cauitas macula lata purpureo coerulea.

den Seiten zuſammengedrücket, mit ungleichen Streifen der Länge nach beſezet. Die Höhlung iſt ruckwärts rinnenartig ausgekehlet. Weiß, mit einem breiten purpurblauen Flecke in der Höhlung.

Q. II. 9. Patella pentagona.

Q. II. 9. Der ſpaniſche Huth.

Teſta pyramidata ſubquinquangula, margine explanato inaequali.

Die pyramidenförmige einigermaßen fünfeckige Schale hat einen ausgebreiteten runden Rand.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta pyramidata, angulis quinque obtuſis, latere uno ampliore. Baſis explanata quinquangula, crenata. Vertex centralis obtuſus. Color albidus, fundi rubellus.

Die Schale iſt pyramidenförmig mit fünf ſtumpfen Ecken, und einer breiteren Seite. Der Rand iſt ausgebreitet, und gekerbet. Der ſtumpfe Wirbel ſtehet in der Mitte. Die Farbe iſt weißlicht, der Boden röthlicht.

Q. III. Vertice acuminato curuato.

Q. III. Mit einem geſpizten krummen Wirbel.

Q. III. 1. Patella ungarica.

Q. III. 1. Die Matroſenkappe.

Linn. S. N. Sp. 761.

Belg. Lots - Kap, *Rumph. Gall.* Bonnet de Dragon. *Dav.*

Teſta conica, vertice acuminato ſpiraliter curuato.

Die kegelförmige Schale hat einen zugeſpizten ſchnirkelförmig gekrümmten Wirbel.

Bonan. Mus. Kirch. cl. 2. *f.* 13.
Gualt. Teſt. t. 9. *f. W.*
Klein. Meth. Oſtr. t. 8. *f.* 10.
Knor. Vergn. VI. 16. *t.* 3. *f.*
Mart. Konch. *Kab. I.* 12. *t.* 107. 108. *f.*

Q. III. 2. Patella deflexa.

Q. III. 2. Die einſeitige Napfſchnecke.

Teſta ouata, longitudinaliter ſulcata, vertice dextrorſum curuato.

Die Schale iſt eyförmig, der Länge nach geſtreifet, mit einem nach der linken Seite gekrümmten Schnirkel.

Helbl. Abh. e. Priv. Geſ. in Boehm. IV. 1. *t.* 9. 10. *f.*

Teſtae ambitus ouatus. Dorſum fornicatum, utrinque compreſſum, longitudinaliter ſulcatum. Vertex obtuſus, compreſſus, in latus dextrum decuruatus. Color fuſcus, ſtriae radiantes & fundus albus.

Der Umfang iſt eyförmig. Der Rücken gewölbet, beiderſeits zuſammengedrücket, und der Länge nach gefurchet. Der Wirbel iſt ſtumpf, zuſammengedrücket, und nach der rechten Seite gekrümmet. Von ſchwarzer Farbe mit weißen Strahlen und Wirbelboden.

Q. III. 3. Patella mamillaris.

Q. III. 3. Die Kopfſpatelle.

Linn. S. N. Sp. 764.

Belg. Getepelte Patelle.

Teſta integra, conica, ſtriata, vertice reflexo laeui.

Die ganzrandige, kugelförmige, geſtreifte Schale hat einen zurückgebogenen glatten Wirbel.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 1. f. 17.

Klein. Meth. Oſtrac. t. 8. f. 1.

Adans. Seneg. Pl. 2. f. 5.

Mart. Konch. Kab. I. 7. t. 58. 59. f.

Q. III. 4. Patella tricarinata.

Q. III. 4. Die dreykielige Napfſchnecke.

Linn. S. N. Sp. 764.

Teſta reticulato ſtriata, antice tricarinata, vertice recurvo.

Die nezförmig geſtreifte Schale hat vorne drey Kiele, mit einem zurückgebogenen glatten Wirbel.

Mus. Caes. Vindobon.

Q. III. 5. Patella pectinata.

Linn. S. N. Sp. 765.

Teſta integra, ouata, membranacea, ſquamis imbricatis, vertice reflexo ſubmarginali.

Q. III. 5. Die Kammpatelle.

Die ganzrandige, eyförmige, dünnhäutige Schale iſt mit hohlen Schuppen ziegelförmig bedecket, und nahe am Rande mit einem zurückgebogenen Wirbel verſehen.

Mus. Caes. Vindobon.

Q. III. 6. Patella lutea.

Linn. S. N. Sp. 766.

Teſta integra, ouali, ſtriata, vertice ſubmarginali reflexo mucronato.

Q. III. 6. Der gelbe Huth.

Die ganzrandige eyförmige geſtreifte Schale, hat nahe am Rande einen zurückgebogenen geſpizten Wirbel.

Mus. Caes. Vindobon.

Q. IV. Integerrimae, vertice obtuſo.

Q. IV. Mit ganz glatten Rand, und ſtumpfen Wirbel.

Q. IV. 1. Patella pellucida.

Q. IV. 1. Die Glaspatelle.

Linn. S. *N.* Sp. 770.

Teſta ouata, ventricoſa, membranacea pellucida, radiis coeruleis.

Die eyförmige, bäuchige, dünnhäutige, und durchſichtige Schale, hat blaue Strahlen.

Liſt. Hiſt. Conch. *t.* 4. *ſ.* 1. *f.* 27.
Muſ. Caes. Vindobon.

Q. IV. 2. Patella teſtudinaria.

Q. IV. 2. Der Schildkrötennapf.

Linn. S. *N.* Sp. 771.

Belg. Getygerd Schild, *Gall.* Bouclier de Tortüe. *Dav.*

Teſta integerrima ouata, glabra, fuſco maculata.

Die ganzrandige, eyförmige, glatte Schale iſt braun gefleckt.

Liſt.

Liſt. Hiſt. Conch. t. 4. ſ. 1. f. 9.

Gualt. Teſt. t. 8. f. B.

Argenv. Conch. Pl. 2. f. P.

Knor. Vergn. I. 21. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. I. 6. t. 45 — 48. f.

Walch Naturf. VIII. 4. t. 2. 3. f.

Q. IV. 3. Patella radiata.

Teſta integerrima, ouata, ſtriata, vertice radiisque fuſcis.

Q. IV. 3. Die Strahlpatelle.

Die ganzrandige, eyförmige, geſtreifte Schale hat einen braunen Wirbel, mit gleichfarbigen Strahlen.

Mus. Caes. Vindobon.

Teſta ouata. Margo integerrimus. Dorſum longitudinaliter ſtriatum. Vertex ſubcentralis. Color albidus. Cauitas margaritacea. Fundus & faſciae radiantes fuſcae.

Die Schale iſt eyförmig. Der Rand ganz glatt. Der Rücken der Länge nach geſtreifet. Der Wirbel ſtehet beinahe in der Mitte. Von weißlicher Farbe. Die Höhlung hat einen Perlglanz. Der Boden und die ſtrahligen Bänder ſind braun.

Q. IV. 4. Patella compreſſa.

Q. IV. 4. Der Strohhuth.

Linn. S. N. Sp. 772.

Belg. Geele Kapje.

Teſta integerrima, oblonga ſtriata, dorſo utrinque compreſſo.

Die ganzrandige länglichte geſtreifte Schale hat einen beiderſeits zuſammengedrückten Rücken.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 1. f. 25.

Knor. Vergn. VI. 28. t. 1. f.

Walch Naturf. VIII. 4. t. 1. f.

Q. IV. 5. Patella ruſtica.

Q. IV. 5. Die Bauernkappe.

Linn. S. N. Sp. 773.

Teſta integerrima, conica ſulcato ſtriata, obtuſa.

Die Schale iſt ganzrandig kegelförmig, ſtumpfwirblig, mit Furchen und Streifen beſezet.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 1. f. 1.

Gualt. Teſt. t. 8. f. P.; t. 9. f. C.

Mart.

Mart. Konch. Kab. *I.* 5. *t.* 35. *f.*; 6. *t.* 43. *f.*
Da Coſt. Elem. *Pl.* 1. *f.* 1. 2.
Mus. Caes. Vindobon.

Q. IV. 6. Patella fuſca.

Q. IV. 6. Die Trinkſchale.

Linn. S. *N.* Sp. 774.

Gall. l'Entonnoir,

Teſta ouata, multi ſulcata, cauitate margaritacea, fundo fuſco.

Die eyförmige Schale iſt mit vielen Furchen beſezet, in der Höhlung perlfarbig, und am Grunde braun.

Bonan. Recr. *cl.* 1. *f.* 4.
Knor. Vergn. IV. 9. *t.* 1. 2. *f.*
Mart. Konch. Kab. *I.* 5. *t.* 40. *f.*

G. V. Perforatae.

Q. V. Durchbohrte Napfſchnecken.

Q. V. 1. Patella Fiſſura.

Q. V. 1. Die Spalte.

Linn. S. *N.* Sp. 778.

Angl. Crack'd Barnstable Limpet. *Petiv.*

Teſta

Teſta ouata reticulato ſtriata, antice fiſſa, vertice recuruo.

Die eyförmige nezartig geſtreifte Schale, iſt vorne geſpalten, mit einem zurückgebogenen Schnirkel.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 1. *f.* 28.
Petiv. *Gaz.* *t.* 75. *f.* 2.
Mart. Konch. Kab. *I.* 12. *t.* 109. 110. *f.*
Müll. Zool. *Dan.* *t.* 24. *f.* 7.
Mus. Caes. Vindobon.

Q. V. 2. Patella graeca.

Q. V. 2. Das Runzelgitter.

Linn. S. *N.* *Sp.* 780.

Belg. Griekſche Patelle. *Angl.* Thimble Limpet. *Pet.* *Gall.* Le Treillis. *Dav.*

Teſta ouata, coſtata, decuſſatim ſtriata, vertice perſorato.

Die eyförmige geribbte, in die Quere geſtreifte Schale hat einen durchbohrten Wirbel.

Bonan. Recr. *cl.* 1. *f.* 6.
Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 1. *f.* 1.
Petiv. Gaz. *t.* 80. *f.* 11.

Klein.

Klein. Meth. Oſtr. t. 8. f. 3.

Gualt. Teſt. t. 9. f. N.

Argenv. Conch. Pl. 2. f. J.

Adans. Seneg. Pl. 2. f. 7.

Regenſ. Samml. I. 2. t. 23. f.

Knor. Vergn. I. 30. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 11. t. 98. 99. f.

Q. V. 3. Patella nimboſa.

Q. V. 3. Das Strahlgitter.

Linn. S. N. Sp. 781.

Teſta ouata longitudinaliter ſulcata, transuerſim ſtriata, vertice perforato.

Die eyförmige Schale iſt nach der Länge geſurchet, und in die Quere geſtreiſet, mit einem durchbohrten Wirbel.

Bonan. Recr. cl. 1. f. 3.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 1. f. 4.

Gualt. Teſt. t. 9. f. Q. R. S. T.

Argenv. Coch. Pl. 6. f. C.

Adans. Seneg. Pl. 2. f. 6.

Mart. Konch. Kab. I. 11. t. 91. 92. f; 12. t. 105. f.

Da Coſt. Elem. Pl. 1. f. 3.

Q. V. 4. Patella nodoſa. | Q. V. 4. Das Knottengitter.

Angl. Wart-rib'd Limpet.

Teſta onata ſulcata, coſtis nodoſis, vertice perforato.

Die eyförmige geſurchte Schale hat knottige Ribben, und einen durchbohrten Wirbel.

Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 1. *f.* 6.

Petiv. Gaz. t. 153. *f.* 5.

Mart. Konch. Kab. *I.* 11. *t.* 94. *f.*

Teſta ouata. Dorſum longitudinaliter ſulcatum, coſtis intermediis nodoſis. Vertex ſubcentralis, pertuſus; foramine oblongo. Color rubellus.

Die Schale iſt eyförmig. Der Rücken der Länge nach gefurchet, mit knottigen Zwiſchenribben Der durchbohrte Wirbel ſtehet an der Mitte. Die Oefnung iſt länglicht. Von röthlichter Farbe.

R. Dentalium. | R. Die Zahnſchnecke.

Linn. Syſt. Nat. Gen. 332.

Teſta conico tubuloſa, libera, utrinque pervia.

Die freye Schale iſt kegelförmig, hohl, und an beiden Enden offen.

R. 1.

R. 1. Dentalium elephantinum.

R. 1. Der Elephantenzahn.

Linn. S. *N.* *Sp.* 783.

Belg. Oliphants-tand. *Rumph.* *Angl.* Elephant's-Tooth. *Pet.* *Gall.* Dentale. *Dav.*

Teſta decemangula, ſubarcuata, ſtriata.

Die Schale iſt zehneckig, etwas gekrümmet, und geſtreifet.

Bonan. Recr. *cl.* 1. *f.* 8.
Liſt. *Hiſt.* Conch. *t.* 4. *ſ.* 2. *f.* 1.
Rumph. amb. *t.* 41. *f.* *J.*
Petiv. amb. *t.* 16. *f.* 33.
Gualt. *Teſt.* *t.* 10. *f.* *J.*
Argenv. Conch. *Pl.* 3. *f.* *H.*
Ginan. adr. *II.p.* 2. *t.* 1. *f.* 1.
Knor. *Vergn.* *I.* 19. *t.* 3. *f.*
Mart. Konch. Kab. I. 1. *t.* 5. *f.* *A.*
Müll. linn. *Naturſ.* *VI.* 1. *B.* 19. *t.* 1. *f.*

R. 2. Dentalium ſtriatum.

R. 2. Das geſtreifte Zähnchen.

Angl. The ſtriated Tooth-Shell. *Hill.*

Teſta octangula, ſubarcuata, denſe ſtriata.

Die Schale iſt achteckig, etwas gekrümmet, und mit Streifen dicht beſezet.

Gualt. *Teſt.* *t.* 10. *f.* G.

Hill. *Hiſt.* *of.* *Anim.* *Pl.* 7.

Mart. Konch. Kab. *I.* 1. *t.*5. *f.* B.

Differt a praecedente craſſitie minore, & ſtriis denſis numeroſis.

Dieſe Art unterſcheidet ſich von der vorigen durch ihre Dünne, und die vielen gedrängt an einander ſtehenden Streifen.

R. 3. Dentalium Dentalis.

R. 3. Der Wolfszahn.

Linn. S. N. *Sp.* 785.

Gall. La dent de loup. *Dav.*

Teſta ſubarcuata, longitudinaliter ſulcata, tenui, rubella.

Die röthliche dünne Schale iſt etwas gekrümmet, und nach der Länge gefurchet.

Rumph.

Rumph. amb. t. 41. *f.* 6.
Mus. Caeſ. Vindobon.

R. 4. Dentalium Entalis. | R. 4. Der Hundszahn.

Linn. S. N. Sp. 786.

Belg. Witte Wolfstand. *Angl.* The Dog-tooth Shell. *Pet. Gall.* Antale. *Dav.*

Teſta ſubarcuata, laeuiſſima. | Die Schale iſt etwas gekrümmet, und ganz glatt.

Bonan. Recr. cl. 1. *f.* 9.
Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 2. *f.* 2.
Petiv. Gaz. t. 65. *f.* 9.
Rumph. amb. t. 41. *f.* 5.
Gualt. Teſt. t. 10. *f.* E.
Argenv. Conch. Pl. 3. *f.* K. K.
Ginan. adr. II. t. 1: *f.* 2.
Knor. Vergn. I. 29. *t.* 4. *f.*
Mart. Konch. Kab. I. 1. *t.* 1. 2. *f.*

R. 5. Dentalium politum. | R. 5. Der Polirzahn.

Linn. S. N. Sp. 788.

Teſta ſubarcuata, ſtriis annularibus conſertiſſimis.

Die etwas gekrümmte Schale iſt in die Quere mit gedrängt ſtehenden Streifen umgürtet.

Gualt. Teſt. t. 10. *f.* F.

Mart. Konch. Kab. I. 1. *t. 3. f. A.*

S. Serpula.

S. Die Röhrenſchnecke.

Linn. S. N. Gen. 333.

Teſta tubuloſa, adnata, ſaepius iſthmis intercepta.

Die Schale iſt röhrig, und angewachſen, auch öfters durch Scheidewände abgetheilet.

S. 1. Serpula triquetra.

S. 1. Die dreyeckige Röhre.

Linn.

Linn. S. N. Sp. 795.

Gall. Vermiculaire blanc & triangulaire.

Teſta repente, flexuoſa, triquetra.

Die dreyeckige Schale iſt in einander geſchlungen, und klebet auf andern Körpern feſt.

Gualt. Teſt. t. 10. *f.* P.

Baſt. ſubſ. I. *t.* 9. *f.* 2.

Mus. Caes. Vindobon.

S. 2. Serpula filograna.

S. 2. **Die Flechtenröhre.**

Linn. S. N. Sp. 797.

Teſtis capillaribus, faſciculatis, ramoſis, confluentibus.

Mehrere haarförmige, büſchelweiſe und äſtig an einander verwachſene Schalen.

Seb. Thes. III. t. 100. *f.* 8.

Koelr. Nov. Comm. Petr. VII. t. 16. *f.* 3.

S. 3. Serpula contortuplicata.

S. 3. Der Fiſchdarm.

Linn. S. N. *Sp.* 799.

Gall. L'aſſemblage des bojaux.

Teſta rugoſa, flexuoſa, carinata.

Die Schale iſt runzelicht, geſchlungen und gekerbet.

Bonan. Recr. *cl.* 1. *t.* 20. *f.* G.
Argenv. Conch. *Pl.* 4. *f.* D.
Mart. Konch. Kab. I. 3. *t.* 24. *f.*
Da Coſt. Elem. *Pl.* 2. *f.* 6.

S. 4. Serpula glomerata.

S. 4. Der Vogeldarm.

Linn. S. N. *Sp.* 800.

Gall. Bojaux des oiſeaux. *Dav.*

Teſta decuſſatim ſtriata, contorta, glomerata.

Die Schale iſt kreuzweiſe geſtreifet, und klumpenweiſe in einander geſchlungen.

Bonan. Recr. *cl.* 1. *f.* 20. E.
Gualt. *Teſt.* *t.* 10. *f.* T.
Mart. Konch. Kab. I. 3. *t.* 23. *f.*
Da Coſt. Elem. *Pl.* 2. *f.* 7.

S. 5. Serpula lumbricalis.

S. 5. Die Hornſchlange.

Linn. S. N. Sp. 801.

Belg. Zeeslangetje. *Gall.* Vilebrequin. *Dav.*

Teſta flexuoſa, apice ſpirali.

Die geſchlungene Schale hat eine ſchnirkelförmig gewundene Endſpize.

α ſolitaria.

α einzeln.

Bonan. Recr. *cl.* 1. *f.* 20. *A.*
Liſt. *Hiſt.* Conch. *l.* 4. *ſ.* 3. *f.* 1.
Rumph. amb. *t.* 41. *f.* 1.
Petiv. amb. *t.* 22. *f.* 1.
Gualt. Teſt. *t.* 10. *f.* *Q.* *V.*
Argenv. Conch. *Pl.* *t.* 4. *f.* *J.*
Ginan. adr. *II.* *t.* 2. *f.* 14.
Knor. *Vergn.* *II.* 13. *t.* 1. *f.*
—— —— *IV.* 17 *t.* 2. *f.*
Mart. Konch. Kab. *I.* 2. *t.* 12. *f.* *B.*

β teſtis aggregatis.

β mit angehäuften Schalen.

Adans. Seneg. *Pl.* 11. *f.* 1.

S. 6. Serpula polythalamia.

S. 6. Die Sandpfeife.

Linn. S. *N.* *Sp.* 802.

Angl. The chambered Vermiculus. *Da Coſt.*

Teſta ponderoſa, tereti, concamerata, biſurcata.

Die ſchwere, runde Schale iſt in Kammern abgetheilet, und zweytheilig.

Seb. Thes. III. *t.* 49. *f.* *V.*

Mart. Konch. Kab. *I.* 1. *t.* 6. *f.*

Da Coſt. Elem. *Pl.* 2. *f.* 5.

S. 7. Serpula arenaria.

S. 7. Der Ochſendarm.

Linn. S. *N.* *Sp.* 803.

Belg. Hondsdarm. *Rumph.* *Angl.* Ovenshell. *Pet.*

Teſta ſupra angulata, ſubtus planiuſcula.

Die Schale iſt oben eckig, und unten flach.

Bonan. Recr. *cl.* 1. *f.* 20. *B.*

Rumph. amb. *t.* 41. *f.* *L.*

Gualt. *Teſt.* *t.* 10. *f.* *L. N.*

Argenv. Conch. *Pl.* 4. *f.* *H.*

Adans. Seneg. *Pl.* 11. *f.* 5.

Mart. Konch. *Kab.* *I.* 3. *t.* *f.* 19.

S. 8.

S. 8. Serpula anguina. S. 8. Der Hühnerdarm.

Linn. S. N. *Sp.* 804.

Belg. Hornslangetje. *Rumph.*

Teſta tereti, rima longitudinali, apice cylindrico ſpirali.

Die runde Schale hat nach ihrer Länge eine Spalte, und eine walzenartige ſchnirkelförmig gedrehte Endſpize

α laeuis.

α glatt.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. *ſ.* 3. *f.* 2.
Rumph. amb. t. 41. *f.* 2.
Mart. Konch. Kab. *I.* 2. *t.* 13. *f.*
Mus. Caes. Vindobon.

β angulata, & muricata.

β mit einer eckigen, und ſtachlichten Schale.

Rumph. amb. t. 41. *f. H.*
Mart. Konch. Kab. I. 2. *t.* 13. *f. B.*
Mus. Caes. Vindobon.

S. 9. Serpula Penis. S. 9. Die Gießkanne.

Linn. S. N. *Sp.* 806.

Belg. Venus-Schagt. *Rumph. Angl.* The wattering Pot. *Gall.* L'arroſoir. *Dav.*

Teſta tereti, extremitate lata, tubulis cylindricis pertuſa.

Die runde Schale iſt an dem breiten Ende mit walzenförmigen Röhrchen durchſtochen.

Bonan. Mus. *Kirch.* cl. 1. *f.* 38.
Liſt. Hiſt. Conch. *l.* 4. *ſ.* 3. *f.* 3.
Rumph. amb. t. 41. f. 7.
Valent. Abh. t. 10. f. 87.
Petiv. amb. t. 12. f. 17.
Gualt. Teſt. t. 10. f. M.
Argenv. Conch. Pl. 3. f. 9.
Knor. *Vergn.* IV. 28. t. 2. f.
—— —— VI. 40. t. 1. *f.*
Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 7. f.
—— berl. Beſchaeft. II. 11. t. 1 — 5. f.
Müll. linn. Naturſ. VI. 1. B. 3. f.
Da Coſt. Elem. Pl. 2. f. 8.



NOMINA TRIVIALIA

ORDINE ALPHABETICO.

Benennungen der Konchylien

in alphabetiſcher Ordnung.

NOMENCLATOR GERMANICVS.

Deutſche Benennungen.

	Seite.
Abrikoſenſtein	60. K. III. 5.
Achatbirne	319. I. V. 16.
Admiraltute	134. C. II, 2.
Aentenbrut	6. B. 6.
Afterſturmhaube	245. G. IV, 2.

Aſter.

	Seite.
Aſtervenus blauſtreifige	53. K. II. 11.
Agatmuſchel	50. K. II. 8.
Arche Noah	73. N. II. 1.
Argus doppelter	158. D. I. 4.
Argus Weibchen	172. D. IV. 1.
Aſſel	181. D. IV. 15.
Aſſelſchnecke	276. H. II. 8.
Auſter gemeine	99. O. VI. 4.
—— gezähnelte	99. O. IV. 5.
Babelsthurm	308. I. V. 1.
Bakaſſanmuſchel	20. F. I. 5.
Bandnadel braune	216. F. IV. 6.
Band rothes	189. E. 11.
Bandſpindel	321. I. V. 19.
Bartarche	74. N. II. 2.
Bartkneiſer	12. D. 4.
Baſtardarche	75. N. III. 1.
Baſtardargus	156. D. I. 1.
Baſtardbauernmuſik	134. C. II. 1.
Baſtarddrachenköpſchen	171. D. III. 3.

Baſtard-

Deutſche Benennungen.

	Seite.
Baſtardlampe	379. N. II. 10.
Baſtardmuſchel geſtumpfte	103. P. 4.
Baſtardtelline	24. F. II. 6.
Baſtardvehus	45. K. I. 3.
Bauernkappe	444. Q. IV. 5.
Bauernmuſik	142. C. II. 12.
Beetchen gekröntes	239. G. II. 10.
Bernſtein Auſter	103. P. 3.
Beſansſegel	278. H. III 3.
— — aufgewickelte	279. H. III. 4.
Beſansſpindel gezackte	328. I. VI. 7.
Bettzeug	305. I. IV. 8.
Bezoar grauer	241. G. III. 2.
— — glatter	242. G. III. 3.
Bienenkörbchen	364. L. III. 3.
Birne getrocknete	297. I. III. 8.
Birnwalze	224. F. IV. 16.
Biſchofsmüze	217. F. IV. 8.
Blaſe offene	187. E. 7.
Blaſentaſche	95. O. III. 3.
Blaſenwalze	205. F. III. 1.
Blätterkamm	107. Q. I. 2.
Blaulippe	56. K. II. 17.

Blut-

	Seite.
Blutohr	400. N. IV. 6.
Blutzahn	420. O. III. 4.
Bocksauge	434. Q. II. 5.
Bocksſchnecke	347. L. II. 1.
Bohne	208. F. III. 4.
Bohrer gefurchter	146. C. III. 3.
—·— punktirter	145. C. III. 1.
Bootshacke	267. H. I. 3.
Böttcherbohrer	192. E. 14.
Brandfleck	176. D. IV. 7.
Brandhorn	291. I. II. 5.
Brandnadel braune	214. F. IV. 2.
Braunlippe	51. K. II. 9.
Breitrand	365. L. IV. 4.
Brunette	151. C. III. 9.
Buchſtabennadel	327. I. VI. 6.
Buchſtabenporzellane arabiſche	157. D. I. 3.
Bund türkiſcher	340. KII. 4.
Butterwecke gelbe	139. C. II. 9.
Cauris gefleckte	174. D. IV. 4.

Dach chineſiſches	350. L. II. 5.
Delphin geribbter	361. L. III. 7.
— gezackter	360. L. III. 6.
Dianenflügel	272. H. II. 3.
Dicklippe	339. K. II. 3.
Diſtelſchnecke	304. I. IV. 7.
Doppelribbe	366. L. V. 3.
Dornſpindel gefurchte	325. I. VI. 4.
Doſe gefurchte	39. O. II. 15.
—— gewölbte	93. O. II. 14.
Doſenſchnecke	245. G. IV. 3.
Drachenhaupt	174. C. IV. 5.
Dreyeck	41. I. 1.
Dünnribbe	46. K. I. 4.
Dünnſchale	164. D. I. 12.

Eckhorn	252. G. VII. 1.
Eichelmuſchel	69. M. 5.
Eichenholztutte	140. C. II. 10.
Eismuſchel	94. O. III. 1.
Elephantenzahn	449. R. 1.

El-

	Seite.
Elſter	357. L. III. 3.
Erbſenſchotte	15. E. 3.
Erdbeere rothe	33. G. 10.
Eſelchen	170. D. III. 2.
Eſelohr	429. P. 4.
Eſtrich	131. C. I. 8.
Ey	183. E. 1.
Eyerdotter	414. O. I. 4.
— geſchobener	415. O. I. 5.
Fahne	118. R. 5.
Fahnennadel	214. E. IV. 3.
Faltenklappe	65. L. 2.
Faltenmund	376. N. II. 5.
Faltennadel	264. G. VIII. 13.
Faltennerite	424. O. III. 9.
Faltenpatelle	433. Q. II. 5.
Faltenſchnecke nezförmige	212. F. III. 10.
Faß	231. G. I. 5.
Feige	190. E. 1.
—— linksgewundene	313. I. V. 8.

Feile

	Seite.
Feile	95. O. III. 2.
Felſengienmuſchel	71. M. 8.
Fenſterſcheibe	105. P. 7.
Feſtung	434. Q. II. 4.
Fiſchdarm	454. S. 3.
Fiſchernez	139. C. II. 8.
Fiſchweiberhaube	430. Q. I. 1.
Flachwirbel	376. N II. 6.
Flechtenröhre	453. S. 2.
Fledermaus	219. F. IV. 11.
Fleiſchhorn	273. H. II. 1.
— — — unächtes	314. I. V. 9.
Fleiſchlinſe	26. F. III. 3.
Flügelſchnecke gebänderte	274. H. II. 6.
Flußpabſtkrone	405. N. VI. 1.
Flußperlmuſchel	11. D. 3.
Frieſelporzellane	179. D. IV. 12.
Froſchſchnecke	294. I. III. 2.
Fuchs	160. D. I. 7.
Fuchsthurm	215. F. IV. 5.
Füllhorn	371. M. 1.
Fußhorn	296. I. III. 6.

	Seite.
Gartenbeetchen	238. G. II. 9.
Gartenſchnecke.	397. N. IV. 2.
Gelbſchmuz	177. D. IV. 8.
Geſpenſt	152. C. IV. 1.
Giennuſchel nierenförmige	69. M. 6.
Gieskanne	457. S. 9.
Gitterhorn	254. G. VII. 4.
Gittervenus	57. K. II. 18.
Glasbohrmuſchel	104 P. 6.
Glasſchnirkel	394. N. III. 18.
Glaspatelle	442 Q. IV. 1.
Goldmund	349. L. III. 4.
Gondel	226. F. V. 2.
Gurke glatte	208. F. III. 5.
Gürtelſchnecke	388. N. III. 10.
Gürtelſpindel	317. I. V. 14.
Gürtelvenus	58. K. III. 2.
Hahnenherz	38. G. 18.
Hahnenkamm	106. Q. I. 1.
Halbmond	409. N. VI. 6.

	Seite.
Hammer polniſcher	97. O. IV. 1.
Harfe	246. G. V. 1.
Hautſchnecke	297. I. III. 7.
Hermelinſchwanz	141. C. II. 11.
Herz dreyſeitiges	30. G. 5.
— gelbes	35. G. 13.
— gelbmündiges	34. G 12.
— glattes	35. G. 14.
— knottiges	32. G. 8.
— ſchuppiges	29. G. 4.
Herzmuſchel breite	37. G. 16.
— geribbte	28. G. 1.
— große	34. G. 11.
— kammähnliche	37. G. 17.
Herztute	123. C. I. 1.
Hexenmeiſter	334. K. I. 5.
Hochrücken	185. E. 4.
Hohlohr	427. P. 1.
Holzſpindel	320. I. V. 18.
Hornnerite	419. O. III. 2.
Hornſchlange	455. S. 5.
Hühnerdarm	457. S. 8.
Hundszahn	451. R. 4.

	Seite.
Huth ſpaniſcher	438. Q. II. 10.
—— gelber	441. Q. III. 6.
Huthſchnirkel	190. N. III. 13.
Jägertaſche	83. O. I. 5.
Jakobsmuſchel	61. O. I. 2.
Joch	184. E. 3.
Iſabelle	169. D. II. 7.
Jujubenkräuſel	342. K. II. 7.
Käfermuſchel kleine	I. A. 2.
— — ſchuppige	I. A. I.
Käferſchnecke	341. N. I. I.
Kammauſter	98. O. IV. 3.
Kammblat	18. Q. I. 3.
Kamelſchnecke	276. H. III. I.
Kamelotchen	425. O. III. 11.
Kammuſchel ſcharfribbige	91. O. II. 12.
Kammpatelle	441. Q. III. 5.
Kampfhahn	271. H. II. 2.

Kamm-

	Seite.
Kammvenus	61. K. III. 8.
Kanarienſchnecke breite	280. H. III. 6.
— — — höckerige	275. H. II. 7.
— — — knottige	281. H. III. 7.
Kanarienvogel	251. G. VI. 2.
Karkalſchnecke	380. N. II. 11.
Käſetutte	131. C. I. 8.
Kaſtanie große	301. I. IV. 2.
Käzchen geſlecktes	148. C. III. 6.
Kazenzunge	17. F. I. 1.
Kegel gedrehter	377. N. II. 7.
Kegelſchnirkel eingeſäumter	375. N. II. 4.
Keil	43. I. 1.
Kiebizey	187. E. 8.
Kinkhorn geſurchtes	251. G. VI. 3.
— — körniges	243. G. III. 4.
Klafmuſchel bäuchige	10. D. 1.
Klappmuſchel gezackte	63. L. 1.
Klauenmuſchel	112. Q. III. 5.
Klebbauſter	102. P. 1.
Kleid attaliſches	235. G. II. 5.
Klöppelküſſen	129. C. I. 5.
Knöpfchen glattes	182. D. IV. 17.

	Seite
Knottenbund	341. K. II. 5.
Knottengitter	448. Q. V. 4.
Knottennabel	410. O. I. 1.
Knottenſchelle	2 32. G. II. 1.
Knottenſchnecke runzelichte	303. I. IV. 6.
Knottenſturmhaube	235. G. II. 4.
Kofferhörnchen weißes	244. G. IV. 1.
Kompasmuſchel	82. O. I. 4.
Königsmantel	84. O. II. 1.
Kopfpatelle	440. Q. III. 3.
Korallenmuſchel	85. O. II. 2.
Korbmuſchel fahle	40. H. 2.
— — ſprengleriſche	39. H. 1.
Korbvenus	52. K. II. 10.
Kornelkirſche	206. F. III. 2.
— — eingeſäumte	207. F. III. 3.
Körnerſchild	435. Q. II. 6.
Kornknöpfchen	182. D. IV. 16.
Krabbenſchnecke	269. H. I. 5.
Krausſchnecke	289. I. II. 3.
Kräuſel gekörntes	343. K. II. 8.
Kräuſelſchnecke gebänderte	396. K. I. 8.
Kreidenſchnecke	386. N. III. 7.

Kro=

	Seite.
Kronenbacke	154. C. IV. 4.
Krontute	125. C. I. 2.
— — ſchwarzbraune	126. C. I. 3.
— — weiſſe	130. C. I. 6.
Kröte	166. D. II. 4.
Krötenſchnecke	292. I. III. 1.
Kuhaug	386. N. III. 8.
Lagermuſchel	53. K. II. 12.
Lagervenus punktirte	60. K. III. 6.
Lagerwalze	197. F. II. 2.
Landcharte	156. D. I. 2.
Langohr	197. F. I. 2.
Lanzennadel	261. G. VIII. 9.
Laus	179. D. IV. 13.
Livreeſchnecke	298. I. III. 9.
Löffel	437. Q. II. 9.
Lorbeerblat	97. O. IV. 2.
Löventute	144. C. II. 14.
Luchoneſerſchnecke	274. H. II. 5.

	Seite.
Mahlermuſchel	11. D. 2.
Mangosnadel	324. I. VI. 2.
Mantel bandirter	87. O. II. 5.
—— bunter	88. O. II. 7.
—— gefleckter	90. O. VI. 9.
—— gefurchter	86. O. II. 4.
—— gewölbter	84. O. I. 6.
—— glatter	89. O. II. 8.
—— goldgelber	91. O. II. 11.
—— langer	86. O. VI. 3.
—— menningrothe	88. O. II. 6.
Marmornadel	402. N. V. 2.
Marmorohr	428. P. 3.
Maſernporzellane	168. D. I. 11.
Matroſenkappe	438. Q. III. 1.
Maul krummes	299. I. III. 11.
Maulbeere gezackte	300. IV. 1.
— lange	302. I. IV. 4.
Maulwurf	162. D. I. 9.
— — graue	161. D. I. 8.
Maus	163. D. I. 10.
Mennonitentute	130. C. I. 7.

Men-

	Seiie.
Menſchenherz	28. G. 2.
Meereiche groſſe	2. B. 1.
Meertulpe	4. B. 2.
Meſſerheft	14. E. 2.
Midasohr	196. F. I. 1.
Miesmuſchel gefärbte	111. Q. III. 4.
—— gekerbte	110. Q. III. 2.
—— geribbte	113. Q. III. 6.
—— gemeine	110. Q. III. 3.
Milchporzellane	163. D. I. 11.
Milchſchale	408. N. VI. 5.
Mittelherz	31. G. 6.
Mohr bandirter	310. I. V. 4.
Mohrenbauch	164. D. II. 1.
Mohrenkrone	225. F. V. 1.
Mönch	137. C. II. 5.
—— grauer	138. C. II. 6.
Mondſchnecke aſchengraue	356. L. III. 1.
— — — gekielte	361. L. III. 8.
— — — knottige	257. L. III. 3.
— — — kräuſelartige	355. L. II. 12.
— — — ſturmhaubenartige	354. L. II. 11.

	Seite.
Morgenſtern ausgeſchnittener	307. I. IV. 10.
Mundſtück verkehrtes	378. N. II. 8.
Muſik wilde	221. F. IV. 12.
Muskatenblüthe	70. M. 7.
Mnskatennuß	253. G. VII. 2.
Münze guineiſche	172. D. IV. 2.
Müze	432. Q. II. 2.
Müze polniſche	237. G. II. 7.
Nabelherz	29. G. 3.
Nabelſchnecke	387. N. III. 9.
Nadel aſchengraue	262. N. VIII. 1.
—— durchgeſtochene	216. F. IV. 7.
—— durchſtochene	263. G. VIII. 2.
—— gekerbte	259. G. VIII. 6.
—— gekrönte	258. G. VIII. 5.
—— geſtriegelte	260. G. VIII. 7.
—— knottige	282. H. IV. 1.
—— roſtfarbige	258. G. VIII. 4.
—— umwundene	261. G. VIII. 10.

Na=

	Seite.
Nadel weiſſe	257. G. VIII. 3.
Nadelfeile	329. F. IV. 2.
Nadelwalze rauhe	213. F. VI. 8.
Nagelherz	31. G. 7.
Nähnadel	260. G. VIII. 8.
Napfſchnecke blaue	436. Q. II. 7.
— — — dreykielige	439. Q. III. 2.
— — — einſeitige	440. Q. III. 4.
Narrenkappe	66. M. 1.
Naſſauer	347. L. II. 2.
Neptunsdoſe	82. O. I. 3.
Nerite braune	413. O. I. 3.
—— bruttragende	418. O. III. 1.
Nezhorn	255. G. VII. 5.
Nezſchnecke	299. I. III. 10.
Neztute bandirte	138. C. II. 7.
Notenſchnecke	218. F. IV. 10.
Ochſendarm	456. S. 7.
Ochſenherz unächtes	49. K. II. 6.

	Seite.
Oelkuchen eckiger	295. I. III. 6.
— — — geribbter	295. I. III. 4.
— — — knottiger	194. I. III. 3.
Oelkrug	353. L. II. 50.
Ohr geſtreiſtes	428. P. 2.
Ohrhorn	407. N. VI. 3.
Olivenkern	210. F. III. 7.
Olivenwalze	198. F. II. 2.
Orangenkegel	147. C. III. 4.
Oranienbohrer	133. C. I. 11.
Oſt- und Weſtmuſchel	36. G. 15.
Pabſtkrone	217. F. IV. 9.
Pagodenſchnecke	350. L. II. 6.
Pantoffel	431. Q. I. 2.
Papierhaube	236. G. II. 6.
Papierrolle	188. E. 9.
Papusmuſchel	113. Q. III. 7.
Pellerontnerite	422. O. III. 7.
Perlmutter	108. Q. II. 1.
Perſpektivſchnecke	333. K. I. 3.

Pfer=

	Seite.
Pferdefuß	67. M. 3.
Pferdehuf dorniger	71. M. 9.
Pharaoſchnecke	333. K. I. 4.
Pilgrimsmuſchel	8. O. I. 1.
Pimpelchen	303. I. IV. 5.
Platwirbel	147. C. III. 5.
Podagraſchnecke	268. H. I. 4.
Polierzahn	451. R. 5.
Porzellanblaſe	193. E. 15.
Poſthorn	122. B. 2.
Prinzenfahne	193. E. 16.
Purpurhorn gehörntes	286. I. I. 5.
Purpurſchnecke dreyflüglige	287. I. II. 1.
— — — dreyſeitige	288. I. III. 2.
— — — vieleckige	292. I. II. 6.
Pyramide glatte	330. K. I. 1.
— — knottige	331. K. I. 2.
Rautenkörbchen	76. N. III. 2.
Rebhun	229. G. I. 2.
Reisbrey Mondſchnecke	346. L. I. 2.

	Seite.
Oelkuchen eckiger	295. I. III. 6.
— — — geribbter	295. I. III. 4.
— — — knottiger	194. I. III. 3.
Oelkrug	353. L. II. 50.
Ohr geſtreiſtes	428. P. 2.
Ohrhorn	407. N. VI. 3.
Olivenkern	210. F. III. 7.
Olivenwalze	198. F. II. 2.
Orangenkegel	147. C. III. 4.
Oranienbohrer	133. C. I. 11.
Oſt- und Weſtmuſchel	36. G. 15.
Pabſtkrone	217. F. IV. 9.
Pagodenſchnecke	350. L. II. 6.
Pantoffel	431. Q. I. 2.
Papierhaube	236. G. II. 6.
Papierrolle	188. E. 9.
Papusmuſchel	113. Q. III. 7.
Pelleroutnerite	422. O. III. 7.
Perlmutter	108. Q. II. 1.
Perſpektivſchnecke	333. K. I. 3.

Pfer=

Deutſche Benennungen.

	Seite.
Pferdefuß	67. M. 3.
Pferdehuf dorniger	71. M. 9.
Pharaoſchnecke	333. K. I. 4.
Pilgrimsmuſchel	8. O. I. 1.
Pimpelchen	303. I. IV. 5.
Platwirbel	147. C. III. 5.
Podagraſchnecke	268. H. I. 4.
Polierzahn	451. R. 5.
Porzellanblaſe	193. E. 15.
Poſthorn	122. B. 2.
Prinzenfahne	193. E. 16.
Purpurhorn gehörntes	286. I. I. 5.
Purpurſchnecke dreyflüglige	287. I. II. 1.
— — — dreyſeitige	288. I. III. 2.
— — — vieleckige	292. I. II. 6.
Pyramide glatte	330. K. I. 1.
— — knottige	331. K. I. 2.
Rautenkörbchen	76. N. III. 2.
Rebhun	229. G. I. 2.
Reisbrey Mondſchnecke	346. L. I. 2.

Reis-

	Seite.
Reiskorallenporzellane	180. D. IV. 14.
Ring	173. D. IV. 3.
Rinne	13. E. 1.
Röhre dreyeckige	452. S. 1.
Roſtfleckchen	177. D. IV. 9.
Rothmund	148. G. V. 3.
Rübe	191. E. 13.
Rübe dicke	306. I. IV. 9.
—— langſchnabelige	312. I. V. 6.
Rudolphsſchnecke	247. G. V. 2.
Runzelbund	352. L. II. 8.
Runzelgitter	446. Q. V. 2.
Runzelklappe	100. O. IV. 6.
Safrankräuſel	343. K. II. 9.
Säge	42. I. 4.
Salzkornporzellane	166. D. II. 3.
Sammetmuſchel	78. N. IV. 2.
Sandpfeife	455. S. 6.
Sandtelline	25. F. III. 1.
Sandtutte	143. C. II. 13.

Sat-

Sattel polniſcher	101. O. IV. 7.
Säumchen gefaltenes	241. G. III. 1.
Scharfribbe	366. L. V. 2.
Scheibenſchnecke	375. N. II. 3.
Schellenhorn	228. G. I. 1.
Schellenſchnecke franzöſiſche	195. E. 17.
Schifsboot dicker	121. B. 1.
Schifsfahne	345. K. III. 2.
Schildkrötennapf	442. Q. IV. 2.
Schildkrötenpocke	5. B. 5.
Schildkrötenporzellane	159. D. I. 5.
Schildkrötentute	137. C. II. 3.
Schildmuſchel ächte	62. K. IV. 1.
Schinckchen	24. F. II. 5.
Schinke edle	116. R. 2.
— — geräucherte	116. R. 1.
— — lange	117. R. 4.
Schlammſchnecke	384. N. III. 4.
Schlangenhaut	353. L. II. 9.
Schlangenhorn	390. N. III. 12.
Schlangenkopf	103. P. 5.
— — — der groſſe	165. D. II. 2.
Schlauchdattel dicke	202. F. II. 3.
Schminkpfläſterchen	302. I. IV. 3.

Schnau=

Schnauzennadel 323. I. VI. 1.
Schnepfenkopf dorniger 286. I. I. 4.
— — — gezackter 285. I. I. 3.
Schnepfennadel gedörnte 326. I. VI. 5.
Schnepfenſchnabel 282. I. I. 1.
Schnirkel gefleckter 380. N. II. 12.
— — verkehrter 391. N. III. 15.
Schnirkelmondſchnecke 355. L. II. 13.
Schnirkelnadel abgeſtuzte 401. N. V. 1.
— — — braune 404. N. V. 5.
— — — gefaltene 403. N. V. 3.
— — — gefleckte 404. N. V. 4.
Schnirkelſcheibe 382. N. III. 2.
Schnirkelſchnecke ausgeſchnittene 378. N. II. 9.
— — blaue 392. N. III. 16.
— — bunte 398. N. IV. 4.
— — dickſchalige 408. N. VI. 4.
— — gemalte 397. N. IV. 3.
— — lebendig gebährende 393. N. III. 17.
— — offene 399. N. IV. 5.
Schnurbund 342. K. II. 6.
Schnurwalze 212. F. IV. 1.
Schraube alte 567. L. V. 4.
— — bunte 365. L. V. 1.

Schup-

	Seite.
Schuppenbezoar	238. G. II. 8.
Schüſſelchen	90. O. II. 10.
Schwalbe	170. D. III. 1.
Schwarzaug	178. D. IV. 11.
Schwarzohr	400. D. IV. 7.
Schweizerhoſe gezackte	277. H. III. 2.
Schwimmſchnecke breitſurchige	426. O. III. 13.
— dicklippige	412. O. I. 2.
— gefiederte	420. O. III. 5.
— geſurchte	416. O. I. 7.
— geribbte	424. O. III. 10.
— glatte	421. O. III. 6.
— grüne	419. O. III. 3.
— ſtumpfe	423. O. III. 8.
Seenuß	68. M. 4.
Seepocke	3. B. 2.
Seetonne	344. K. III. 1.
Segler breitkieliger	120. A. I. β.
— papierner	119. A. I.
— ſchmalkieliger	119. A. I. α.
Silbermund bunter	359. L. III. 5.
— geribbter	358. L. III. 4.
— grüner	348. L. II. 3.

	Seite.
Skorpionſchnecke	290. I. II. 4.
Smaragdſchnecke	249. G. V. 5.
Sommerſproſſe	271. H. II. 1.
Sonnenhorn	337. K. I. 10.
Sonnenſchirm	436. Q. II. 8.
Sonnenſtrahl geſtreiſter	18. F. I. 3.
— glatter	23. F. II. 4.
— kleiner	25. F. II. 7.
Spalte	445. Q. V. 1.
Spielmuſchel	52. K. II. 7.
Spindel franzöſiſche	309. I. V. 3.
— gefleckte	317. I. V. 13.
— gezackte	312. I. V. 7.
— javaniſche	309. I. V. 2.
— indiſche	311. I. V. 5.
— nordiſche	315. I. V. 11.
— rothbraune	318. I. V. 15.
— zweykielige	314. I. V. 10.
Spinne	283. I. I. 2.
Spizdattel	203. F. II. 4.
Spizſäule	338. K. II. 1.
Spizenrolle	150. C. III. 8.
Sporn	351. L. II. 7.

	Seite.
Stachelnadel höckerige	325. I. VI. 3.
— ſchwarze	329. I. VI. 9.
Staatenfahne	189. E. 10.
Steinbohrer	7. C. 1.
— geribbter	8. C. 2.
Steinchen	248. G. V. 4.
Steinkern	92. O. II. 13.
Steinmuſchel	109. Q. III. 1.
Steckmuſchel gedornte	117. R. 3.
Sternnadel	265. H. I. 1.
Sternpatelle	432. Q. II. 1.
Sternporzellane	178. D. IV. 10.
Strahlgitter	447. Q. 5. 3.
Strahlpatelle	443. Q. IV. 3.
Strahlſcheibe	61. K. III. 7.
Strahlſcheide blaue	16. E. 4.
Strandmondſchnecke	346. L. I. 1.
Strandnerite	417. O. II. 2.
Stricknadel	256. G. VIII. 1.
Strohhut	444. Q. IV. 4.
Stümpfchen	42. I. 3.
Stumpfmuſchel ſtachlichte	41. I. 2.

	Seite.
Sturmhaube dicklippige	230. G. I. 3.
— gefurchte	230. G. I. 4.
— geſtrickte	233. G. II. 2.
— rothe	234. G. II. 3.
Taſche rauhe	96. O. III. 4.
— wellenförmige	94. O. II. 16.
Täubchen	279. H. III. 4.
— brütendes	209. F. III. 6.
— traurendes	211. F. III. 9.
Taubeney	186. E. 6.
Teichhorn	406. N. IV. 2.
Tellmuſchel blaßrothe	21. F. II. 1.
— dreyeckige	27. F. III. 4.
— dunkelrothe	22. F. II. 2.
— eckige	19. F. I. 4.
— runzelichte	18. F. I. 2.
— ſcharfrandige	22. F. II. 3.
— ſchuppige	26. F. III. 2.
— unächte	20. F. I. 6.
Tiegernadel	257. G. VIII. 2.

	Seite.
Tiegerporzellane	167. D. II. 5.
Tiegertute	127. C. I. 4.
Tiegerzunge	158. K. III. 1.
Topf	227. F. V. 3.
Treppe	250. G. VI. 1.
Trinkſchale	445. Q. IV. 6.
Tritonsſchnecke	316. I. V. 12.
Trommelſchraube	368. L. V. 6.
— geſtreifte	368. L. V. 5.
Tulpe	153. C. IV. 3.
Tute guineiſche	136. C. II. 4.
Vaſe	221. F. IV. 13.
— gezackte	223. F. IV. 15.
— rothmündige	222. F. IV. 14.
Venusmuſchel ächte	44. K. I. 1.
— aderige	59. K. III. 4.
— ausgekehlte	48. K. II. 4.
— breitblätterige	48. K. II. 3.
— gereifte	47. K. II. 2.
— ſchiefe	49. K. II. 5.

	Seite.
Venusmuſchel warzige	46. K. II. 1.
— weißbackige	55. K. II. 5.
— weitlippige	54. K. II. 13.
— wellenförmige	54. K. II. 14.
Vielfußſchnecke	270. H. I. 16.
Vogeldarm	454. S. 4.
Vogelfuß	266. H. I. 2.
Vogelmuſchel	114. Q. III. 8.
Vortreppe	320. I. 5. 17.
Wachsſchnirkel	374. N. II. 2.
Wafelmuſchel	56. K. II. 17.
Waldhorn	383. N. III. 3.
Waldſchnecke	395. N. IV. 1.
Walfiſchpocke	4. B. 4.
Walzenporzellane	169. D. II. 8.
Warzendotter	415. O. I. 6.
Warzenſchnirkel	391. N. III. 14.
Waſchbecken	66. M. 2.
Weberſpuhl kleiner	184. E. 2.

Wein-

	Seite
Weib altes	45. K. I. 2.
Weibchen armes	210. F. III. 8.
Weinbergsſchnecke gemeine	385. N. III. 5.
— linksgewundene	385. N. III. 6.
Weißaug	175. D. IV. 6.
Weitaug	160. D. I. 6.
Wellenhorn	253. G. VII. 3.
Wellennerite	425. O. III. 10.
Wellenſpindel	322. I. V. 20.
Wendeltreppe ächte	362. L. IV. 1.
— gemeine	363. L. IV. 2.
Wirbelhorn	389. N. III. 11.
Wirbelſchnecke	335. K. I. 7.
Widderhorn	383. N. III. 3.
Wolfszahn	450. R. 3.
Wolkenbacke	153. C. IV. 2.
Wolkenrolle	149. C. II. 7.
Wulſt	186. E. 5.
Wulſtknöpfchen	338. K. II. 2.
Würfelkräuſel	336. K. I. 9.

	Seite.
Zähnchen geſtreiſtes	449. R. 2.
Zahnſchraube geſleckte	369. L. V. 7.
Zahnwirbel	381. N. II. 13.
Ziegelherz	32. G. 9.
Zirkelbohrer	145. C. III. 2.
Zirkelſcheibe	59. K. III. 3.
Zwibelſchale	102. P. 2.
Zwirntute	132. C. I. 10.

NOMENCLATOR BELGICVS.

Holländiſche Benennungen.

	Pag.
Adoublet, de griekiſche	53. K. II. 12.
Aardbeſie	33. G. 10.
Achaat-gaaper	51. K. II. 8.
Achaatje	200. F. II. 2. η.

Achaat-

	Pag.
Achaat-peer	319. I. V. 16.
Achaat-toot	154. C. IV. 3.
Adama-doublet	93. O. II. 14.
Admiral, opper	134. C. II. 2.
Alykruik	346. L. I. 1.
— geworte	426. O. III. 13.
Arabiſche Lettershorn	157. D. I. 3.
Arakans-garen	132. C. I. 10.
Arke Noachs ſoort.	74. N. II. 2.
Argus, dubbelde	158. D. I. 4.
Argus Oogen, gebande	295. I. III. 4.
Baardnyper	12. D. 4.
Babilonſe Tooren	308. I. V. 1.
Bacaſſan doublet	20. F. I. 3.
Bagyne-drolle	331. K. I. 2.
Bak gekroonde	225. F. V. 1.
Bakje bruingebandeerd	193. E. 15.
Bandpen	214. F. IV. 4.
— genobelde	216. F. IV. 6.
Banket hammetje	24. F. II. 5.

	Pag.
Baſtert - Argus	156. D. I. 1.
Baſtert - Oranje Admiral	146. C. III. 3.
Baſtert - tygers katje	134. C. II. 1.
Baſtert - Wewers ſpoeltje	184. E. 2.
Beddetje, geſtreepte	239. G. II. 10.
Belhorn, franſche	195. E. 17.
— geknobbelde	232. G. II. 1.
— geplekte	231. G. I. 5.
— geribbde	228. G. I. 1.
Bernſteen - Oeſter	103. P. 3.
— paarſche	102. P. 3.
Beuldoubiet	15. E. 3.
Bezaan Knop, getaakte	328. I. VI. 7.
Bezaantje	278. H. III. 3.
— opgerollde	279. H. III. 5.
Bezoar, geſchubde	238. G. II. 8.
— gevlackte	239. G. II. 9.
Boerenjonge	252. G. VII. 1.
Boeren Myſik	142. C. II. 12.
Boetje	210. F. III. 7.
Bokje	347. L. II. 1.
Bonne je	432. Q. II. 1.
Bonje	208. F. III. 4.

Boots-

	Pag.
Bootshaak Wuiſje	267. H. I. 3.
Bostrappen	320. I. V. 17.
Boterweg	140. C. II. 9.
Brana Hoorn dubbelde	291. I. II. 5.
Brandvlakje	176. D. IV. 7.
Broinet-toot	151. C. III. 9.
Buitslakje	338. K. II. 1.
Bultje	279. H. III. 4.
— gevoord	250. G. VI. 1.
Caſtanje, bandeerde	301. I. IV. 2.
Daadel	198. F. II. 2.
— swarte	201. F. II. 2.
Davids harp	246. G. V. 1.
Diklip	339. K. II. 3.
Dokje huiſje	119. A. 1.
Dolphyn, getakte	360. L. III. 6.
Doyer, platte	415. O. I. 5.

	Pag.
Draakje	175. D. IV. 5.
Duiſje, broedende	209. F. III. 6.
Duizend been	270. H. I. 6.
Ecken - houts toot	140. C. II. 10.
Eende - Schulpe	6. B. 6.
Ezeltje	171. D. III. 2.
Foelie - Bladeren	70. M. 7.
Fonteinbak	66. M. 2.
Fortreſſe	434. Q. II. 3.
Gapper, eeviger	8. C. 2.
Gelsmetje	177. D. IV. 8.
Geneeſche toot	136. C. II. 4.
Gnemoe hoorn	317. I. V. 13.
Goldlaken	150. C. III. 8.

Goud-

	Pag.
Goudmond	349. L. II. 4.
Grasje	432. Q. II. 2.
Haanekam	106. Q. I. 1.
— getakte	107. Q. I. 2.
Hammetje, gedoord	117. R. 3.
Hart, blaaſagtig	37. G. 16.
Hart toot	124. C. I. 1. α.
— roodt	124. C. I. 1. β.
Hermelin Staart	141. C. II. 11.
Holzeeor, groot	427. P. 1.
Hondsdarm	456. S. 7.
Hoogruggetje	186. E. 5.
Hornslangetje	457. S. 8.
Jaager - Weytaſch	83. O. I. 5.
Jacobs - doublet, ſpaanſche	81. O. I. 2.
Jacobs Kruck	226. F. V. 2.

	Pag.
Jacobs - ſchulp.	81. O. I. 1.
Jamboeze, witte	185. E. 4.
Indian	311. I. V. 5.
Jokje	185. E. 3.
Joppe - doublet	82. O. I. 3.
Iſabelle	169. D. II. 7.
Juffertje, rood	25. F. II. 7.
Kaaphorn	156. D. I. 2.
Kaas, groene	132. C. I. 9.
Kamelhoorn	276. H. III. 1.
Kamelotje	425. O. III. 11.
Kanartje, gebande	275. H. II. 7.
— geblomde	280. H. III. 6.
— gebulde	281. H. III. 7.
Kapje, gedoored	435. Q. II. 5.
Kapje, geele	444. Q. IV. 4.
—— geſtraalte	436. Q. II. 7.
Karkal	380. N. II. 11.
Kasket, graeuwe	241. G. III. 2.

	Pag.
Katetonge	18. F. I. 1.
Katje, geplekte	148. C. III. 6.
—— blaeuwe	170. D. III. 1.
Kauris blaeuwe	173. D. IV. 3.
—— gemeene geele	173. D. IV. 2.
Kemphaantje	271. H. II. 2.
Kievits-Ey	188. E. 8.
—— witte	187. E. 6.
Kindje, gebakerde	364. L. IV. 3.
Kinkhorn	316. I. V. 12.
Kliphorn, getygerde	167. D. II. 5.
Knobbelhorn	321. I. V. 19.
— bonte	354. L. II. 10.
Knoll, geknobbelde	306. I. IV. 9.
— langeſtaarte gladde	312. I. V. 6.
Knollhorn	191. E. 13.
Kofferhoorntje	244. G. IV. 1.
Kokhaan, bonte	38. G. 18.
Kompas-Schulp	82. O. I. 4.
Königs Mantel	84. O. II. 1.
Koral-doublet	85. O. II. 2.
Korelye-Knoopje	182. D. IV. 16.
Kornoelkersje geſtippelte	207. F. III. 2. β.

Kor-

	Pag.
Kornoeltje, gebandeerde	206. F. III. 2.α.
Kousdoublet, geſtreepte	45. K. I. 3.
Krabbe, geele	269. H. I. 5.
Kroon - hoorn	125. C. I. 2.
— tuetee	126. C. I. 3.
Knipers - Boor	192. E. 14.
— gegranuleerde	145. C. III. 1.
— gladde	251. G. VI. 2.
— witte gevoornde	145. C. III. 2.
Kwaker, geſtraalde	52. K. II. 10.
Kwalle - Bootje	393. N. III. 16.
Landcharten, weſtindiſche	144. C. II. 14.
Laurierblad	97. O. IV. 2.
— gekamd	108. Q. I. 3.
Lazarus Klappen, getakte	64. L. 1.
Leger, turkiſche	61. K. III. 6.
Lettersſchulp, langaagtige	62. K. IV. 1.
Livrey - hoorn	298. I. III. 9.
Lohoensſche Hoorntje	274. H. II. 5.

Lots-

	Pag.
Lotskap	439. Q. III. 1.
Maagt-Bloem	75. N. III. 1.
Malpriem	256. G. VIII. 1.
Mantel, gebandeerde	87. O. II. 5.
— — geſtippelte	89. O. II. 7.
Mauger Naalde	324. I. VI. 2.
Mazelen	168. D. II. 6.
Mennoniſt-toot	130. C. I. 7.
Meshammer	97. O. IV. 1.
Meſſehecht	14. E. 2.
Midas-Oor	196. F. I. 1.
Modervlakje	244. G. III. 5.
Moerberzie, langverpige	302. I. IV. 4.
Moerbey, getakte	300. I. IV. 1.
— — graeuwe	276. H. II. 8.
Mol	162. D. I. 9.
— graeuwe	161. D. I. 8.
— roode	161. D. I. 7.
Monniks-Kappe	216. F. IV. 7.
Moſſel	110. Q. III. 3.
— breede purpuragtige	113. Q. III. 5.

	Pag.
Muis	163. D. I. 10.
Munnik graeuwe	201. F. II. 2. *x*.
— —	137. C. II. 5.
Muſikhoorn	218. F. IV. 10.
— — wilde	221. F. IV. 11.
Muts poolſche	171. D. III. 3.
— —	237. G. II. 7.
Naalde-pen	260. G. VIII 7.
Nagel doublet, gedoornte	31. G. 7.
Nagel-ſchulp	32. G. 9.
Navel-Slak	387. N. III. 9.
— —	410. O. I. 1.
Net-tootje	138. C. II. 7.
Noachs Arck, rechte	73. N. II. 7.
Noote Moskat, getakte	253. G. VII. 3.
Ocean-hoorn	289. I. II. 5.
Oeſter	99. O. IV. 2.

Oe-

	Pag.
Oeſter gedraaide	72. N. I. 1.
—— okergeele	71. M. 8.
Offerhoorn, witte	224. F. IV. 16.
Oiſtelhoorntje	304. I. IV. 7.
Olyfants, tand	419. R. 1.
Olyhoorn, diklippige	230. G. I. 3.
Olykock, gebulde	294. I. III. 3.
Oorhoorn	299. I. III. 11.
Oorſchulp, witte	408. N. VI. 5.
Oranje - Mantel	92. O. II. 12.
Orgelpypen	13. E. 1.
Oiſt en Weſt - doublet	36. G. 15.
Oude Wyſs ſchulp gerimpelde	45. K. I. 2.
Paadehoorn	292. I. III. 1.
Paardevoetje	67. M. 3.
Paerltje	182. D. IV. 17.
Pantofeltje	431. Q. I. 2.
Papier - turkſe, zonder lippen	236. G. II. 6.
— — — porcellain horn	164. D. I. 12.
Papier-Kasket, volwaſſe turkſche	235. G. II. 4.

	Pag.
Papiere Nautilus, breed kielde	120. A. I. β.
Parlslakke	121. B. 1.
Patelle getepelte	440. Q. III. 3.
— — griekiſche	446. Q. V. 2.
Patrys horn	229. G. I. 2.
Pauſe Kroon	218. F. IV. 9.
— — — weſtindiſche	325. I. VI. 4.
Pelicans - Poot	266. H. I. 2.
Pen, gekartede	258. G. VIII. 5.
—— omwondene	261. G. VIII. 10.
Pennhoorn	217. F. IV. 8.
— — rauwe	213. F. IV. 2.
Peer, gedroyede	297. I. III. 8.
Perle - moer ſchulp	108. Q. II. 1.
— — — — longe	429. P. 4.
Perſpectiv - hoorn	333. K. I. 3.
Petool - hoorn	343. L. II. 2.
Pickenier	261. G. VIII. 9.
Pimpeltje	203. I. IV. 5.
Piſſeped	181. D. IV. 15.
Podagra - Kreft	268. H. I. 4.
Poelorontje	422. O. III. 7.
Pofferdoubled, gerib'd	78. N. IV. 1.

	Pag.
Pokje	174. D. IV. 4.
Porphyr Daadel	197. F. II. 1.
Porphyrſteene Daadel	200. F.II. 2. ζ.
Porſelain hoorn	183. E. 1.
Poſthoorentje	122. B. 2.
Poſthoorn , europiſche	382. N. III. 1.
— — gebandeerde	388. N. III. 10.
Prince Begræſenis	199. F.II.2. ϑ.
Prince Robertshoorn	334. K. I. 4.
Prince - Vlag	193. E. 16.
Pruìm	209. F. III. 5.
Purper - Hoorn gebandeerde	287. I. I. 5.
Raap	312. I. V. 7.
Ramshoorn	383 N. III. 3.
Raspdoublet	95. O. III. 2.
Remies	25. F. III. 1.
Rivier Pauſe Kroon	405. N. VI. 1.
Rood . bandje	190. E. 11.
Rood - Oog	418. O. III. 1.
Rootshoorn met Moesjeſes	302. I. IV. 3.

	Pag.
Rorzdoublet	71. M. 9.
Rys - Korrel	180. D. IV. 14.
Ryſtenbry - hoorentje	243. G. III. 4.
Scheppertje	283. I. I. 1.
Scherfje	49. K. II. 5.
Shild, getygerd	442. Q. IV. 2.
Schildpad - hoorn	159. D. I. 5.
Schildpad Luis	5. B. 5.
Schildpad - toot	136. C. II. 4.
Schildpaſtaert, gedoorende	305. I. IV. 8.
Schout by Nagt	125. C. I. 1. y.
Schwitzersbroek, capitaale	222. F. IV. 14.
— — — — getakte	223. F. IV. 15.
Scorpioentje	290. I. II. 4.
See - Noot	78. N. IV. 2.
Slange - Kop	165. D. II. 2.
—— kleene	164. D. II. 1.
Slangen Vellehoorn	352. L. II. 9.
Slangetje	390. N. III. 12.

Slek-

	Pag.
Slek - hoorn	416. O. I. 6.
Slet	61. K. III. 7.
Sluik - daadel	202. F. II. 3.
Slyk - Slek	384. N. III. 4.
Snippekop, gedoornde	285. I. I. 3.
— getakte	286. I. I. 4.
Snuite - pen, gedoornde	326. I. VI. 5.
Soldat	358. L. III. 3.
Sooſtolatje	177. D. IV. 9.
Speeldoublet	50. K. II. 7.
Speldewerk kuſſen	129. C. I. 5.
Spinnekop	284. I. I. 2.
Spoekje	152. C. IV. 1.
Spoor	351. L. II. 7.
Spraetje	271. H. II. 1.
Staate Vlagetje	189. E. 10.
Starre - pen, dikke	265. H. I. 1.
Steenbikker	374. N. II. 1.
Steen - moſſel	109. Q. III. 1.
Steenſcheede	7. C. 1.
Sterretje	178. D. IV. 10.
Stombje	42. I. 3.
Stormhoed, gebreide	233. G. II. 2.

	Pag.
Stormhoed, geribd weſtindiſche	236. G. II. 5.
— — roode	234. G. II. 3.
Strand - Doyer	414. O. I. 4.
Tabaks - pip	310. I. V. 3.
Tand, ploedige	420. O. III. 4.
Teepel bak	227. F. V. 3.
Telline, platzydige	24. F. II. 5.
Tel'moſſel, roode with ſtraalige	23. F. II. 4.
Toll, gevlakte	331. K. I. 1.
— langleevende	351. L. II. 6.
Toornje	215. F. IV. 5.
Toover - Slak	373. N. I. 1.
Top- Slak	391. N. III. 15.
Tovenaar	334. K. I. 5.
Transparant	105. P. 7.
Trommel - Schroef	368. L. V. 5.
Tuitje, witte	323. I. VI. 1.
Tulbande	340. K. II. 4.
Tulband, gerimpelde	352. L. II. 8.
Tulpen	4. B. 3.

	Pag.
Tyger-pen, dunne	257. G. VIII. 2.
Tyger-tong, wilde	58. K. III. 1.
Vaas, witte	221. F. IV. 13.
Vellhorn	297. I. III. 7.
Venus-doublet, geribde	28. G. 1.
Venus hart	28. G. 2.
— driezydig	30. G. 5.
Venus Schagt	457. S. 9.
Venus ſchulp, rechte met Hair	44. K. I. 1.
Vjſch huiſje	430. Q. I. 1.
Vlagetje	345. K. III. 2.
Vleermuis	219. F. IV. 11.
Vleeshoorn	273. H. II. 4.
Vleugelhoorn, getakte	277. H. III. 2.
Vleugelhoorntje	287. I. II. 1.
— geplekte	288. I. II. 2.
Vliegge ſchettje	143. C. II. 13.
Vloerken, italianſche	131. C. I. 8.
Voethoorn	196. I. III. 6.
Vogeltje	114. Q. III. 8.

	Pag.
Vorſchen - poppe	294. I. III. 2.
Vyg, ſpaanſche	190. E. 12.
Wafelyſer	56. K. II. 17.
Wenteltrap	362. L. IV. 1.
Wenteltrapje	363. L. IV. 2.
Whulk	254. G. VII. 3.
— noordſche	315. I. V. 11.
Witooge	175. D. IV. 6.
Wit - rugge, cartageenſe	167. D. II. 4.
Wolfstand, witte	451. R. 4.
Wolkbakje	153. C. IV. 2.
Wolkhoorn	149. C. III. 7.
Wolkje	154. C. IV. 4.
Wydmonder	247. G. V. 2.
Wyd - Oog	160. D. I. 6.
Wyfje, kleene, van den Argus	172. D. IV. 1.
Wyngards - Slak	385. N. III. 5.
Wyzer	272. H. II. 3.

Zaa-

	Pag.
Zaagertje	42. I. 4.
Zadel, poolſche	101. O. IV. 7.
Zandmoſſel	114. Q. III. 7.
Zeeohr, geſtrepte	428. P. 2.
Zeepocke	3. B. 2.
Zeepuiſten	2. B. 1.
Zeeſchelling	4. B. 4.
Zeeslangetje	455. S. 5.
Zeeton	334. L. II. 3.
Zee Vloog	179. D. IV. 13.
Zilverlaken	152. C. IV. 1.
Zilvermond	348. L. II. 3.
— — bonte	359. L. III. 5.
— — geplekte	358. L. III. 4.
Zoomtje, geſtreepte	241. G. III. 2.
— gladde	242. G. III. 3.
Zooneſtraal	19. F. I. 3.
— rooſe roodt	16. E. 5.
— violet blauwe	16. E. 4.
Zotskap	66. M. 1.
Zoute Koreltje	166. D. II. 3.

NO-

NOMENCLATOR GALLICVS.

Franzöſiſche Benennungen.

Admiral, faux orangé	146. C. III. 3.
— — — grand	134. C. II. 2.
Agate boſſue	202. F. II. 3.
Agathine	319. I. V. 16.
Aigrette	221. F. IV. 13.
Aile d'ange	271. H. II. 2.
Aile de papillon	136. C. III. 4.
Ailée boſſue	275. H. II. 7.
—— grande	277. H. III. 2.
Alene	261. G. VIII. 9.
Amande	62. K. III. 8.
Amande a cils	74. N. II. 2.
Ane, petit	171. D. III. 2.
Antale	451. R. 4.
Araignée femelle	267. H. I. 3.
— male	269. H. I. 5.
Arche de Noe	73. N. II. 1.

Ar-

	Pag.
Arculaire blanc	244. G. IV. 1.
Argus a boutons	295. I. III. 4.
Argus, faux	157. D. I. 3.
— — grand	158. D. I. 4.
— — petit	172. D. IV. 4.
Arlequine, la fauſſe	157. D. I. 3.
Arroſoir	457. S. 9.
Aſſemblage de bojaux	454. S. 3.
Aſtrolepas	432. Q. II. 1.
Baquet bandé	193. E. 15.
Becaſſe epineuſe	284. I. I. 2.
Bigourneau	346. L. I. 1.
Biſtournée	72. N. I. 1.
Bois de chene	140. C. II. 10.
Bonnet de Dragon	439. Q. III. 1.
— polonois	171. D. III. 2.
	237. G. II. 7.
Boſſüe	185. E. 3.
Bouche d' Argent	348. L. II. 3.
— — — bariolée	358. L. III. 4.

Bouche

	Pag.
Bouche d'or	349. L. II. 4.
— — petite	186. E. 5.
Bouclier de Tortue	442. Q. IV. 2.
Bout de Chandelle	130. C. I. 7.
Bouton de Camiſole	334. K. I. 4.
	338. K. II. 1.
Brocard de Soye	154. C. IV. 3.
Brunette	151. C. III. 9.
Buccin unique	313. I. V. 8.
Bulle d'eau	187. E. 6.
Cabochon	430. Q. I. 1.
Cadran	333. K. I. 3.
Came coupée	41. I. 1.
— marquée de Verges	50. K. II. 7.
— truitée	51. K. II. 8.
Campement turque	61. K. III. 6.
Carte geographique	156. D. I. 2.
Casque Bezoard	241. G. III. 2.
— cannelé, gros	239. G. II. 10.
— pavé	238. G. II. 8.

	Pag.
Caſque plume	236. G. II. 6.
— trinangulaire	235. G. II. 4.
— tricoté	233. G. II. 2.
— truitë	239. G. II. 9.
— tuberculé	232. G. II. 1.
Chagrin	18. F. I. 1.
Chameau	276. H. III. 1.
Chataigne a bandes	301. I. IV. 2.
Chauſſe trappe	223. F. IV. 15.
— — —	289. I. II. 3.
Chaeuve Souris	219. F. IV. 11.
Chenille blanche	223. I. VI. 1.
Chicorée	291. I. II. 5.
Cloniſſe	46. K. II. 1.
Cloporte	181. D. IV. 15.
Cloud	256. G. VIII. 1.
Cocombre pointée	208. F. III. 4.
Coeur allongée	69. M. 5.
Cocur en Arche de Noe	75. N. III. 1.
Cocur de boeuf	66. M. 1.
— epincux	31. G. 7.
— tuillé	32. G. 9.
Cocur enflé	37. G. 16.

	Pag.
Coeur triangulaire	30. G. 5.
— de Venus	28. G. 2.
Colique	173. D. IV. 3.
Conque anatifere	6. B. 6.
— exotique	28. G. 1.
— de St. Jaques, bariolée	81. O. I. 1.
— perſiqne	247. G. V. 2.
— de Venus, a pointes	44. K. I. 1.
Contre Admiral	125. C. I. 1. γ.
Coq bigaré	38. G. 18.
Coquette	302. I. IV. 3.
Coquille de St. Jaques d'Eſpagne	81. O. I. 2.
Coralline	85. O. II. 2.
Cornalline	200. F. II. 2. η.
Corne d'Amon	122. B. 2.
Cornouille faſciée	206. F. III. 2. α.
— ponctuée	207. F. III. 2. β.
Couronne d'ethiopie	225. F. V. 1.
— — imperiale	125. C. I. 2.
Crapaud	167. D. II. 4.
Crete de Coq	107. Q. I. 2.
Cuiller de Neptune	226. F. V. 2.

	Pag.
Cuillere	437. Q. II. 8.
Culotte de Suiſſe	294. I. III. 3.
Dail	7. C. 1.
Damier	127. C. I. 4.
Datte	109. Q. III. 1.
Dauphin	360. L. III. 6.
Degrés bordés	297. I. III. 8.
Dent de loup	450. R. 3.
Dentale	449. R. 1.
Drap d'argent	236. G. II. 5.
— mortuaire	199. F. II. 2. δ.
— d'or	150. C. III. 8.
— a reſeau	139. C. II. 8.
l'Ebraique	221. F. IV. 12.
— — —	142. C. II. 12.
— la fauſſe	134. C. II. 1.
Ecaille de tortue	136. C. II. 3.
l'Ecorchée	149. C. III. 7.

	Pag.
Ecriture arabique	62. K. IV. 1.
— — grecque	53. K. II. 12.
l' Emeraude	249. G. V. 5.
Enfant au maillot	364. L. IV. 3.
Entonnoir	445. Q. IV. 6.
l'Eperon	351. L. II. 7.
l'Eventail	82. O. I. 4.
Faitiere	66. M. 2.
Feuille	108. Q. I. 3.
— de Choux	67. M. 3.
— de Laurier	97. O. IV. 2.
Figue	190. E. 12.
Flambojante	129. C. I. 5.
Foret	260. G. VIII. 7.
Forteresse	434. Q. II. 3.
Fraiſe rouge	33. G. 10.
Fripiere	355. L. II. 12.
Furie flambojante	77. N. III. 3.
Fuſeau	310. I. V. 3.
— etoilé	265. H. I. 1.

Ga-

	Pag.
Gatteau feuilleté	70. M. 7.
Gibeciere en Manteau	83. O. I. 5.
Gland de mer rayé	3. B. 2.
— — tulipe	2. B. 1.
— — turban	4. B. 3.
Gondolée rayée	189. E. 10.
Gourgandine	51. K. II. 9.
Grelée	166. D. II. 3.
Grenouillette	294. I. III. 4.
Grimace	299. I. III. 11.
Gueule de Loup	373. N. I. 1.
— — noire	274. H. II. 5.
— — de ſouris	115. Q. III. 6.
Guilochée	26. F. III. 2.
Harpe	246. G. V. 1.
Heriſſon	300. I. IV. 1.
Hermine	132. C. I. 9.
Hirondelle	114. Q. III. 8.
Huitre	99. O. IV. 4.
— d'ambre jaune	103. P. 3.

	Pag.
Huitre ecailleuſe a feuilles couleur de citron	71. M. 8.
— electrique	102. P. 2.
— epineuſe	64. L. 1.
Jamaique	60. K. III. 5.
Jambonneau epineux	117. R. 3.
Indienne	311. I. V. 5.
Iſabelle	169. D. II. 7.
Lampe antique	379. N. II. 10.
Lanterne rouge rayonée de blanc	16. E. 5.
Lard	305. I. IV. 8.
Leopard rouge	124. C. I. 1. α.
Lepas granuleux	435. Q. II. 5.
Levantine	46. K. I. 4.
Lievre	159. D. I. 5.
Manche de Couteau	13. E. 1.
— — courbée	15. E. 3.

Mon-

	Pag.
Manche de couteau femelle	13. E. 2.
Monteau bandé	87. O. II 5.
— — ducal	84. O. II. 1.
— — d'orange	92. O. II. 12.
— — pointillé	89. O. II. 7.
Marteau	97. O. IV. 1.
Maſſue la grande	285. I. I. 3.
— — d' Hercule	286. I. I. 4.
— — liſſe	312. I. V. 6.
Mere Perle	108. Q. II. 1.
Mignature	216. F. IV. 6.
Millepied	270. H. I. 6.
Minaret	216. F. IV. 6.
Minime	138. C. II. 6.
Miſaine roulée	279. H. III. 5.
Monnoye de Guinée	173. D. IV. 2.
Moresque	201. F. II. 2. λ.
Moskat	253. G. VII. 2.
Moule	110. Q. III. 3.
— arboriſée	111. Q. III. 4.
— des peintres	11. D. 2.
— de la terre des Papous	114. Q. III. 7.
Mure allongée	302. I. IV. 4.

	Pag.
Muſcade	188. E. 8.
Muſique	218. F. IV. 10.
Nappe d' Italie	131. C. I. 8.
Naſſavienne	347. L. II. 2.
Navet	132. C. I. 10.
— a longue queue	312. I. V. 7.
Navette petite	184. E. 2.
Nautile a cloiſons	121. B. 1.
Nautile papyracé	119. A. 1.
— — a carene retrecie	119. A. 1. α.
— — a large carene	120. A. 1. β.
Noix de mer	78. N. IV. 2.
Obeliſc chinois	328. I. VI. 3.
Oeil de bouc	434. Q. II. 4.
Oeuf	183. E. I.
Olive	198. F. II. 2.
Olive de ſatin	201. F. II. 2. κ.
— ſatinée a bandes	200. F. II. 2. ξ.

Oreil-

	Pag.
Oreille d'ane	272. H. II. 3.
— — —	429. P. 4.
— de Cochon	106. Q. I. 1.
— — —	273. H. II. 4.
— de Geant	352. L. II. 9.
— de Mer, grande	427. P. 1.
— marbrée	428. P. 3.
— ſtriée	428. P. 2.
— de Midas	196. F. I. 1.
— de Venus	408. N. VI. 5.
l'Oublie	188. E. 9.
Pagode	351. L. II. 7.
Paraſole	436. Q. II. 5.
Patte de Crapaud	290. I. VI. 4.
— — d'Oie	266. H. I. 2.
Peau d'ane	174. D. IV. 4.
— — de Chagrin	144. C. II. 6.
— — de Tigre	167. D. I. 12.
Pelote de beurre	140. C. II. 9.
Pelure d'oignon	102. P. I.
Perdrix	229. G. I. 2.

	Pag.
Perdrix a groſſe levre	230. G. I. 3.
Petoncle ſans Oreilles	78. N. I. 1.
Pholade, grande de l'Amerique	8. C. 2.
Picotée	148. C. III. 6.
Pie	358. L. III. 3.
Pigeon couvant	209. F. III. 6.
Pigeonne	279. H. III. 4.
Pince de Chirurgien	24. F. II. 5.
Piqvure de Mouche	143. C. II. 13.
Planorbe, grand	382. N. III. 1.
— — terreſtre	374. N. II. 1.
Pointillage blanc	175. D. IV. 6.
Poire ſeche	297. I. III. 8.
Porcellaine etoilée	178. D. IV. 10.
— — marbrée	164. D. I. 12.
Porphyre	197. F. II. 1.
Pou de Baleine	4. B. 4.
— de Mer	179. D. IV. 13.
Poulette	104. P. 6.
Pourpre a bandes	287. I. I. 5.
— — tacheté	288. I. II. 2.
— — triangulaire ailé	287. I. II. 1.
Prune	209. F. III. 5.

Qua-

	Pag.
Quacre rayoné	52. K. II. 12.
Quenotte	420. O. III. 4.
Queue d'Hermine	141. C. II. 12.
Racrocheuſe	292. I. III. 1.
Radix	191. E. 13.
— le gros	306. I. IV. 9.
Ratiſſoir	95. O. III. 2.
Rave	224. F. IV. 16.
Rezeau blanc	57. K. II. 18.
Rhinoceros	296. I. III. 6.
Ruban	193. E. 16.
Sabot marbré	331. K. I. 1.
Sandale	431. Q. I. 2.
Scalata, fauſſe	363. L. IV. 2.
— — vraie	362. L. IV. 1.
Scarabée	103. P. 5.

	Pag.
Scie	42. I. 4.
Scorpion	268. H. I. 4.
Selle de Pologne	101. O. IV. 7.
Soleil levant	15. E. 4.
Sorciere	334. K. I. 5.
Souris	163. D. 10.
Spectre	152. C. IV. 1.
Tapis	321. I. V. 19.
Tarriere	192. E. 14.
— blanche et cerclée	145. C. III. 2.
— chagrinée	145. C. III. 1.
Taſſe de Neptune	227. F. V. 3.
Taupe	162. D. I. 9.
— rouſſe	161. D. I. 7.
Teleſcope	344. K. III. 1.
Telline bariolée de violet & blanc	20. F. I. 5.
— fluviatile	12. D. 3.
— radiée	19. F. I. 3.
— rayée de coleur de chair	20. F. I. 5.

Franzöſiſche Benennungen.

	Pag.
Tete de Becaſſe	283. I. I. 1.
— de Dragon	175. D. IV. 5.
— de Meduſe	433. Q. II. 2.
— de Serpent	165. D. II. 2.
— — —	271. H. II. 1.
— — petite	164. D. II. 1.
Tiare epiſcopale	217. F. IV. 8.
— papale	218. F. IV. 9.
Tigre noir	124. C. I. 1.
Tonne cannelée	228. G. I. 1.
— dentelée	231. G. I. 5.
Tour de Babel	308. I. V. 1.
— de Coppenhague	250. I. VI. 1.
Tourterelle	278. H. III. 3.
Treillis	446. Q. V. 2.
Tricotée	56. K. II. 17.
Tronquée	42. I. 3.
Truitée	168. D. II. 6.
Tulipe	154. C. IV. 3.
Turban rouge	234. G. II. 3.

Vermi-

	Pag.
Verniculaires blanc & triangulaires	452. S. I.
Verole petite	180. D. IV. 14.
Vieille ridée	45. K. I. 2.
Vilebrequin	455. S. 5.
Vis de preſſoir	260. G. VIII. 8.
Vis tigrée	257. G. VIII. 2.
Vitre chinoiſe	105. P. 7.
Volute panachée	152. C. III. 10.
Zig-zag	54. K. II. 13.

NOMENCLATOR ANGLICVS.

Engliſche Benennungen.

Agathe Chama	51. K. II. 8.
Amber-Oyſter, ſmall	103. P. 3.
Amboina ſcallop, common	83. O. I. 3.
Arabian-shell	62. K. IV. 1.
Arck, ſpotted	78. N. IV. 1.
— virgin	75. N. III. 1.

Ar-

	Pag.
Argus, little Wiſe of	172. D. IV. 1.
Argus shell	158. D. I. 4.
Argus shell, girdled	293. I. III. 5.
Ass Gowry	171. D. III. 2.
Augur Peg, ſpekled	192. E. 14.
Babel Shell	308. I. V. 1.
Balanus, great, wide mouthed	4. B. 3.
— — grey, narrow mouthed	3. B. 2.
Barnacle, common english	2. B. 1.
— — tortoiſe wart	5. B. 5.
Batt Muſik ſtamper, long	219. F. IV. 11.
Beetle Porcelaine	177. D. IV. 9.
Biſchops Miter shell	217. F. IV. 8.
Blaaws ſtamper	126. C. I. 3.
Black-moors-tooth	173. D. IV. 2.
Blobber-lipt	266. H. I. 2.
Bodkin, tooth'd	258. G. VIII 5.
Brittle Saylor, courſe	120. A. I. β.
— — — great	119. A. I. α.
Broadlip, horned	172. H. II. 3.

	Pag.
Broadlip knobb'd	271. H. II. 1.
Buff Gowry	161. D. I. 7.
Burg's ſtamper	134. O. II. 3.
Cados Shell, wide	292. I. III. 1.
Cake Shell, thik-lipt	390. N. III. 12.
Caltrup Shell	289. I. II. 3.
Camel-Nerit	425. O. III. 11.
Camp	197. F. II. 1.
— turkiſche	61. K. III. 6.
Canary, broad knobbed	280. H. III. 6.
— girdled	275. H. II. 7.
— great	278. H. III. 3.
— hunch-bakt	279. H. III. 4.
— long knobbed	280. H. III. 7.
Canoe Shell, ſmal indian	431. Q. I. 2.
Carpe muſcle, deep furowed	113. Q. III. 6.
Caroline muſcle	114. Q. III. 7.
Cartagena Gowry	167. D. II. 4.
Ceram Coronet	225. F. V. 1.
Ceram Spuc-Shell	223. F. IV. 13.
Chain ſtamper, ſmall	146. C. III. 3.

Cha-

	Pag.
Chama, truncated, ſmouthed	51. K. II. 9.
— violet and white	41. I. 1.
Cheeſe Shell, great, girdled, Braſil	383. N. III. 3.
— great, River	382. N. III. 1.
— Land	374. N. II. 1.
Cheker Cockle, grained	58. K. III. 1.
Chesnut, great	301. I. IV. 2.
Cloudy-Stamper	154. C. IV. 4.
Cockle, with heary ſtreaks	78. N. IV. 2.
Cocquet	302. I. IV. 2.
Conch, large	277. H. III. 2.
Corall ſcallop	83. O. I. 5.
Couvin	346. L. I. 1.
Cross Cokle	62. K. III. 8.
Crown, papal	218. F. IV. 9.
Crown ſtamper	125. C. I. 2.
Curry Comb Oyſter	106. Q. I. 1.
Devils Claw, female	267. H. I. 3.
Diamond ſtamper, blak	142. C. II. 12.
Dice Gowry cloudy	250. G. VI. 1.

Dice

	Pag.
Dice Nerit	410. L. I.
Dog - tooth Shell	451. R. 4.
Doyer whelk	414. O. I. 4.
Dragon Gowry	175. D. IV. 5.
Dvelwe Fingers	270. H. I. 6.
Ear, hairy	299. I. III. 11.
— white	408. N. VI. 5.
Ear - Shell, great	427. P. I.
Endive Shell	291. I. II. 4.
Egg Gowry, white	183. E. I.
Elephan's - tooth	449. R. I.
Fary ſtamper	152. C. IV. I.
Feather Stamper	236. G. II. 6.
Finger Oyſter great,	107. Q. I. 2.
Flying Muſcle	114. Q. III. 8.
Fortreſſe	434. Q. II. 3.

Fur-

	Pag.
Furrow pen	261. G. VIII. 9.
Fyg whelk	190. E. 12.
Garter ſtamper	132. C. I. 10.
Giants Ear, great	352. L. II. 9.
Goats Ey Limpet	434. Q. II. 4.
Goldbrocade	150. C. III. 8.
Gooſe Shell	6. B. 6.
Govry ſaffron toothed	168. D. II. 6.
Saltspekled	166. D. II. 3.
— whit eyed	175. D. IV. 6.
Grain Cockle	32. G. 8.
Grain Girdled ſtamper	146. C. III. 3.
Grater - ſcallop	95. O. III. 2.
Green ſtamper	132. C. I. 9.
Ham Muscle, priley	117. R. 3.
Hammer Oyſter	79. O. IV. 1.
Harp Shell	246. G. V. 1.

	Pag.
Heart Cockle exotik	28. G. 1.
— — girdled	58. K. III. 2.
— — human	28. G. 2.
Hebrew Gowry, great	156. D. I. 1.
Hogs Ear - Oyſter	108. Q. I. 3.
Honez Comb Cockle	127. C. I. 4.
Horſe - hoof	67. M. 3.
St. James Cockle	81. O. I. 1.
Indian Dipper	188. E. 8.
Iſabelle Gowry	169. D. II. 7.
Kasket, knot-liſted	232. G. II. 1.
— — —	233. G. II. 2.
— — ſmal curl'd	241. G. III. 1.
— — ſmooth, gray	241. G. III. 2.
— — ſmooth, lipd	242. G. III. 3.
Kasket Shell red	234. G. II. 3.
Knob fingers	268. H. I. 4.
Koffer Shell, ſmall	244. G. IV. 1.

Leg-

	Pag.
Leghorn Govry kin, ſmall	185. E. 3.
Leopard, great	167. D. II. 5.
Leopard - ſtamper, great yellow	140. C. II. 9.
Lighter, twiſted	27. N. I. 1.
Limped béaked	
— — craked Barnstable	445. Q. V. 1.
— — thimble	446. Q. V. 2.
— — wart rib'd	448. Q. V. 4.
— — white, rib'd	432. Q. II. 1.
Lohoe broad - lip	274. H. II. 5.
Louſe - Gowry	179. D. IV. 13.
Magos Peg	324. I. VI. 2.
Magpye. top Shell	358. L. III. 3.
Maiden - Muſcle	44. K. I. 1.
Mantel ſcallop ducal	48. O. II. 1.
Map - Shell	158. D. I. 4.
Marble date, pourple	200. F. II. 2. ζ.
Massle Gowry, long	174. D. IV. 4.
Melon, clouded	226. F. V. 2.
Melon - tun	227. F. V. 3.

	Pag.
Midas Ear	196. F. I. 1.
Monk, gray	137. C. II. 5.
Mulberry Shell	302. I. IV. 4.
Murex blue and white	305. I. IV. 8.
— common, thormey	286. I. I. 4.
— pointed	313. I. V. 8.
Muſcle conted	74. N. II. 2.
Muſik Shell	218. F. IV. 10.
— oriental	221. F. IV. 12.
— white	221. F. IV. 13.
Nail ſcallop, wiſe of	66. M. 2.
Naſſau Shell	347. L. II. 2.
Nerit, deep, rig'd	426. O. III. 13.
— red	419. O. III. 1.
— twin girdled	413. O. I. 3.
— white	406. O. I. 6.
Neſtors-top, great	351. L. II. 6.
Nipple Gowry-kin, white	185. E. 4.
Noahs Lighter	73. N. II. 1.

	Pag.
Oaker-wood Stamper	140. C. II. 10.
Olive Gowry, freekled	171. D. III. 3.
Olive Shell	198. F. II. 2.
— clouded	202. F. II. 3.
Oren Shell	456. S. 7.
Oxheart Cockle	31. G. 7.
Oxheart Shell, rouyh	32. G. 9.
Oyſter	99. O. IV. 4.
— chineſe pelluind	105. P. 7.
— great prikley	64. L. I.
Paper Nautilus	119. A. I.
Parement, italian	131. C. I. 8.
Partridge great, ſpat ribd	231. G. I. 5.
— indian	229. G. I. 2.
— round	191. E. 13.
— thik lipd	230. G. I. 3.
Pearl Gowry	182. D. IV. 17.
Pearl Oyſter	108. Q. II. I.
— the flat	101. O. IV. 7.

	Pag.
Pearl river muſcle	11. D. 2.
Peg, white ſnouted	323. I. VI. 1.
Perſian Shell	247. G. V. 2.
Pholas, deaep furrowed	8. C. 2.
Pidak, oblong white	7. C. 1.
Plough	271. H. II. 2.
Poeloroon Nerit	422. O. III. 7.
Popes Crown, knopped	325. I. VI. 3.
Porcellain, yellow zoned	162. D. I. 9.
Porphyry Shell	151. C. III. 9.
Pot wattering	457. S. 9.
Prince ſtamper	199. F. II. 2. 3.

Ramshorn	122. B. 2.
Razor Shell, blueiſch crooked	15. E. 3.
— — little, ſtrait	13. E. 2.
— — thik	13. E. 1.
Rice Gowry	180. D. IV. 14.
River ragged mouth	373. N. I. 1.

Sail

	Pag.
Sail Shell thik	121. B. I.
Sandſtamper	143. C. II. 13.
Saylor, courſe brittle	120. A. I. β.
— great brittle	119. A. I. α.
Scallop, litte yellow	84. O. II. 1.
— thin	82. O. I. 4.
Sea Ear, long	429. P. 4.
Seeren Shell, rough	326. I. VI. 1.
Silver Gowry kin, blakspekled	208. F. III. 4.
Silvermouth	348. L. II. 3.
— — ſpotted	858. L. III. 4.
Snail, echinated	360. L. III. 6.
— golden mouthed	349. L. II. 4.
Snailshell, ſmouth girdled	384. N. III. 4.
Snake Gowry, ſmall	164. D. II. 1.
Snippe, thorney	285. I. I. 3.
Solen, thik, red	16. E. 5.
— violet purple, papyraceons	15. E. 4.
Spider Shell	269. H. I. 5.
Spind e Shell	310. I. V. 3.
Spinnet Shell	333. K. I. 3.
Spur Shell	351. L. II. 7.

	Pag.
Spur Shell ſmall	300. I. IV. 1.
Stair Caſe, royal	362. L. IV. 1.
— — ſmall	363 L. IV. 2.
Stamper, net liſted	129. C. I. 5.
Starkake, wrinkled	4. B. 4.
Star Gowry	178. D. IV. 10.
Strawberry heart Cockle	30. G. 5.
— — red	33. G. 10.
Stone piercer	109. Q. III. 1.
Stone whelk	196. I. III. 6.

Tabby Stamper	148. C. III. 6.
Tellin, rayed	19. F. I. 3.
Thik - top	339. K. II. 3.
Top, great waved	331. K. I. 1.
Tooth Shell, ſtriated	449. R. 2.
Tourtle Govry, great	159. D. I. 5.
—— Leopard great	165. D. II. 2.
Tree Oyſter	97. O. IV. 2.
Tritons Trumpet	316. I. V. 12.

	Pag.
Trochus, prikley	350. L. II. 5.
Trumpet-knobbed	294. I. III. 3.
Tullip tellina	23. F. II. 4.
Tulip Shell	154. C. IV. 4.
Tyger Shell	124. C. I. 1.
Tygershorn brownn	257. G. VIII. 2.
Tygerſtamper	149. C. III. 7.
Tyger tooth	256. G. VIII. 1.
Velk Nerit	415. O. I. 5.
Wart Gowry	182. D. IV. 16.
Wax Stamper	130. C. I. 7.
Wedge Muſcle	24. F. II. 4.
Whelk	254. G. VII. 3.
— common english	315. I. V. 11.
— great net	279. H. III. 4.
— heary	297. I. III. 8.
— leaſt ragged	290. I. II. 4.

	Pag.
Whelk perſian	235. G. II. 4.
— ſmall laticed	254. G. VII. 4.
— ſmall prikle	304. I. IV. 7.
— ſmall rough	252. G. VII. 1.
— ſpiked	276. H. III. 1.
Whirligig, Indian	344. K. III. 1.
Woman, old	45. K. I. 2.
Woodcock Shell	283. I. 1.
— — thorney	284. I. I. 2.
Zigzag Chama	53. K. II. 12.

W I E N,

gedruckt bei Joſeph Gerold, kaiſerl. Reichshof-
raths- und Univerſitätsbuchdruckern.

1 7 7 8.

STAATSBIBLIOTHEK BAMBERG

E R R A T A.

Pag.		corrige
21.	F. I. 6. Knor. Vergn. II. 20. t. 1. f.	II. 20. t. 5. f.
21.	F. I. 6. —— —— VI. 11. t. 2. f.	V. 11. t. 2. f.
23.	F. II. 4 —— —— II. 19. t.	I; 19. t.
23.	F. II. 4. —— —— IV. 2. t; 24. f.	IV. 2. t. 4. f.
24.	F. II 5 —— —— II. 2. t.	IV. 2. t.
26.	F. III. 1. Liſt. H. C. l. 2.	Liſt. H. C. l. 3.
26.	F. III. 2. mondfärbigen	mondförmigen
27.	F. III. 3 Liſt. H. C. l. 2.	Liſt. H. C. l. 3.
29.	G. 2 Knor. Vergn. I, 18. t. 2. f.	I. 18. t. 3. f.
42.	I 3. Das Stümpchen	Das Stümſchen.
42.	1, 5. Donex	Donax.
42.	1. 5 Knor. Vergn. V.	Knor. Vergn. VI.
50.	K. II. 7. —— —— II.	—— —— VI.
54.	K. II 12 — —— I. 21. t. 4. f.	—— —— I. 21. t. 5. f.
54.	K. II 13. Zigzog	Zigzag.
63.	I. dichte Zähne, zwiſchen eine Grube	dicke Zähne, und dazwiſchen eine Grube.
7 .	M. 8. verlängerte Schale	verlängerte Klappe.
75.	N. II 2. Knor Vergn, II. 27. t.	II. 2. t
9 .	O. III. 9.	O. II. 9.
9	O. III. 4 Oſtra	Oſtrea.
101	O. IV. 7. glattgedrückte	platgedrückte.
138.	C. II. 7. breite eyförmige	nezförmige.
158.	D. I. 4. Grand Atgus	Grand Argus.
160.	D. I. 6. Linn S. N. Sp. 320.	S. N. Sp. 330.
174.	D. IV. 3. Knor Vergn, II 9. t.	IV. 9, t.
188	E 9. verkehrt eyförmige	faſt eyförmige
203.	F. II 4. ſchief geſpaltene	ſchief gefaltene.
204.	F. II 4 γ. lang mit braunen	weiß mit braunen
204.	F. II. 4 δ. Knor. Vergn. VI. 34. t. 45. f.	VI. 34. t. 4, 5. f.
209.	Knor. Vergn, IV. 21. t, 3, 4. f.	IV. 21. t, 3. f.
215.	F. IV. 5, longitudinalibus	longitudinaliter.
221.	D Hebraique	L'hebraique.
224	F. IV. 16 β. Knor. Vergn. VI. 22. 2. f.	VI. 27. t. 2. f.
227.	F. V. 2. Knor. Vergn. V. 28 t. 1. f.	V. 28. t. 2. f.
238.	G. II. 7. —— —— III. 8. n. 2. f.	III. 8. t. 2. f.
276.	H. III. 1. tuberculato	tuberculata.
283.	I I. 1. the comonon	the common.
309.	I. V. 1. Argenv. Conch. Pl. 12. f. M.	Pl. 9. f. M.
312.	I. V. 5. —— —— Pl. 0. f. A.	Pl. 9. f. A.
319.	I. V. 16. —— —— Pl. 13. f. K.	Pl. 10. f, K.
328.	I. VI, 7. —— —— Pl. 11. f. L.	Pl. 11. f. α.
328.	I. VI. 7. Obeliſce chinois	Obeliſc chinois.
328.	I. VI 7. β. ex fuſco luteo	ex fuſco lutea.
333.	K, I. 3. Argenv. Conch. Pl. 9. f. M.	Pl. 8. f. M.
334.	K I. 4. —— —— Pl. 11. f. L. Q.	Pl. 8. f. L. Q.

Pag.	corrige
334. K. I. 5. le Sorciere	la Sorciere.
335. K. I. 5. Argenv. Conch. Pl. 11. f. S.	Pl. 8. f. S.
343. K. II. 9. Turbo crocatus	Trochus crocatus.
348. Knor. Vergn. I. 3. t. 3. f.	I 3. t. 4.
349. L. 4. Schale hot	Schale iſt
351. L. II. 6 iſt mit auf den Gewinden	iſt auf den Gewinden.
351. L II. 7 blattgedrückten	platgedrückten.
352. L. II 7 Knor. Vergn. III. 20 t. 1. f.	IV. 4 t. 2. f.
352. L. II. 8. geſtreifte Schale hat	geſtreifte Schale iſt.
354. L. II. 10. convexo nodoſa obtuſa	convexa obtuſa.
365. L. IV. 4. Berl Mag. IV 3. t. 3. f.	ommittatur.
376. N. II 5. Knor. Vergn. VI. 26. t.	V. 26 t.
380. N. II. 12. Helix maculata	Helix maculoſa.
383. N. III. 2 gelblicher Schale	gelblicher Farbe.
403. N. V 3. Helix plicata	Helix plicaria.
425 O. III. 11. Knor. Vergn. II. 9. t. 1. f.	ommittatur.
449. R. I. Knor Vergn I. 19. t.	29. t.
458. Knor. Vergn IV. 28. t. 2. f.	IV. 28. t. 1. f.

Born, Ignaz <<von>>,

Ignatii a Born ... Index Rerum Naturalium Musei Caesarei Vindobonensis

Bd.: Pars I.ma

1778

Bamberg, Staatsbibliothek -- Zool.o.96
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11784836-5
VD18 80403433-001